UE B3 · Hygiène et prévention des infections

CM1 · Prévenir le risque infectieux lors des soins

Comprendre la transmission

IAS : infection survenant pendant ou après une prise en charge, absente et non incubante au début. Origine endogène (flore du patient) ou exogène.

Chaîne : agent → réservoir → porte de sortie → transmission → porte d'entrée → hôte. Contact direct/indirect, gouttelettes ou air : interrompre un maillon protège.

Précautions standard : le socle universel

Pour toute personne, tout soin et tout lieu, quel que soit le statut infectieux ; précautions complémentaires si indiquées.

Raisonner risque → exposition → prévention : mains, EPI, hygiène respiratoire, objets perforants, excreta, environnement et circuits du linge/déchets.

Mains : cinq moments et technique adaptée

Avant contact ; avant geste aseptique ; après risque de liquide biologique ; après contact ; après contact avec l'environnement du patient.

Friction hydroalcoolique sur mains non visiblement souillées ; lavage eau et savon si souillure visible. Après gale ou C. difficile : lavage puis friction selon protocole.

Avant-bras dégagés, aucun bijou/montre, ongles courts sans vernis ni faux ongles. Les gants ne remplacent jamais l'hygiène des mains.

CM1 · Décider, se protéger, réagir

Équipements selon le risque réel

Gants si contact attendu avec sang/liquides biologiques, muqueuse ou peau lésée ; changer entre soins et patients, retirer aussitôt après usage. Pas de gants systématiques sur peau saine.

Tablier/surblouse si risque de souillure ; masque et protection oculaire si projection. Patient symptomatique respiratoire : hygiène respiratoire et masque adapté.

AES / AEV : prévenir et agir sans délai

Piqûre, coupure ou projection de sang (ou liquide biologique à risque) sur muqueuse/peau lésée : risque notamment VHB, VHC, VIH.

Ne jamais recapuchonner ; jeter immédiatement l'objet perforant dans le collecteur proche du soin, sans dépasser la limite de remplissage.

Piqûre/coupure : ne pas faire saigner, laver, rincer, antisepsie selon protocole. Muqueuse : rincer abondamment à l'eau ou au sérum physiologique.

Alerter aussitôt, obtenir une évaluation médicale rapide, déclarer et suivre le protocole local (prise en charge et suivi).

Asepsie, antisepsie, désinfection

Asepsie : empêcher l'introduction de micro-organismes pendant le soin. Antisepsie : réduire les microbes sur tissus vivants. Désinfection : traitement d'un support inerte.

Avant un geste invasif : peau propre ou souillée ? site et risque du geste ? produit et séquence du protocole ? Respecter concentration, application, temps de contact, séchage et conservation.