MÉMORISER • UE B3 / S1

# Prévenir le risque infectieux

Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • Moodle

## CHAÎNE INFECTIEUSE

Réservoir/agent → transmission → porte d'entrée → hôte/facteurs favorisants. Mains, matériel, gouttelettes/air : repérer l'exposition.

## RÈGLE

Précautions standard : tout patient • tout soin • tout lieu, quel que soit le statut infectieux connu.

## 5 MOMENTS DES MAINS

Avant contact • avant geste aseptique • après risque biologique • après contact • après environnement.

## FHA OU SAVON ?

FHA si mains non visiblement souillées. Eau + savon si souillure visible/détersion, puis séchage et hygiène adaptée.

Fil de raisonnement : repérer → comprendre → agir / transmettre selon la situation.

MÉMORISER • UE B3 / S1

# Prévenir le risque infectieux

Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • Moodle

## EPI SELON LE RISQUE

Gants si exposition; jamais systématiques sur peau saine. Ils ne remplacent pas l'hygiène des mains. Tablier/masque/lunettes selon souillure, projection et protocole.

## ANTISEPSIE / ASEPSIE

Antisepsie : tissus vivants. Asepsie : prévenir l'introduction de germes. Respecter indication, produit, zone et temps de contact.

## AES PIQÛRE / COUPURE

Ne pas faire saigner → eau + savon → rincer → antisepsie selon protocole AES.

## AES MUQUEUSE

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau/sérum. Puis alerte, évaluation médicale rapide, déclaration et suivi selon protocole local.

# Comprendre la chaîne de transmission

Prévenir le risque infectieux

### Agent / réservoir

Micro-organisme ou milieu qui le porte.

### Transmission

Contact, mains, matériel, gouttelettes ou air selon la situation.

### Porte d’entrée

Voie d’exposition par laquelle l’agent atteint l’hôte.

### Hôte vulnérable

Facteurs individuels et contexte influencent le risque.

**FIL ROUGE**

Réservoir → transmission → porte d’entrée → hôte. Rechercher où agir, sans attendre un statut connu.

# Légende • application • vigilance

Prévenir le risque infectieux

### Repère 1

Une infection résulte d’une chaîne; interrompre une étape réduit le risque.

### Repère 2

Précautions standard : tout patient, tout soin, tout lieu.

### Repère 3

Hygiène des mains, matériel, environnement et gestes adaptés agissent sur des maillons différents.

### Repère 4

Adapter les précautions au geste, à l’agent suspecté et au protocole.

Synthèse du cours associé; appliquer le contexte et les consignes du service.