B3 • Examens biologiques & prélèvements

1. PHASES DES EXAMENS BIOLOGIQUES

La qualité du résultat commence avant l'analyse.

Phase préanalytique	Phase analytique	Phase postanalytique
• Prescription • Transport / réception	• Analyse	• Validation • Interprétation des résultats

2. IDENTITÉ DU PATIENT & PRÉPARATION

PET :
- bon Patient
- bonnes Étiquettes
- bons Tubes

Prescription :
- patient, prescripteur
- date, examens
- signature
- clinique et traitements utiles

Question OUVERTE :
- nom, prénom, date de naissance
- Concordance prescription / identité
- Bracelet d'identification
- Si patient non communicant : procédure adaptée



- **Informer** le patient et obtenir son consentement
- **Vérifier** le **jeûne** selon l'examen (pas systématique)
- Eau selon la consigne du laboratoire

3. MATRICES BIOLOGIQUES & TUBES

Sérum
- après coagulation
- puis centrifugation

Plasma
- anticoagulant
- puis centrifugation

Sang total
- anticoagulant
- non centrifugé

Bleu (citrate)	Sec rouge/jaune	Vert (héparine)	Violet (EDTA)	Gris
• Coagulation	• Sérum • Sérologie / biochimie	• Biochimie	• NFS / HbA1c	• Antiglycolytique • Glycémie selon laboratoire

Couleurs indicatives : vérifier l'additif et le manuel du laboratoire.

4. ORDRE DE PRÉLÈVEMENT & GESTE

Ordre des tubes (si hémocultures prescrites) :

Hémocultures (si prescrites) → Citrate → Sec → Héparine → EDTA → Fluorure

Exceptions possibles selon le laboratoire.

Ailettes (prélèvement sur cathéter) :
- Purge avant citrate si nécessaire
- Pas de purge systématique avant hémocultures.

Geste de prélèvement :
- Hygiène des mains, gants
- Antisepsie et séchage
- Garrot bref < 1 min si possible, relâcher dès que possible
- Éviter un bras perfusé

Points importants :
- Citrate : remplir au **TRAIT** (rapport sang/citrate 9:1), jamais transvaser
- Retournements doux immédiatement selon fabricant, jamais secouer
- Comprimer et vérifier l'arrêt du saignement
- Élimination immédiate des objets piquants
- Pas de recapuchonnage.

5. PRÉLÈVEMENTS SPÉCIFIQUES

Hémocultures
- Asepsie peau et bouchons
- Volumes adaptés adulte/enfant
- Avant antibiotique si possible sans retarder une urgence.

Gaz du sang
- Seringue adaptée
- Sans air
- Homogénéiser
- Noter O_2/FiO_2, heure
- Transport immédiat selon laboratoire
- Pas de glace systématique.

ECBU (urines)
- Hygiène
- Milieu de jet
- Pot stérile
- Sonde : site dédié désinfecté
- Jamais sac collecteur.

Coproculture
- Selles sans mélange urine/eau.

Prélèvement ORL
- Écouvillon adapté
- Site précis
- Protection et technique selon protocole.

6. TRANSPORT, ÉTIQUETAGE & ERREURS

Étiquetage immédiat (en présence du patient) :

Nom : DUPONT
Prénom : Jeanne
Né(e) le : 14/05/1988
Date/heure : 12/04/2024 – 10h30
Préleveur : IDE
Site : pli du coude
Renseignements utiles

Transport :
- Tube fermé → secondaire étanche avec absorbant → extérieur adapté
- Fiche séparée, urgence signalée
- Délais et température propres à l'examen et au contenant.

Principales erreurs et non-conformités :
- Hémolyse, caillot, sous-remplissage
- Mauvaise identité ou délai
- Signaler au laboratoire, ne pas masquer.

Impact de l'hémolyse :
- Peut fausser notamment le potassium et la LDH.