FORMES HORS INJECTABLES

Synthèse IFSI

1. BASES

- **Médicament** = principe actif + excipients (allergies possibles).
- **Galénique :** forme finale du médicament.
- **Biodisponibilité :** fraction et vitesse d'arrivée dans le sang.
- **Oral :** intestin → veine porte → foie → circulation ; premier passage possible.
- **Notice :** patient ; **RCP :** professionnels.



2. ORAL SOLIDE

- **Poudres**, granulés, comprimés, gélules, capsules molles.
- **Gastro-résistant :** libération dans l'intestin.
- **LP :** libération prolongée.
- **Ne pas écraser** LP/gastro-résistant ; exception seulement selon RCP.
- **Ouvrir une gélule :** vérifier la spécialité ; microgranules protégés jamais broyés.
- **Orodispersible** ≠ sublingual.
- **Effervescent :** dissoudre avant prise.
- **Barre de confort** ≠ doses égales.
- **Assis**, eau suffisante.
- **Atouts :** conservation, précision ; **limites :** déglutition, délai d'action.



3. ORAL LIQUIDE

- **Solution :** PA dissous, 1 phase.
- **Suspension :** solide insoluble dans liquide.
- **Émulsion :** 2 liquides non miscibles.
- **Suspension/émulsion :** agiter selon notice.
- **Sirops, gouttes :** attention concentration et sucre.
- **Dispositif propre au produit ;** pas de cuillère domestique.
- **Volume (mL) = dose (mg) ÷ concentration (mg/mL).**
- **Dose adaptable ;** conservation moindre, erreurs mg/mL/gouttes.



4. ŒIL & ORL

- **Œil :** collyres, pommades, inserts ; stérilité ; goutte dans cul-de-sac conjonctival, embout sans contact.
- **15 min** entre produits oculaires ; suivre RCP ; plus visqueux en dernier ; lentilles selon notice.
- **Oreille :** gouttes après vérification du tympan ; tête inclinée environ 5 min selon produit.
- **Nez :** moucher avant.
- **Gorge :** collutoire ; anesthésique local → risque de fausse route.
- **Bain de bouche :** recracher.
- Passage général possible.



5. AUTRES MUQUEUSES

- **Sublingual :** laisser dissoudre selon notice ; absorption muqueuse rapide, évite premier passage pour fraction absorbée.
- **Rectal :** suppositoires, lavements, crèmes ; effet local/général ; évite seulement EN PARTIE le premier passage.
- **Vaginal :** ovules, comprimés, capsules, crèmes ; surtout local, parfois hormonal général.
- Ne pas avaler une forme vaginale sauf double voie explicitement autorisée.
- Irritation, allergies et effets généraux possibles.



6. PULMONAIRE

- **Spray :** inspiration lente + déclenchement ; coordination main-bouche.
- **Chambre compatible :** UNE bouffée à la fois.
- **Autodéclenché :** activation à l'inspiration.
- **Poudre :** inspiration forte/profonde ; ne pas souffler dans appareil ; gélule à inhaler ≠ à avaler.
- **Nébuliseur :** liquide → aérosol ; faible coordination requise.
- **Absence de sensation ≠ absence de dose :** pas de double prise.
- **Gaz médicaux/anesthésiques :** effet général.
- **Vérifier** technique, compteur, entretien ; rincer bouche après corticoïde inhalé.



7. SÉCURITÉ & CONDITIONNEMENT

- **Primaire :** contact direct ; **secondaire :** boîte.
- **Garder nom/DCI, dosage, lot, péremption ;** attention faux unitaires.
- **Multidose :** 1 patient, date ouverture et limite d'utilisation selon produit.
- **Unidose oculaire/ORL :** jeter après usage selon notice.
- **Hygiène** ; bonne voie ; vérifier prescription et RCP.



Synthèse des 5 supports C. Niot • CHU Nice • Voie cutanée : support non transmis