Rosana Cristina Spezia Ferreira (organizadora)
• GISELA SAORI YOSHIMATSU
• LIGIA FRANCO DUARTE
• LUANA VIANA SATO
• RENATA FERNANDES FIORENZA GONÇALVES

4ª edição

Bulário DETALHADO

BULAS de AaZ

PARA MÉDICOS, DENTISTAS, FARMACÊUTICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

EDITORA RIDEEL
Quem tem Rideel tem mais.

AUTORAS E ORGANIZADORA

ORGANIZADORA

Rosana Cristina Spezia Ferreira

Farmacêutica graduada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Oswaldo Cruz – SP. Membro da Comissão de Saúde Pública – CRF (Conselho Regional de Farmácia) – SP. Especialização em Farmacologia e Toxicologia Clínica, Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica, Administração Hospitalar e Farmácia Hospitalar. Experiência de mais de dezesseis anos na área hospitalar. Atualmente trabalha em saúde pública, em uma UBS e Ambulatório de Especialidades Médicas – Associação de Saúde Congregação Santa Catarina.

AUTORAS

Gisela Saori Yoshimatsu

Médica graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté. Pós-graduada em Acupuntura pelo Centro de Estudo Integrado de Medicina Chinesa (CEIMEC), São Paulo-SP. Pós-graduada em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo (FACIS), em "Convênio Técnico Científico" com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Estudo na Área de Saúde (FAPES), São Paulo-SP. Em curso de Pós-graduação *Lato Sensu* e Especialização em Homeopatia pela Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia (ABRAH), em convênio com o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Médica Clínica Geral pela OS Associação Congregação de Santa Catarina. Médica responsável pelo Espaço Saori de Terapias Alternativas.

Ligia Franco Duarte

Enfermeira graduada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Pós-graduada em Cardiologia e Gestão da Qualidade em Saúde. Experiência em processos de Qualidade. Experiência como Supervisora da Equipe de Enfermagem de Hospital Geral, Ambulatório de Especialidades e Unidade Básica de Saúde. Experiência como enfermeira assistencial em Clínica Médica-Cirúrgica, Pronto-Socorro, UTI Adulto, Unidade Básica de Saúde, Endoscopia, Radiologia, Ecocardiografia e Central de Material Esterilizado. Experiência como professora de estágio pelas escolas SENAC, São Camilo e Cruz Vermelha Brasileira.

Luana Viana Sato

Enfermeira graduada pela Universidade Bandeirantes de São Paulo (UNIBAN). Especialista em Gerenciamento em Enfermagem pela UNIBAN. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva pelo Centro Universitário São Camilo. Especialista em Docência para os profissionais de saúde, com ênfase no ensino técnico e superior em Enfermagem pela FACCAMP. Especialista em Formação de Educadores em Diabetes e Hipertensão pela UNIP.

Renata Fernandes Fiorenza Gonçalves

Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Residência Médica em Pediatria pelo Instituto da Criança – HC FMUSP. Complementação especializada em alergia e imunologia pelo Instituto da Criança – HC FMUSP. Título de especialista em Pediatria e em Alergia e Imunopatologia. Em curso de pós graduação latu sensu e especialização em Homeopatia pela Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia (ABRAH), em convênio com Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo. Médica interlocutora da Saúde da Criança na Supervisão Técnica de Saúde da Capela do Socorro – Prefeitura do Município de São Paulo. Médica alergista da Clínica de Alergia São Paulo.

REVISÃO TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO

Ana Alice Dias

Farmacêutica e especialista em Farmacologia pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Católica de Santos. Mestre e Doutora em Farmacologia pela Universidade de São Paulo. Docente do curso de Farmácia e Bioquímica e supervisora de estágio na área de Dispensação e Atenção Farmacêutica da Universidade Nove de Julho. Docente do curso de pós-graduação de Farmácia Hospitalar da Faculdade Oswaldo Cruz. Docente e coordenadora do curso de pós-graduação de Farmacologia e Toxicologia Clínica do Instituto Racine.

Rosângela Aparecida Sala Jerônimo

Mestre em Ciências da Saúde, com foco em segurança do paciente, pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Especialista em Qualidade Total pela Faculdade Oswaldo Cruz. Enfermeira graduada pela Universidade Federal de São Paulo.

AUTORAS DO CONTEÚDO DE ODONTOLOGIA

Ivy Haralambos Bassoukou Ribeiro

Dentista graduada pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Especialista e Mestre em Odontogia, área de concentração Odontopediatria, pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL).

Katia Regina Werneck de Avellar

Dentista graduada pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Especialista em Odontopediatria pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Especialista em Saúde Coletiva pela USP.

Maria Teresa Botti Rodrigues dos Santos

Cirurgiã-dentista graduada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). Especialista em Odontogeriatria pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO). Especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO). Mestre em Reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professora Doutora dos cursos de pós-graduação em Odontologia (Mestrado e Doutorado) e Ciências da Saúde (Mestrado) da Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Professora Titular da disciplina de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do curso de Odontologia da UNICSUL.

COLABORADORA DO CONTEÚDO DE TUBERCULOSE

Maria José Soares Beccari

Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Enfermeira da Congregação de Santa Catarina. Pós-graduada em Obstetrícia e Magistério de ensino superior pela PUC/SP. Prêmio pelo melhor acompanhamento e monitoramento de Combate à Tuberculose no IX Encontro da Tuberculose da Cidade de São Paulo. Professora universitária pela UNIB/SP, no período de 2012 a 2013.

SUMÁRIO

ALOPÁTICOS

Abacavir, sulfato de ... 1
Abatacepte ... 2
ABCIXIMABE ... 3
Acarbose ... 6
Acebrofilina ... 7
Aceclofenaco ... 7
Acetado acetofenida + enantato de estradiol ... 8
Acetato de medroxiprogesterona ... 9
Acetato de sódio ... 10
Acetazolamida ... 11
Acetil aspartilglutamato de sódio ... 12
Acetilcisteína, injetável ... 12
Acetilcisteína, solução nasal ... 13
Acetilcisteína, via oral ... 14
Aciclovir, injetável ... 15
Aciclovir, oftálmico ... 16
Aciclovir, via oral ... 17
Ácido acetilsalicílico ... 18
Ácido aminocaproico, injetável ... 19
Ácido aminocaproico, via oral ... 20
Ácido azelaico ... 21
Ácido bórico, em associações ... 21
Ácido fólico ... 22
Ácido fusídico ... 22
Ácido mefenâmico ... 23
Ácido metacresolsulfônico, solução (policresuleno) ... 24
Ácido mucopolissacarídeo ... 25
Ácido nalidíxico ... 26
Ácido paraminossalicílico (ácido aminossalicílico) ... 26
Ácido pipemídico ... 27
Ácido poliacrílico, gel oftálmico ... 28
Ácido salicílico tópico ... 28
Ácido tranexâmico ... 29
Ácido valproico ... 30
Ácido zoledrônico ... 31
Ácidos graxos poli-insaturados (óleo de peixe) ... 32
Acitretina ... 32
Adalimumabe ... 33
Adapaleno ... 34
Adefovir ... 35
Adenosina ... 35
Aflibercepte ... 36
Albendazol ... 38
Albumina humana ... 39
Alcatrão mineral ... 40
Álcool polivinílico ... 40
Alendronato de sódio ... 41
Alentuzumabe ... 42
Alfa-agalsidase ... 43
Alfa-alglicosidade ... 44
Alfacalcidol ... 45
Alfacerliponase ... 46
Alfadornase ... 47
Alfaelosulfase ... 48
Alfaepoetina ... 49
Alfainterferona 2b ... 50
Alfapeginterferona 2a ... 53
Alfapeginterferona 2b ... 54
Alfaporactanto (surfactante pulmonar) ... 55
Alfavelaglicerase ... 57
Alfavestronidase ... 58
Alfentanila ... 58
Alfuzosina ... 60
Alisquireno ... 61
Alizaprida ... 62
Almitrina ... 62
Alopurinol ... 63
Alprazolam ... 64
Alprostadil ... 65
Alteplase ... 67
Amantadina ... 69
Ambrisentana ... 70
Ambroxol ... 73
Amicacina, sulfato ... 74
Amilorida + hidroclorotiazida ... 75
Aminofilina, injetável ... 75
Amiodarona, cloridrato de, injetável ... 77
Amiodarona, cloridrato de, via oral ... 78
Amissulprida ... 79
Amitriptilina, cloridrato ... 80
Amoxicilina, via oral ... 82
Amoxicilina + clavulanato de potássio (Amoxicilina + clavulunato de potássio), via oral. ... 83
Amoxicilina + clavulanato de potássio, injetável ... 84

Ampicilina 85
Ampicilina + sulbactam 87
Ampicilina sódica, injetável 88
Amprenavir 89
Anastrozol 90
Anfotericina B e Anfotericina B complexo lipídico 91
Anfotericina B, lipossomal 93
Anidulafungiana 95
Anidulafungina 95
Anlodipino, besilato de (ou anlodipina) 96
Aprepitanto 97
Aprotinina, injetável 98
Aripiprazol 99
Arteméter 100
Arteméter + lumefantrina 101
Artesunato de sódio 103
Artesunato de sódio + mefloquina 103
Asparaginase 105
Atazanavir, sulfato 106
Atenolol 107
Atorvastatina 108
Atosibana, injetável 109
Atracúrio, besilato 110
Atropina, colírio 111
Atropina, sulfato de, 0,25 mg/ml, injetável 112
Azacitidina, injetável 113
Azatioprina 115
Azelastina, spray nasal 116
Azitromicina, injetável 117
Azitromicina, via oral 118
Aztreonam 119
Baclofeno 121
Bambuterol 122
Bamifilina 123
Basiliximabe 124
Beclometasona, dipropionato de, aerosol suspensão nasal 125
Beclometasona, dipropionato de, spray nasal 126
Bedaquiline 127
Benazepril 129
Benciclano 130
Benzidamina (Benzidamida) 131
Benzilpenicilina benzatina 132
Benzilpenicilina potássica 133
Benzilpenicilina potássica e benzilpenicilina procaína 134
Benzoato de benzila 135
Benzocaína 136
Benzoilmetronidazol 137
Benzonidazol (Benznidazol) 138
Benzoperóxido (Peróxido de benzoíla) + enxofre 139
Beractanto 139
Beta-agalsidase 140
Betainterferona 1a 141
Betainterferona 1b 142
Betaistina 143
Betametasona, acetato de + fosfato sódico de betametasona 144
Betametasona, dipropionato de; Betametasona, valerato de (tópico) 145
Betanecol 146
Betaxolol 147
Bevacizumabe 148
Bezafibrato 149
Bicalutamida 150
Bicarbonato de sódio 151
Bifonazol 152
Bimatoprosta 152
BIOTINA 153
Biperideno, cloridrato 154
Biperideno, lactato 155
Bisacodil 156
Bismuto 157
Bisoprolol 157
Bleomicina, sulfato 159
Boceprevir 160
Bortezomibe 162
Bosentana 164
Brimonidina 165
Brinzolamida 165
Bromazepam 166
Brometo de tiotrópico monoidratado + cloridrato de olodaterol 167
Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol 169
Bromexina 170
Bromocriptina 170
Bromoprida, injetável 172
Bromoprida, via oral 173
Bronfeniramina + associações 174
Buclisina 174
Budesonida, inalação oral e nasal 175
Budesonida, enema 176
Bumetanida 177
Bupivacaína, cloridrato de 178
Bupropiona 179
Burosumabe 180
Buspirona 181
Bussulfano 182
Cabergolina 184
Calamina + difenidramina tópica 185

Calcipotriol 185
Calcitonina 186
Calcitriol 187
Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola) 188
Cambendazol 191
Candesartana 192
Caolim + pectina + hidróxido de alumínio, via oral 192
Capecitabina 193
Capreomicina 194
Capsaicina tópica 196
Captopril 196
Carbamazepina, via oral 198
Carbinoxamina, vias oral e nasal (em associação) 199
Carbocisteína 200
Carbonato de cálcio 200
Carbonato de cálcio + colecalciferol (vitamina D3) 201
Carbonato de magnésio, via oral 202
Carboplatina 203
Carboximetilcelulose sódica 204
Carisoprodol + associações, via oral 205
Carmustina, injetável 206
Carvão ativado 207
Carvedilol 208
Caspofungina 209
Cefaclor 210
Cefadroxila 211
Cefalexina 212
Cefalotina sódica 213
Cefazolina sódica 214
Cefepima 215
Cefixima 216
Cefotaxima sódica 217
Cefoxitina sódica 218
Cefpodoxima 219
Cefprozila 220
Ceftazidima 221
Ceftriaxona 222
Cefuroxima, injetável 223
Cefuroxima, via oral 224
Celecoxibe 225
Certolizumabe pegol 226
Cetamina, cloridrato 229
Cetilpiridínio, via oral 230
Cetirizina 230
Cetoconazol, creme e xampu 231
Cetoconazol, via oral 232
Cetoprofeno, injetável 233
Cetoprofeno, via oral, supositório e gel tópico 234
Cetorolaco 235
Cetorolaco, injetável 236
Cetorolaco, tópico oftálmico 237
Cetotifeno, via oral e colírio 237
Cetuximabe 238
Cianocobalamina 239
Ciclesonida, aerossol 240
Ciclobenzaprina 241
Ciclofosfamida, injetável 242
Ciclofosfamida, via oral 243
Ciclopentolato, colírio 244
Ciclopirox 245
Ciclosporina 246
Cilostazol 248
Cimetidina, injetável 248
Cimetidina, via oral 249
Cinacalcete, cloridrato 250
Cinarizina 252
Cinchocaína + policresuleno tópico 252
Ciproeptadina, via oral (associação) 253
Ciprofibrato 254
Ciprofloxacina, injetável 255
Ciprofloxacina, solução oftálmica 256
Ciprofloxacina, via oral 257
Ciproterona 258
Cisatracúrio 259
Cisplatina 261
Citalopram 262
Citarabina 263
Cladribina 264
Claritromicina, Injetável 266
Claritromicina, via oral 267
Clindamicina, via oral 268
Clindamicina, fosfato de, injetável 269
Clobazam 270
Clobetasol, tópico/capilar 272
Clodronato dissódico, injetável 273
Clodronato dissódico, via oral 273
Clofazimina 274
Clofibrato, via oral 275
Clomifeno, citrato 276
Clomipramina, cloridrato 276
Clonazepam 278
Clonidina 279
Clopidogrel 280
Clorambucila 281
Cloranfenicol, palmitato 283
Cloranfenicol, succinato 284
Clordiazepóxido, injetável 286
Clordiazepóxido, via oral 287

Cloreto de amônio + associações, via oral 288
Cloreto de cálcio, injetável (10%) CaCl2 289
Cloreto de potássio (19,1%, KCL), injetável 290
Cloreto de potássio (KCL), via oral 291
Cloreto de sódio 0,9% e 20%, ampola 292
Cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico, SF), sistema fechado 293
Cloreto de sódio + cloreto de benzalcônio 293
Clorexidina, Dlgliconato, antisséptico bucal 294
Clorexidina, Dlgliconato, tópico 295
Cloroquina, dicloridrato 295
Cloroquina, difosfato 296
Clorpromazina, injetável 297
Clorpromazina, via oral 298
Clorpropamida 299
Clortalidona 300
Clotrimazol 302
Cloxazolam 303
Clozapina 304
Codeína, fosfato via oral 305
Codeína, injetável 306
Codergocrina, injetável 308
Codergocrina, mesilato, via oral 308
Colagenase, tópica 309
Colagenase + cloranfenicol 310
Colchicina 311
Colecalciferol (calciferol ou vitamina D3) + ergocalciferol (vitamina D2) 312
Colestiramina 313
Colistimetato (polimixina E) 314
Coriogonadotropina alfa 315
Cromoglicato dissódico 316
Dacarbazina 318
Daclatasvir 319
Daclizumabe 322
Dactinomicina 323
Dalteparina sódica 324
Danazol 326
Dapagliflozina 327
Dapsona 328
Daptomicina 329
Darifenacina 331
Darunavir 331
Dasatinibe 333
Daunorrubicina, cloridrato 334
Deferasirox 336
Deferiprona 337
Deflazacorte 338
Delamanida 339
Deltametrina 341
Desferroxamina, mesilato (deferroxamina, mesilato) 341
Desloratadina 343
Desmopressina 343
Desogestrel 344
Desonida 346
Desoximetasona 346
Desvenlafaxina 347
Dexametasona, acetato tópico 349
Dexametasona, acetato tópico ocular 350
Dexametasona, fosfato dissódico de, injetável 351
Dexametasona, via oral 353
Dexmedetomidina, injetável 355
Dextrano, injetável 356
Dextroclorfeniramina (ou dexclorfeniramina), maleato de .. 357
Dextrometorfano, Bromidrato via oral 358
Diacereína 359
Diazepam, solução injetável 359
Diazepam, via oral 360
Diazóxido 362
Diciclovérina 362
Diclofenaco, injetável 363
Diclofenaco dietilamônio 364
Diclofenaco sódico 365
Didanosina 366
Dietilcarbamazina, citrato de 367
Dietilestilbestrol 368
Difenidramina, via injetável 369
Difenoxilato + sulfato de atropina, via oral 370
Diflucortolona, tópica 371
Digoxina, via oral 371
Diidroergocristina 373
Diidroergotamina, nasal 373
Diltiazem, injetável 374
Diltiazem, via oral 375
Dimenidrinato 376
Dimenitrato + vitamina B6, injetável 377
Dimenitrato + vitamina B6, via oral 377
Dimercaprol 378
Dimeticona (Simeticona), solução oral 379
Dinitrato de isossorbida 379
Dipiridamol, injetável 381
Dipiridamol, via oral 382
Dipirona, injetável (metamizol) 383
Dipirona, prometazina e adifenina, injetável 384
Dipirona, via oral (metamizol) 385
Disopiramida 386
Dissulfiram 387
Dobutamina, cloridrato 388

Docetaxel 389
Dolasetrona 391
Dolutegravir sódico 392
Domperidona 393
Donepezila 394
Dopamina, cloridrato 395
Dornase alfa (Alfadornase – rhDNase) 396
Dorzolamida 397
Doxazosina, mesilato 398
Doxiciclina, via oral 399
Doxorrubicina, cloridrato 400
Dropropizina 402
Duloxetina 402
Dutasterida 404
Ebastina 405
Econazol, tópico 405
Eculizumabe 406
Efavirenz 409
Efedrina 410
Elbasvir + grazoprevir monidratado 411
Elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor 413
Eltrombopague olamina 414
Enalapril, maleato 415
Enentato de noretisterona + valerato de estradiol 416
Enflurano 418
Enfuvirtida 419
Enoxaparina 420
Entacapona 422
Entecavir 423
Epinastina 424
Epinefrina, injetável 424
Epirrubicina 426
Ergometrina ou ergonovina 427
Ergotamina 428
Eritromicina 429
Eritromicina lactobionato 431
Eritromicina tópica 433
Eritropoetina humana recombinante 433
Erlotinibe 435
Ertapenem 436
Escitalopram 437
Escopolamina, bultibrometo, injetável 439
Escopolamina, via oral 440
Escopolamina + dipirona, injetável 440
Escopolamina + dipirona, via oral 442
Esomeprazol 443
Espiramicina 444
Espironolactona, via oral 445
Estavudina 446
Estazolam 447
Estradiol 448
Estreptomicina, sulfato 450
Estreptoquinase 451
Estriol 1%, creme vaginal 452
Estrogênios conjugados 453
Etambutol 454
Etanercepte 455
Etansilato 456
Etilefrina, injetável 456
Etilefrina, via oral 457
Etionamida 458
Etofamida 459
Etofenamato 460
Etofibrato 461
Etoposídeo, injetável 461
Etoposídeo, via oral 462
Etoricoxibe 463
Etossuximida 464
Etravirina 465
Everolimo 467
Exemestano 468
Ezetimiba 469
Ezetimiba + sinvastatina 470
Entacapona 422
Entecavir 423
Epinastina 424
Epinefrina, injetável 424
Epirrubicina 426
Ergometrina ou ergonovina 427
Ergotamina 428
Eritromicina 429
Eritromicina lactobionato 431
Eritromicina tópica 433
Eritropoetina humana recombinante 433
Erlotinibe 435
Ertapenem 436
Escitalopram 437
Escopolamina, bultibrometo, injetável 439
Escopolamina, via oral 440
Escopolamina + dipirona, injetável 440
Escopolamina + dipirona, via oral 442
Esomeprazol 443
Espiramicina 444
Espironolactona, via oral 445
Estavudina 446
Estazolam 447
Estradiol 448
Estreptomicina, sulfato 450

Estreptoquinase 451
Estriol 1%, creme vaginal 452
Estrogênios conjugados 453
Etambutol 454
Etanercepte 455
Etansilato 456
Etilefrina, injetável 456
Etilefrina, via oral 457
Etionamida 458
Etofamida 459
Etofenamato 460
Etofibrato 461
Etoposídeo, injetável 461
Etoposídeo, via oral 462
Etoricoxibe 463
Etossuximida 464
ETRAVIRINA 465
Everolimo 467
Exemestano 468
Ezetimiba 469
Ezetimiba + sinvastatina 470
Famotidina 472
Fanciclovir 472
Fator de coagulação VII ativado recombinante 473
Fator de coagulação VIII, concentrado 474
Fator de coagulação IX, concentrado derivado de plasma humano 475
Fatores de coagulação II, VII, IX e X em combinação (complexo protrombínico ativado) 475
Felodipino 476
Femprocumona 477
Fenazopiridina 478
Fenilbutazona 479
Fenilefrina, colírio 480
Fenilefrina, nasal (em associação) 481
Fenipolimatose 482
Fenitoína, via oral 483
Fenitoína sódica, injetável 484
Fenobarbital, injetável 486
Fenobarbital, via oral 489
Fenofibrato 491
Fenoprofeno 492
Fenoterol 493
Fenoxazolina 494
Fenoximetilpenicilina potássica 495
Fentanila, injetável 496
Fentanila, transdérmica 498
Fenticonazol 499
Fentolamina 500
Fexofenadina 501
Fibrinogênio 501
Fibrinolisina + desoxirribonuclease 502
Filgrastim 503
Finasterida 504
Fingolimode 505
Fitomenadiona (vitamina K) 507
Flavoxato 509
Flucitosina 510
Fluconazol, injetável 511
Fluconazol, via oral 512
Fludarabina, injetável 514
Fludrocortisona 515
Fludroxicortida 516
Flumazenil 517
Flumetasona, em associação 518
Flunarizina 519
Flunitrazepam 520
Fluocinolona acetonida + sulfato de polimixina b + sulfato de neomicina + cloridrato de lidocaína 521
Fluocinolona e associações 522
Fluocortolona, tópica, em associação 523
Fluoreto de sódio 524
Fluormetolona 524
Fluoruracila 525
Fluoruracila, creme 526
Fluoxetina 527
Flurazepam 528
Flurbiprofeno 529
Flurbiprofeno Via Oral 530
Flurbiprofeno Adesivo 531
Flutamida 532
Fluticasona, inalação oral 533
Fluticasona, nasal 534
Flutrimazol 536
Fluvastatina 536
Fluvoxamina 537
Folinato de cálcio (ácido folínico), injetável 538
Folínico, ácido (folinato de cálcio) 539
Folinato de cálcio (ácido folínico), via oral 540
Fondaparinux 541
Formoterol + budesonida 542
Formoterol, fumarato 543
Fosamprenavir 544
Fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol 545
Fosfato de sódio monobásico e dibásico 546
Fosfomicina trometanol 547
Fosinopril 547
Fostensavir 548

Fulvestranto 549
Furazolidona 550
Furosemida, injetável 551
Furosemida, via oral 552
Fumarato de dimetila 554
Fumarato de tenovir desoproxila + entricitabina 555
Fumarato de tenovir desoproxila + lamivudina 557
Furosemida, via oral 560
Gabapentina 562
Galantamina 562
Galsulfase 563
Ganciclovir sódico 565
Ganirrelix 566
Gatifloxacino, injetável 567
Gatifloxacino, solução oftálmica 568
Gatifloxacino, via oral 569
Gefitinibe 570
Gencitabina, cloridrato 571
Genfibrozila 573
Gentamicina, colírio 574
Gentamicina, sulfato 574
Gestrinona 576
Glatirâmer 577
Glecaprevir + pibrentasvir 578
Glibenclamida 580
Gliclazida 581
Glicerol 582
Glicose 25 e 50% 582
Glicose (soro glicosado) 583
Glipizida 584
Glucagon 585
Glucametacina 585
Gluconato de cálcio (gliconato de cálcio) 586
Golimumabe 587
Gonadotrofina coriônica humana 589
Gosserrelina 590
Granisetrona, injetável 591
Griseofulvina 592
Guaifenesina 593
Halcinonida 595
Haloperidol, solução, injetável 596
Haloperidol, via oral 597
Haloperidol, Decanoato, injetável 599
Halotano 600
Hemitartarato de norepinefrina 601
Heparina 603
Hexamidina + Tetracaína oral 604
Hialuronidase 605
Hidralazina, injetável e via oral 606
Hidroclorotiazida 608
Hidrocortisona, succinato sódico 609
Hidrocortisona, Acetato tópico 610
Hidromorfona 611
Hidroquinona 613
Hidroxicloroquina, Sulfato (Hidroxicloroquina) 614
Hidróxido de alumínio 615
Hidróxido de ferro (sacarato de hidróxido férrico) via intravenosa 616
Hidróxido de ferro (sacarato de hidróxido férrico) via intramuscular 619
Hidróxido de magnésio 622
Hidroxietilamido 622
Hidroxiprogesterona 624
Hidroxiureia 625
Hidroxizina, cloridrato 626
Hidroxocobalamina (vitamina B12) 627
Hipoclorito 628
Hipromelose 628
Homatropina, Metilbrometo, via oral 629
Ibandronato de sódio 631
Ibuprofeno 631
Idarrubicina, cloridrato 633
Idoxuridina 634
Idursulfase 635
Ifosfamida 636
Iloprosta 638
Imatinibe 639
Imiglucerase 640
Imipenem + Cilastatina 641
Imipramina, cloridrato 644
Imiquimode 645
Imunoglobulina anti-hepatite B 646
Imunoglobulina Anti RHO 648
Imunoglobulina antirrábica 649
Imunoglobulina Antitimócito (Lymphocyte Immune Globulin) 650
Imunoglobulina antivaricela zóster 651
Imunoglobulina G Antitetânica 652
Imunoglobulina humanA 653
Imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos 654
Indapamida 655
Indinavir 656
Indometacina, supositório 657
Indometacina, via oral 659
Infliximabe 660
Insulina Aspart 662
Insulina Detemir 663
Insulina Glargina 665

Insulina Glulisina 667
Insulina Lispro 669
Insulina NPH Humana 671
Insulina Regular Humana 672
Interleucina-2 recombinante (também conhecida como Aldesleucina) 674
Iodeto de potássio 676
Iodopovidona (PVPI) 677
Ipratrópio, brometo 677
Ipriflavona 678
Irbesartana 679
Irinotecana 680
Isoconazol 682
Isoflurano 683
Isometepteno + Cafeína + Dipirona 684
Isoniazida 686
Isoniazida + Rifampicina 687
Isossorbida, dinitrato, via oral 689
Isossorbida, mononitrato, injetável 690
Isossorbida, mononitrato, via oral 691
Isotretinoína tópico 692
Isotretinoína, via oral 693
Isoxsuprina, injetável 694
Isoxsuprina, via oral 695
Israpidino 696
Itraconazol 698
IVACAFTOR 699
Ivermectina 702
Lacidipina 703
Lactulose (ou Lactulona) 703
Lamivudina 704
Lamotrigina 705
Lanatosídeo C (Deslanosídeo, Deslanósido) 707
Lanreotida 707
Lansoprazol 709
Laronidase 710
Latanoprosta, oftálmico 712
Ledipasvir + sofosbovir 713
Leflunomida 723
Lenograstima (ou Lenograstim) 725
Lercanidipina 728
Letrozol 729
Leucovorina, via oral 730
Leuprolida, acetato 731
Leuprorrelina 732
Levamizol (ou Levamisol) 733
Levetiracetam 734
Levobunolol 739
Levodopa + Benserazida 740
Levodopa + Carbidopa 742
Levodropropizina 743
Levofloxacina, injetável 744
Levofloxacina 746
Levomepromazina, injetável 748
Levomepromazina, via oral 749
Levonorgestrel (Pílula do dia seguinte) 750
Levonorgestrel + Etinilestradiol 751
Levosimendana, injetável 752
Levotiroxina sódica 754
Lidocaína, cloridrato com epinefrina (com vasoconstritor) . 755
Lidocaína, Cloridrato sem vasoconstritor (sem epinefrina) . 756
Lidocaína, gel e pomada 758
Lidocaína, Spray 759
Limeciclina 760
Linagliptina 760
Lincomicina, injetável 761
Lincomicina, via oral 762
Linezolida, injetável 763
Linezolida, via oral 764
Liraglutida 765
Lisinopril 766
Lítio, carbonato 767
Lomefloxacino, cloridrato 768
Lomustina 770
Loperamida 771
Lopinavir + Ritonavir 771
Loratadina 772
Lorazepam 773
Losartana 774
LovastatinA 775
Loxoprofeno sódico 776
Magaldrato 777
Manitol 20% 778
Maprotilina 779
Maraviroque 780
Mebendazol 781
Mebeverina 782
Medroxiprogesterona, acetato 783
Medroxiprogesterona, injetável 784
Mefloquina, cloridrato 785
Megestrol, acetato 786
Meglumina, antimoniato 786
Melfalana 787
Meloxicam, injetável 788
Meloxicam, via oral 789
Memantina 790
Menotrofina (Menotropina) 791
Mepartricina + tetraciclina, creme e óvulo vaginal 792

Meperidina, injetável (petidina) ... 793
Mepolizumabe ... 794
Mequinol ... 797
Mercaptopurina ... 797
Meropenem ... 798
Mesalazina ... 800
Mesilato de rasagilina ... 801
Mesna, injetável ... 803
Mesna, via oral ... 803
Mesterolona ... 804
Metadona, injetáveL ... 805
Metadona, Via oral ... 806
Metaraminol ... 807
Metenamina (mandelato), associação ... 808
Metformina ... 809
Metilcelulose, via oral, associação ... 810
Metildigoxina ... 810
Metildopa ... 812
Metilergometrina, injetável ... 813
Metilergometrina, via oral ... 815
Metilfenidato, via oral ... 816
Metilprednisolona, injetável ... 817
Metiltestosterona, via oral ... 818
Metiltionínio, cloreto (Azul de metileno) ... 820
Metisergida ... 820
Metoclopramida, injetável ... 821
Metoclopramida, via oral ... 823
Metoprolol, injetável ... 824
Metoprolol, tartarato, via oral ... 825
Metotrexato, via oral ... 826
Metotrexato de sódio, injetável ... 827
Metronidazol, injetável ... 829
Metronidazol, tópico ... 830
Metronidazol, Via oral ... 831
Mianserina ... 832
Micofenolato de mofetila e micofenolato de sódio ... 833
Miconazol ... 834
Midazolam, cloridrato, injetável ... 835
Midazolam, via oral ... 836
Miglustate ... 837
Milrinona, injetável ... 837
Miltefosina ... 839
Minociclina ... 839
Minoxidil, solução capilar ... 840
Minoxidil, Via Oral ... 841
Mirtazapina ... 843
Misoprostol ... 844
Mitomicina, injetável ... 845
Mitotano ... 846
Mitoxantrona ... 848
Moclobemida ... 849
Modafinila ... 851
Molgramostim ... 852
Mometasona, Furoato – pó para inalação oral ... 853
Mometasona, spray nasal ... 855
Mometasona, tópica ... 858
Monossulfiram ... 858
Montelucaste ... 859
Morfina, injetável ... 860
Morfina, via oral ... 862
Moxifloxacino, injetável ... 864
Moxifloxacino, via oral ... 865
Moxonidina ... 866
Mupirocina, tópica ... 866
Muromonabe CD3 ... 867
Nabumetona ... 868
Nadolol ... 869
Nadroparina cálcica ... 870
Nafarelina, spray nasal ... 871
Nafazolina, nasal ... 872
Nafazolina, oftálmica ... 872
Nalbufina ... 873
Naloxona, cloridrato ... 875
Naltrexona ... 876
Nandrolona ... 878
Naproxeno ... 879
Naratriptano ... 880
Natalizumabe ... 881
Nateglinida ... 882
NEBIVOLOL ... 882
Nelarabina ... 883
Nelfinavir ... 884
Neomicina + bacitracina ... 885
Neomicina + Clostebol ... 886
Neostigmina, Metilsulfato ... 887
Nevirapina ... 888
Niacina, via oral (ou Vitamina B3, ou Ácido Nicotínico) ... 889
Nicergolina ... 890
Niclosamida ... 890
Nicotina ... 891
Nicotínico, ácido ... 892
Nifedipina ... 894
Nimesulida ... 895
Nimodipino, injetável ... 897
Nimodipino, via oral ... 898
Nimorazol ... 900
Nirmatrelvir + ritonavir ... 900
Nistatina, tópica ... 902

Nistatina, via Oral ... 902
Nitrato de prata, colírio ... 903
Nitrazepam ... 903
Nitrendipino ... 904
Nitrito de sódio ... 905
Nitrofurantoína ... 906
Nitrofurazona, tópica ... 907
Nitroglicerina, injetável ... 907
Nitroglicerina transdérmica ... 909
Nitroprussiato (ou Nitroprusseto) de sódio ... 910
Nizatidina ... 912
Nomegestrol ... 912
Noretisterona, Acetato ... 913
Noretisterona, Enantato e Valerato de estradiol, solução injetável ... 914
Norfloxacina ... 915
Nortriptilina, Cloridrato ... 916
Nusinersena ... 917
Octreotida ... 919
Ofloxacino ... 919
Ofloxacino, colírio 0,3% ... 920
Olanzapina ... 921
Óleo de rícino, frasco ... 922
Óleo Mineral Purificado ... 922
Olmesartana ... 923
Olopatadina, solução oftálmica ... 924
Omalizumabe, Injetável ... 925
Omeprazol ... 926
Omeprazol, injetável ... 927
Onasemnogeno ... 928
Ondansetrona, cloridrato, injetável ... 929
Ondansetrona, cloridrato, via oral ... 929
Oprelvecina ... 930
Orfenadrina (associada à Dipirona + Cafeína) ... 931
Orlistate ... 933
Oseltamivir ... 935
Oxacilina sódica ... 936
Oxaliplatina ... 937
Oxamniquina ... 938
Oxcarbazepina ... 938
Oxibutinina ... 939
Oxicodona ... 941
Oxiconazol, tópico ... 943
Oximetazolina ... 944
Oximetolona ... 944
Oxitetraciclina, injetável ... 946
Oxitetraciclina, via oral ... 948
Paclitaxel ... 950
Palivizumabe ... 951
Palonosetrona ... 952
Pamidronato dissódico ... 952
Pamoato de pasireotida ... 953
Pancreatina ... 954
Pancrelipase ... 955
Pancurônio, brometo ... 955
Papaverina, injetável ... 956
Paracetamol (Acetaminofeno) ... 957
Paricalcitol ... 958
Paroxetina ... 960
Pasta d'água ... 961
Pefloxacina, injetável ... 961
Pefloxacina, via oral ... 962
Pegfilgrastima (Pegfilgrastim) ... 963
Pembrolizumabe ... 964
Pemetrexede ... 967
Penciclovir ... 968
Penicilamina, cloridrato ... 969
Pentamidina, isetionato ... 970
Pentoxifilina, injetável ... 971
Pentoxifilina, via oral ... 972
Periciazina ... 972
Perindopril ... 973
Permanganato de potássio ... 974
Permetrina ... 975
Peróxido de benzoíla ... 976
Picossulfato Sódico ... 976
Pilocarpina, cloridrato ... 977
Pimecrolimo ... 978
Pindolol ... 978
Pioglitazona ... 979
Piperaciclina + Tazobactam ... 981
Piperazina, via oral ... 982
Piracetam, injetável ... 983
Piracetam, via oral ... 984
Pirazinamida ... 985
Piretanida ... 986
Piridostigmina ... 987
Piridoxina, cloridrato (Vitamina B6) ... 988
Pirimetamina, sulfato ... 989
Piroxicam, injetável ... 989
Piroxicam, via oral e supositório ... 991
Pizotifeno ... 992
Plantago ... 992
Podofilina (Podofilotoxina) ... 994
Pralidoxima, mesilato ... 994
Pramipexol ... 995
Pravastatina ... 996
Praziquantel ... 997

Prazosina 997
Prednicarbato, tópico 998
Prednisolona, fosfato sódico 999
Prednisolona, oftálmico 1000
Prednisona 1001
Pregabalina 1002
Pretomanida 1003
Prilocaína, cloridrato + Felipressina (Octapressina) 1004
Primaquina, difosfato 1005
Primidona 1006
Prometazina, cloridrato, injetável 1007
Prometazina, cloridrato, via oral 1008
Propafenona, via oral e injetável 1009
Propanolol, injetável 1010
Propanolol, via oral 1012
Propiltiouracila (Propiltiouracil) 1013
Propofol 1014
Protamina, cloridrato 1015
Quetiapina, fumarato 1016
Rabeprazol 1017
Racecadotril 1017
Raloxifeno 1018
Raltegravir 1019
Raltitrexede (raltitrexato) 1020
Ramipril 1021
Ranitidina 1023
Ranitidina, cloridrato, via oral 1024
Ravulizumade 1026
Retinol (vitamina a) 1026
Retinol, palmitato 1027
Remifentanila 1028
Repaglinida 1029
Ribavirina 1030
Riboflavina, injetável + Associações (Vitamina B2 + Associações) 1031
Riboflavina, via oral + Associações (Vitamina B2 + Associações) 1033
Rifabutina 1034
Rifamicina, injetável 1034
Rifamicina, spray 1035
Rifampicina 1036
Rifampicina + izoniazida 1037
Rifampicina + izoniazida + pirazinamida+ etambutal 1040
Rifopentina + isoniazida 1043
Rilmenidina 1043
Riluzol 1044
Ringer e ringer lactato 1045
Risdiplam 1046
Risedronato sódico 1047
Risperidona 1047
Ritonavir 1048
Rituximabe 1050
Rivaroxabana 1051
Rivastigmina 1052
Risanquizumabe 1053
Romosozumabe 1054
Rosuvastatina cálcica 1055
Salbutamol, injetável 1056
Salbutamol, spray e soluçÃo inalante 1057
Salbutamol, via Oral 1058
Salmeterol 1059
Sapropterina 1060
Saquinavir 1061
Secuquinumabe 1062
Selante de fibrina 1064
Selegilina, cloridrato 1065
Selexipague 1065
Sertralina, Cloridrato 1068
Sevelamer 1070
Sibutramina 1070
Sildenafila 1072
Simeprevir sódico 1073
Sinvastatina 1077
Sirolimo 1078
Sitagliptina, Fosfato 1078
Sódio, acetato 1079
Sofosbuvir 1080
Somatropina 1082
Sotalol 1083
Succinato de tafenoquina 1085
Sulfadiazina 1086
Sulfadiazina de Prata 1087
Sulfametoxazol + Trimetoprima (Oral e Injetável) 1088
Sulfassalazina 1089
Sulfato de isavuconazônio 1090
Sulfato de magnésio, injetável 1090
Sulfato de magnésio, oral 1091
Sulfato de zinco 1092
Sulfato ferroso, via oral 1093
Sumatriptano (Sumatriptana) 1094
Sunitinibe 1095
Suxametônio, Cloreto (Succinilcolina) 1096
Tacrolimo 1098
Tacrolimo, tópico 1099
Tacrolimo, via oral 1099
Tadalafila 1100
Tafamidis 1101
Talidomida 1103

Taliglucerase alfa 1104
Tamoxifeno 1105
Tansulosina, cloridrato 1106
Teclozana 1107
Tegaserode (tegaserod) 1107
Teicoplamina 1108
Telaprevir 1109
Telitromicina 1110
Telmisartana 1111
Temozolomida 1112
Tenecteplase 1112
Teniposídeo 1113
Tenofovir desoproxila, fumarato 1114
Teofilina 1115
Terbutalina, sulfato, injetável 1117
Teriflunomida 1118
Terizidona 1120
Tetraciclina, cloridrato, pomada oftálmica 1121
Tiamazol (Metimazol) 1121
Tiamina (Vitamina B1), injetável 1122
Tiamina (Vitamina B1), via oral 1122
Timolol, maleato 1123
Tinidazol 1124
Tioguanina 1125
Tiopental sódico 1125
Tiossulfato de sódio 1126
Tipranavir 1127
Tirofibana, cloridrato 1129
Tocilizumabe 1130
Tobramicina 1131
Tolcapona 1133
Topiramato 1134
Toremifeno 1135
Toxina butolínica 1136
Toxina botulínica tipo a 1137
Tramadol, cloridrato, injetável 1139
Tramadol, cloridrato, via oral 1140
Travoprosta 1141
Trazodona, cloridrato 1143
Trientina 1145
Triexifenidil 1146
Triptorrelina 1146
Upadacitinibe 1148
Ureia 1149
Ursodesoxicólico, ácido 1150
Ursodiol ou ácido ursodesoxicólico 1151
Ustequinumabe 1152
Valaciclovir 1156
Valganciclovir 1157
Valproato de sódio 1158
Valsartana 1164
Vancomicina, cloridrato 1165
Vardenafila 1168
Vareniclina 1169
Varfarina 1172
Vecurônio 1175
Vedolizumabe 1176
Venlafaxina 1178
Verapamil, cloridrato, injetável 1179
Verapamil, cloridrato, via oral 1181
Vigabatrina 1182
Vildagliptina 1185
Vimblastina, sulfato 1186
Viminol 1187
Vincristina, sulfato de 1187
Vinorelbina 1189
Violeta de genciana 1190
Vitamina A + Aminoácido + Cloranfenicol, oftálmica 1190
Vitamina A + D, Pomada 1191
Vitamina A + D, via oral 1191
Vitamina A (Retinol), injetável 1193
Vitamina A (Retinol), via oral 1193
Vitamina B2 + Associações (Riboflavina injetável + Associações) 1196
Vitamina B2 + Associações (Riboflavina oral + Associações) 1198
Vitamina E (tocoferol) 1199
Vitelinato de Prata 1199
Voriconazol, injetável 1200
Voriconazol, via oral 1201
Xilometazolina, nasal 1205
Zafirlucaste 1206
Zanamivir 1206
Zidovudina, injetável 1208
Zidovudina, via oral 1210
Zidovudina + lamivudina 1211
Ziprasidona, Via Oral e IntraMuscular 1214
Zolpidem, hemitartarato 1215

HOMEOPÁTICOS

Acidum aceticum 1216
Acidum carbolicum 1216
Acidum formicum 1217
Acidum lacticum 1217
Acidum nitricum 1218
Acidum oxalicum 1218
Acidum phosphoricum 1218
Acidum salicylicum 1219

Acidum sulphuricum 1219
Adrenalinum 1220
Aesculus hippocastanum 1220
Allium cepa 1221
Alumen 1221
Ammonium carbonicum 1222
Ammonium muriaticum 1223
Ammonium phosphoricum 1223
Anacardium orientale 1223
Apis mellifica 1225
Argentum nitricum 1225
Arnica montana 1226
Avena sativa 1227
Baryta carbonica 1228
Baryta iodada 1228
Baryta muriatica 1229
Belladonna 1229
Borax 1229
Bryonia alba 1230
Calcarea carbonica 1231
Calcarea muriatica 1231
Calcarea phosphorica 1231
Calcarea sulphurica 1232
Calendula officinalis 1232
Carduus marianus 1232
Chamomilla 1233
Chelidonium 1233
Cuprum metallicum 1233
Cyclamen europaeum 1234
Dulcamara 1235
Echinacea angustifolia 1236
Ethylicum 1236
Ferrum metallicum 1237
Ferrum sulphuricum 1237
Gelsemium 1238
Ginkgo biloba 1238
Glicerol 1239
Glonoinum 1240
Guaiacum officinale 1240
Hydrastis canadensis 1241
Hyoscyamus niger 1241
Hypericum perforatum 1242
Ignatia amara 1243
Iodium 1243
Ipecacuanha 1243
Kali bichromicum 1245
Kali bromatum 1245
Kali iodatum 1245
Kali muriaticum 1246
Kali phosphoricum 1246
Lobelia inflata 1247
Lycopodium clavatum 1247
Magnesia carbonica 1248
Magnesia muriatica 1248
Magnesia phosphorica 1249
Mercurius sulphuratus ruber 1249
Natrium carbonicum 1250
Natrium muriaticum 1250
Natrium sulphuricum 1250
Nux vomica 1251
Paeonia officinalis 1252
Parreira brava 1252
Phytolacca decandra 1252
Rhus toxicodendron 1253
Ricinus communis 1253
Ruta graveolens 1253
Staphysagria 1254
Sulphur 1254
Taraxacum officinale 1255
Thuya occidentalis 1255

FITOTERÁPICOS

Aroeira – schinus terebinthifolius 1256
Alcachofra 1257
Babosa 1258
Cáscara sagrada 1259
Espinheira-santa 1260
Garra do diabo 1261
Guaco 1261
Hortelã 1263
Unha-de-gato 1264
Índice de nome comercial 1265
Índice de Classificação farmacológica 1283

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAL DE TERATOGENICIDADE DO MEDICAMENTO

CATEGORIA	DEFINIÇÃO
A	Estudos controlados em humanos não demonstraram risco para o feto durante o primeiro trimestre, nem a possibilidade de más-formações. Estudos controlados em humanos não demonstraram risco para o feto durante o primeiro trimestre, e a possibilidade de más-formações congênitas parece remota.
B	a) Estudos em animais não demonstraram risco para o feto, no entanto, não foram realizados estudos controlados em humanos. b) Estudos em animais demonstraram riscos para o feto, o que não foi confirmado por estudos controlados em humanos.
C	a) Estudos em animais detectaram efeito teratogênico, mas não há disponibilidade de estudos controlados em humanos. b) Não foram realizados estudos em animais nem em humanos.
D	Existe evidência de risco fetal em humanos, no entanto, o benefício do medicamento em determinadas circunstâncias pode superar o risco.
X	Estudos em animais e humanos mostram clara evidência de efeitos teratogênicos, e o risco do uso do medicamento supera o benefício.

ALOPÁTICOS

ABACAVIR, SULFATO DE

CLASSIFICAÇÃO RENAME 2022: Anti-infecciosos para uso sistêmico.

NOME COMERCIAL: Ziagenavir.

MECANISMO DE AÇÃO: Inibidor da transcriptase reversa nucleosídeo; análogo da guanosina (fosforilado em carbovir trifosfato), que interfere na DNA polimerase dependente do RNA viral do HIV, causando inibição da replicação viral.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Absorção oral = Rápida e extensiva, não alterada na presença de alimentos.

Biodisponibilidade oral = 83%

Tmáx = 1,0 a 1,5 horas

Vd = 0,86 L/kg

Ligação a proteínas = 27 a 33%

Metabolismo = hepático, via álcool desidrogenase e glucuronil--transferase em metabólitos inativos: 5'-carboxilato e 5'-glicuronídeo

Meia-vida de eliminação = 1,5 hora

Excreção = Fezes e urina

Ajuste de dose = IH: contraindicado na IH moderada e grave. IR: Não necessita de ajuste de dose.

INDICAÇÃO: Tratamento de infecções pelo vírus HIV em combinação com outros agentes antirretrovirais. Sulfato de Abacavir + Lamivudina é uma combinação de dois análogos de nucleosídeos (abacavir e lamivudina). É indicado na terapia antirretroviral combinada contra a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em adultos e crianças a partir de 12 anos de idade.

REAÇÕES ADVERSAS: Comuns: *rash* cutâneo; náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal; cefaleia, fadiga e mal-estar, sonhos anormais, febre, depressão, tontura, ansiedade; trombocitopenia; aumento TGO; dor musculoesquelética; infecção respiratória viral, bronquite; reações de hipersensibilidade: anafilaxia, artralgia, cefaleia, conjuntivite, dispneia, dor abdominal, edema, fadiga, faringite, insuficiência hepática e renal, letargia, linfadenopatia, mialgia, miólise, parestesia, eritema multiforme, sintomas respiratórios como insuficiência respiratória, tosse, ulcerações bucais. **Raras:** acidose lática, hepatotoxicidade, necrólise epidérmica tóxica, pancreatite, síndrome de Stevens-Johnson. **Exclusivo Solução Oral:** Quase todos os pacientes que desenvolvem reações de hipersensibilidade têm febre e/ou exantema (em geral maculopapular ou de urticária) como parte da síndrome. Contudo, as reações ocorreram sem exantema nem febre.

RISCOS NA GRAVIDEZ: C. A administração de Abacavir na gravidez deve ser considerada somente se o benefício para a mãe for maior que o risco para o feto.

HIPERSENSIBILIDADE: A reação de hipersensibilidade ao Abacavir foi bem caracterizada durante os estudos clínicos e durante o acompanhamento após comercialização. Os sintomas aparecem usualmente nas primeiras seis semanas (tempo médio para início de 11 dias) após início do tratamento com Abacavir, embora essas reações possam ocorrer a qualquer momento durante a terapia. Quase todas as reações de hipersensibilidade ao Abacavir incluem febre ou erupção cutânea como parte da síndrome. Abacavir deve ser interrompido imediatamente, caso haja suspeita de reação de hipersensibilidade. O atraso na suspensão do tratamento com Abacavir após o início da hipersensibilidade pode resultar em uma reação com risco de vida.

LACTAÇÃO: Excreção no leite materno desconhecida. Uso contraindicado.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral – pode ser administrado com ou sem alimento. Se houver desconforto GI, administrar com alimentos.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Antirretroviral, inibidor da transcriptase reversa (nucleotídeo).

APRESENTAÇÃO: Comprimidos de 300 mg e solução oral de 20 mg/ml.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Álcool: aumento de cerca de 40% na área sob a curva (AUC) do abacavir, em gráfico de concentração x tempo. O abacavir não tem efeito sobre o metabolismo do álcool, recomendado: administrar com precaução; Nevirapina (aumento do efeito antiviral – associação útil em terapia). Em um estudo de farmacocinética, o fármaco aumentou o *clearance* sistêmico médio da metadona em aproximadamente 22%. A alteração não é clinicamente relevante para a maioria dos pacientes, mas um ajuste de dosagem da metadona pode ser ocasionalmente necessário.

POSOLOGIA: AIDS: 300 mg/dose x 2. Crianças: de 1 a 3 meses: 8 mg/kg/dose x 2 (posologia ainda sem referência); de 3 meses a 12 anos: 8 mg/kg/dose x 2. Dose máxima: 600 mg/dia.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente e ao abrigo de luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade, disfunção hepática, gestação e lactação.

CUIDADOS MÉDICOS: Deve-se monitorizar: hemograma completo com contagem diferencial, creatina cinase sérica, contagem CD4, níveis plasmáticos de RNA do HIV, transaminases séricas, triglicerídeos, amilase sérica, estado do genótipo HLA-B*5701 antes do início ou reinício da terapia em pacientes com estado desconhecido do HLA-B*5701.

Deve-se observar sinais e sintomas de hipersensibilidade. Não se recomenda como esquema inicial de tratamento a associação do abacavir com lamivudina e tenofovir. O uso desta medicação não é indicado em pacientes com disfunção hepática moderada a grave; o uso prolongado da medicação pode aumentar o risco de hepatotoxicidade em mulheres e obesos. Os pacientes sob tratamento com Abacavir ou qualquer outro antirretroviral podem desenvolver infecções oportunistas e outras complicações relacionadas à infecção pelo HIV. Portanto, esses pacientes devem permanecer sob acompanhamento clínico de médicos especializados no tratamento de doenças associadas à infecção pelo HIV.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Penetra no líquido cefalorraquidiano. O abacavir é uma alternativa importante para pacientes com função renal comprometida.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Monitorar durante a terapia as funções hepática e renal, os reflexos e os movimentos peristálticos GI. Pode causar elevação das enzimas hepáticas. Observar sinais e sintomas de reações adversas comuns. Atentar e orientar para riscos de quedas do paciente devido a tontura e mal-estar. Orientar e estimular oferta de líquidos pelo risco de desidratação.

ABATACEPTE

CLASSIFICAÇÃO RENAME 2022: Agentes antineoplásicos e imunomoduladores.

NOME COMERCIAL: Orencia.

MECANISMO DE AÇÃO: Inibe a ativação das células T (linfócitos-T), ligando-se às moléculas CD80 e CD86 presentes nas células apresentadoras de antígeno, com isso, ocorre o bloqueio da interação CD28 necessária entre as células apresentadoras de antígeno e as células-T. Os linfócitos-T ativados são encontrados na sinóvia de pacientes com artrite reumatoide.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Distribuição = Vss: 0,02-0,13 L/kg

Meia-vida de eliminação = 8 a 25 dias

Ajuste de dose = IH e IR – sem recomendações específicas nas literaturas consultadas.

INDICAÇÃO: Artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil. Abatacepte (substância ativa deste medicamento) é indicado para a redução dos sinais e sintomas, indução de resposta clínica principal, inibição da progressão do dano estrutural e melhora da função física em pacientes adultos com artrite reumatoide de atividade moderada a grave. Abatacepte (substância ativa deste medicamento) pode ser usado como monoterapia ou em combinação com drogas anti-reumáticas modificadoras de doença (DMARDs), que não sejam antagonistas do fator de necrose tumoral (TNF).

REAÇÕES ADVERSAS: Cefaleia, náuseas, nasofaringite, infecção do trato respiratório superior, tontura, tosse, dispepsia, hipertensão, câncer de pulmão, linfoma.

RISCOS NA GRAVIDEZ: C. A administração de vacinas vivas a crianças expostas ao Abatacepte (substância ativa deste medicamento) no útero não é recomendada por 10 semanas após a última exposição da mãe ao Abatacepte (substância ativa deste medicamento) durante a gravidez.

LACTAÇÃO: É desconhecido se excretado no leite humano. Uso não recomendado durante lactação.

ADMINISTRAÇÃO: IV e SC. A Injeção de Abatacepte (substância ativa deste medicamento) 125 mg/seringa não deve ser usada para infusão IV.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Antirreumático; Modificador de doença.

APRESENTAÇÃO: Pó para preparação injetável de 250 mg.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Pode ter risco aumentado de causar infecção com: bloqueador do fator de necrose tumoral (p. ex. adalimumab, etanercept, infliximab).

POSOLOGIA: Artrite reumatoide:

Adultos: Administração em perfusão intravenosa de 30 minutos na dose especificada. Após a administração inicial, deve ser administrado 2 e 4 semanas após a primeira perfusão, e depois cada 4 semanas.

60 kg – dose 500 mg

60 kg a 100 kg – dose 750 mg

> 100 kg – dose 1.000 mg

Artrite idiopática juvenil:

Crianças: A dose recomendada para doentes de 6 a 17 anos de idade com artrite idiopática juvenil que pesam menos de 75 kg é 10 mg/kg, calculada com base no peso corporal do doente em cada administração. Aos doentes pediátricos com peso igual ou superior a 75 kg deve ser administrado de acordo com o regime posológico do adulto, sem exceder a dose máxima de 1.000 mg. Deve ser administrado como perfusão intravenosa de 30 minutos. Após a administração inicial, deve ser administrado 2 e 4 semanas após a perfusão inicial e, depois, a cada 4 semanas.

A segurança e a eficácia em crianças com idade inferior a 6 anos não foram estudadas e, consequentemente, não é recomendada a utilização em crianças de idade inferior a esta idade.

ARMAZENAMENTO: Armazenar sob refrigeração, entre 2 a 8 °C, protegido da luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Diluir com 10 ml de água destilada estéril. Utilizar a seringa de silicone fornecida pelo fabricante.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: SF 0,9%. A solução é estável por 24 horas em temperatura ambiente ou sob refrigeração.

CONTRAINDICAÇÕES: Abatacepte (substância ativa deste medicamento) não deve ser administrado concomitantemente com antagonistas de TNF. Não se recomenda a administração de Abatacepte (substância ativa deste medicamento) conco-

Não administrar por via EV por causa de reações adversas graves.

O analgésico opioide diminui ou inibe a formação de saliva, contribuindo para o desenvolvimento da cárie, doença periodontal, candidíase oral e certo desconforto.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Não utilizar se a solução injetável apresentar precipitado ou coloração.

Exclusivo Solução Injetável/Solução Oral: Crianças são mais susceptíveis aos efeitos da codeína injetável, principalmente os de depressão respiratória.

CODERGOCRINA, INJETÁVEL

NOME COMERCIAL: Hydergine.

MECANISMO DE AÇÃO: Modifica a neurotransmissão cerebral, e há evidências de um efeito estimulante sobre os receptores de dopamina e serotonina e de um efeito bloqueador ao nível dos alfa-adrenoceptores; melhora a função metabólica cerebral comprometida, melhorando a captação e a utilização da glicose e do oxigênio pelo cérebro.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Vd = 16 L/kg aproximadamente

Ligação a proteínas = 81%

Metabolismo = Hepático

Meia-vida de eliminação = Bifásica, com meia-vida curta de 1,5 a 2,5 horas (fase alfa) e outra mais longa, de 13 a 15 horas (fase beta)

Excreção = Fezes

Ajuste de dose = IH: na insuficiência hepática moderada a grave, fazer rigoroso monitoramento; Uma dose inicial mais baixa pode ser considerada e uma dose de manutenção mais baixa pode ser requerida. IR: não necessita de ajuste de dose.

INDICAÇÃO: Insuficiência vascular cerebral, sintomas relacionados à hipertensão cerebral, declínio da capacidade mental.

Sinais e sintomas de deterioração mental, especialmente aqueles relacionados ao envelhecimento: tontura, cefaleia, pouca concentração, desorientação, comprometimento da memória, falta de iniciativa, depressão do humor, insociabilidade, dificuldades com as atividades diárias e cuidados pessoais; Doença vascular cerebral aguda; Distúrbios vasculares periféricos; Sintomas subjetivos associados a hipertensão arterial.

REAÇÕES ADVERSAS: Náuseas, dispepsia, obstrução nasal, hipotensão.

RISCOS NA GRAVIDEZ: X.

LACTAÇÃO: Excreção no leite materno desconhecida. Uso contraindicado, pois inibe a secreção de prolactina.

ADMINISTRAÇÃO: EV/IM.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Vasodilatador cerebral.

APRESENTAÇÃO: 0,3 mg/ml – ampolas de 1 ml.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Eritromicina, claritromicina, ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdina, cetoconazol, itraconazol, voriconazol (aumento da exposição à codergocrina pode aumentar, e efeitos predominantemente dopaminérgicos exacerbados podem ser induzidos).

POSOLOGIA: Uso injetável:

Adultos: 0,3 mg, 1 ou 2 vezes ao dia, via intravenosa por infusão gota a gota ou injeção EV lenta.

Pode-se utilizar como alternativas as vias subcutânea ou intramuscular, administrando-se 0,3 mg (1 ml) 1 ou 2 x/dia.

Se necessário, pode-se administrar por via intra-arterial (0,3 a 0,6 mg = 1 a 2 ml) preferencialmente diluído em 10 a 20 ml de SF 0,9%.

Em casos graves de moléstias vasculares periféricas, associar ao tratamento oral 0,3 a 0,6 mg (1 a 2 ml), por via IM ou SC, 1 ou 2 x/dia.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 a 30 °C, protegido da luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: SF 0,9% ou SG 5%. Se uso EV lento (bolus), diluir com 20 ml de SF 0,9% ou SG5%.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: EV lento: Diluir em 20 ml de SF 0,9% ou SG 5%.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade ao fármaco ou aos componentes da fórmula.

CUIDADOS MÉDICOS: Ter cautela em pacientes com bradicardia grave.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Inibe a secreção de prolactina.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Realizar controle de PA (pode provocar hipotensão), portanto, monitorar PA após administração parenteral. Pode causar vertigens, portanto, evitar dirigir ou operar máquinas.

CODERGOCRINA, MESILATO, VIA ORAL

NOME COMERCIAL: Hydergine, Hydergine SRO.

MECANISMO DE AÇÃO: Modifica a neurotransmissão cerebral, e há evidências de um efeito estimulante sobre os receptores de dopamina e serotonina e de um efeito bloqueador ao nível dos alfa-adrenoceptores; melhora a função metabólica cerebral comprometida, melhorando a captação e a utilização da glicose e do oxigênio pelo cérebro.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Absorção = 25%

Vd = 16 L/kg aproximadamente

Ligação a proteínas = 81%

Metabolismo = Hepático

Meia-vida de eliminação = Bifásica, com meia-vida curta de 1,5 a 2,5 horas (fase alfa) e outra mais longa, de 13 a 15 horas (fase beta)

Excreção = Fezes

Ajuste de dose = IH: na insuficiência hepática moderada a grave, fazer rigoroso monitoramento; Uma dose inicial mais baixa pode ser considerada e uma dose de manutenção mais baixa pode ser requerida. IR: não necessita de ajuste de dose.

INDICAÇÃO: Insuficiência vascular cerebral, sintomas relacionados à hipertensão cerebral, declínio da capacidade mental.

Sinais e sintomas de deterioração mental, especialmente aqueles relacionados ao envelhecimento: tontura, cefaleia, pouca concentração, desorientação, comprometimento da memória, falta de iniciativa, depressão do humor, insociabilidade, dificuldades com as atividades diárias e cuidados pessoais; Doença vascular cerebral aguda; Distúrbios vasculares periféricos; Sintomas subjetivos associados a hipertensão arterial.

REAÇÕES ADVERSAS: Náuseas, dispepsia, obstrução nasal.

RISCOS NA GRAVIDEZ: D. Mesilato de Codergocrina deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício esperado superar o risco potencial para o feto.

LACTAÇÃO: Excreção no leite materno desconhecida. Uso contraindicado, pois inibe a secreção de prolactina.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral – antes das refeições.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Vasodilatador cerebral.

APRESENTAÇÃO: Cápsula com 1 mg; Comprimido de 4,5 mg; Solução oral com 1 mg/ml; Comprimido de liberação prolongada de 6 mg.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Eritromicina, claritromicina, ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdina, cetoconazol, itraconazol, voriconazol (aumento da exposição à codergocrina pode aumentar, e efeitos predominantemente dopaminérgicos exacerbados podem ser induzidos).

POSOLOGIA: Uso oral:

Adultos: 4,5 mg em dose única diária, ou 1 a 2 mg, 3 vezes ao dia.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 a 30 ºC, protegido da luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade ao fármaco ou aos componentes da fórmula.

CUIDADOS MÉDICOS: Ter cautela em pacientes com bradicardia grave.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: A codergocrina SRO contém lactose, portanto é não recomendada a pacientes com problemas de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou má absorção de glicose-galactose. Inibe a secreção de prolactina.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Pode causar vertigens, portanto evitar dirigir ou operar máquinas.

COLAGENASE, TÓPICA

NOME COMERCIAL: Iruxol Mono, Kollagenase.

MECANISMO DE AÇÃO: Decompõe o colágeno em seu estado natural ou desnaturado nas regiões helicoidais, e degrada o substrato Ncarbobenzoxi-glicil-L-propil-glicil-glicil-L-propil-L--alanina; enzima proteolítica utilizada como agente desbridante em lesões superficiais; promove limpeza enzimática das áreas lesadas, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Início da ação = 8 a 12 horas da aplicação

Duração do efeito = Até 24 horas

Absorção = Não é absorvida através da pele.

INDICAÇÃO: Eliminação de tecidos necrosados em úlcera da pele, queimadura e após cauterização uterina.

REAÇÕES ADVERSAS: Ardências, dor, irritação, eczema, rubor, reações de hipersensibilidade.

RISCOS NA GRAVIDEZ: C.

LACTAÇÃO: Não há excreção no leite materno.

ADMINISTRAÇÃO: Tópica.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Cicatrizante tópico.

APRESENTAÇÃO: Tubo com pomada 1,2 U/g.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Hexaclorofeno, mercúrio, íons e prata (a atividade enzimática é afetada adversamente por detergentes e íons de metais pesados, como mercúrio e prata, que são utilizados em alguns antissépticos).

POSOLOGIA: Adultos: aplicar em toda a ferida fazendo uma camada de 2 mm de espessura, 1 ou 2 vezes por dia. **Crianças:** eficácia e seguranças não estabelecidas.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 a 30 °C.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

IBANDRONATO DE SÓDIO

NOME COMERCIAL: Ibandronato (genérico)

MECANISMO DE AÇÃO: Bisfosfonato que inibe a reabsorção óssea através de ações sobre a atividade osteoclástica, conduzindo a um aumento na densidade óssea indireta.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Absorção = Rápida, a partir do TGI

Vd = 90 L

Ligação a proteínas = 85%

Biodisponibilidade = 0,6% (reduzida em 99% se administrada com alimentos)

Metabolismo = Nenhum

Meia-vida de eliminação = 10 a 157 horas

Tmáx = 30 minutos a 2 horas

Excreção = Urina e fezes

Ajuste de dose = IH: sem informação. IR: não necessita de ajuste de dose, porém não recomendado na insuficiência renal grave (*clearance* de creatinina < 30 ml/minuto).

INDICAÇÃO: Osteoporose senil pós-menopausa.

REAÇÕES ADVERSAS: Dispepsia, cefaleia, diarreia, dor abdominal, náusea, síndrome gripal, mialgias e exantema.

RISCOS NA GRAVIDEZ: B. Não há experiência sobre o uso clínico de Ibandronato de Sódio em mulheres durante a gestação.

LACTAÇÃO: Excreção no leite materno desconhecida. Ibandronato de Sódio não deve ser utilizado por mulheres que estejam amamentando.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral – em jejum (1 hora antes do café da manhã), somente com água.

Contraindicada a ingestão do medicamento com nenhum outro tipo de bebida, tais como água mineral, água com gás, café, chá, bebidas lácteas (como leite) ou suco. Algumas águas minerais podem conter altas concentrações de cálcio e, por isso, não devem ser utilizadas.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Modificadores do metabolismo do cálcio.

APRESENTAÇÃO: Comprimido de 150 mg.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Produtos contendo cálcio e outros, tais como alumínio, magnésio ou ferro, incluindo alimentos, leite, e antiácidos, são susceptíveis de interferir com a absorção de ibandronato.

POSOLOGIA: Via oral.

150 mg 1 vez por mês.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade ao fármaco ou aos componentes da fórmula, hipocalcemia não corrigida.

Incapacidade de ficar de pé ou sentado durante pelo menos 60 minutos, anormalidades do esôfago (por exemplo, estenose, acalasia).

CUIDADOS MÉDICOS: O paciente não deve receber mais do que 150 mg/mês (aumenta não linearmente acima desta dose).

Há potencial para esofagite, disfagia e úlceras esofágicas.

Assegurar a ingestão adequada de cálcio, vitamina D.

Considerar a reavaliação periódica da necessidade de terapia com bisfosfonato continuada, especialmente se o tratamento > 5 anos, há risco de fraturas de fêmur e subtrocantéricas diafisária.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS Esofagite e outros eventos de esôfago foram relatados, principalmente em pacientes que não seguem as instruções específicas de utilização de bifosfonados orais (por exemplo, sentar-se ou ficar de pé após a administração, tomar com um copo cheio de água). Suspender o medicamento se o paciente desenvolver sintomas sugestivos de irritação esofágica.

Há risco de osteonecrose da mandíbula, dores articulares e/ou musculares.

A farmacocinética do ibandronato não foi estudada em doentes com < 18 anos de idade.

A biodisponibilidade e farmacocinética do ibandronato são semelhantes entre homens e mulheres.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Orientar o paciente a sempre tomar o medicamento no mesmo horário, sempre na mesma data e mês.

Orientar o paciente a procurar o médico se desenvolver sintomas de esofagite (por exemplo, dor no peito, agravamento de azia, dificuldade ou dor ao engolir).

Orientar o paciente a não se deitar por pelo menos 60 minutos depois de tomar ibandronato de sódio e não comer a primeira refeição do dia por pelo menos 60 minutos depois de tomar a medicação.

IBUPROFENO

CLASSIFICAÇÃO RENAME: Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica / Sistema musculoesquelético.

NOME COMERCIAL: Ibuprofen, Advil, Algiflex, Alivium, Dalsy, Doretrin, Motrin, Algiflex, Artril, Maxifen, Parartrin.

MECANISMO DE AÇÃO: Inibe a cicloxigenase de modo não seletivo diminuindo a formação de precursores das prostaglandinas e dos tromboxanos a partir do ácido araquidônico e, desta forma, reduz os sintomas da febre e dor.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Início da ação = 30 minutos

Absorção oral = Rapidamente absorvido pelo TGI.

Vd = 0,12 L/kg (adultos); Crianças febris, menores de 11 anos Vd = 0,2 L/kg

Biodisponibilidade oral = 80-100%

Tmáx. = 1,2 a 2,1 horas

Ligação a proteínas = 90-99%

Meia-vida de eliminação = 2 horas

Metabolismo = Hepática

Excreção = Urina

Ajuste de dose = Sem informação.

INDICAÇÃO:

Suspensão Oral e Gotas

Febre e dores leves a moderadas, associadas a gripes e resfriados comuns, dor de garganta, cefaleia, dor de dente, dorsalgia, dismenorreias e mialgias.

Comprimido Revestido/Cápsula

Ibuprofeno está indicado em todos os processos reumáticos (artrite reumatoide – AR, osteoartrite – OA, reumatismo articular) e nos traumas do sistema musculoesquelético, quando estiverem presentes componentes inflamatórios e dolorosos.

Ibuprofeno está indicado ainda no alívio da dor após procedimentos cirúrgicos em Odontologia, Ginecologia, Ortopedia, Traumatologia e Otorrinolaringologia.

Exclusivo Comprimido Revestido: Ibuprofeno possui atividade antipirética.

REAÇÕES ADVERSAS: Comuns: zumbido, edema, *rash* cutâneo, prurido, retenção hídrica, azia, epigastralgia, náusea, constipação, diarreia, dispepsia, dor abdominal, desconforto abdominal, flatulência, redução do apetite, vômito, tontura, cefaleia, nervosismo. **Raras:** agranulocitose, alterações da visão, alucinações, ambiopia tóxica, anafilaxia, anemia aplástica, anemia hemolítica, azotemia, confusão mental, eosinofilia, epistaxe, eritema multiforme, erupções vesículo-bolhosas, hematúria, hemorragia gastrointestinal, hipertensão arterial, hepatite, insuficiência renal aguda, leucopenia, melena, necrólise epidérmica tóxica, neutropenia, pancreatite, aumento das transaminases, síndrome Stevens-Johnson, trombocitopenia, distúrbios visuais, úlcera gástrica e duodenal, urticária, redução de hemoglobina e hematócrito, redução do *clearance* de creatinina.

RISCOS NA GRAVIDEZ: Categoria de risco no primeiro e segundo trimestres da gravidez – B

Categoria de risco no terceiro trimestre da gravidez – D

LACTAÇÃO: Excretado no leite materno. Usar com cautela.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral – administrar com alimentos.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Analgésico; Antitérmico; Anti-inflamatório – não esteroide.

APRESENTAÇÃO: Comprimidos: 200, 300, 400, 600 mg. Gotas: 200 mg/ml; Suspensão: 20 mg/ml (100 mg/5 ml), 30 mg/ml, 50 mg/ml, 100 mg/ml.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: AAS (diminuição das concentrações plasmáticas do ibuprofeno, recomendado: evitar a administração conjunta); Digoxina (aumento dos níveis séricos da digoxina, recomendado: administrar com precaução e realizar acompanhamento clínico do paciente); Celecoxibe e outros AINEs (aumento do risco de toxicidade de ambos os fármacos, recomendado: evitar a administração conjunta); Diuréticos de alça e tiazídicos (redução do efeito diurético); Anticoagulantes e trombolíticos (risco de sangramento); Anti-hipertensivos (risco de redução de efeito hipotensor).

POSOLOGIA: Adultos: Analgésico: 1.200 a 2.400 mg/dia divididos de 4 a 6, 200 a 800 mg/dose x 4 (dose máxima: 3,2 g/dia). Antitérmico, dismenorreia: 200 a 400 mg/dose x 4 a 6, Cefaleia intensa: 1.000 a 1.200 mg/dose, Anti-inflamatórios: 400 a 800 mg/dose x 3 a 4 (dose máxima: 3,2 g/dia), Analgesia: 600 mg/dose x4. **Crianças:** Antitérmico: 5 a 10 mg/kg/dose ate 6/6hs (dose máxima: 40 mg/kg/dia), Analgésico: 4 a 10 mg/kg/dose x 3 a 4, Anti-inflamatório: 30 a 50 mg/kg/dia divididos de 3 a 4 (dose máxima: 2,4 g/dia), Fibrose cística: 20 a 30 mg/kg/dia.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente e ao abrigo de luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Suspensão Oral e Gotas.

Ibuprofeno não deverá ser administrado a pacientes com antecedentes de hipersensibilidade prévia ao Ibuprofeno ou a qualquer componente da formulação. Não utilizar em indivíduos com úlcera péptica ativa, sangramento gastrintestinal ou em casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros antiinflamatórios não esteroides tenham induzido asma, rinite, urticária, pólipo nasal, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou anafilática.

Não utilizar Ibuprofeno concomitante com bebidas alcoólicas.

Ibuprofeno é contraindicado a pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrintestinal.

Ibuprofeno é contraindicado para menores de 6 meses.

Comprimido Revestido/Cápsula

Ibuprofeno é contraindicado em: Pacientes que apresentam hipersensibilidade ao Ibuprofeno, ou a qualquer de seus excipientes. Existe potencial de sensibilidade cruzada com ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Pacientes que apresentam a tríade do ácido acetilsali-

RISCOS NA GRAVIDEZ: C.

LACTAÇÃO: Presente no leite materno. Uso não recomendado (a AAP classifica como compatível).

ADMINISTRAÇÃO: Ocular.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Anti-infeccioso bactericida de amplo espectro; Quinolonas.

APRESENTAÇÃO: Colírio 0,3%. Cada ml (24 gotas) contém 3,0 mg de ofloxacino.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Não são conhecidas interações entre o ofloxacino colírio e outros medicamentos.

Foi observado que a administração sistêmica de algumas quinolonas pode aumentar as concentrações plasmáticas da teofilina, interferir com o metabolismo da cafeína e aumentar os efeitos do anticoagulante oral varfarina e seus derivados, e tem sido associada com elevações transitórias da creatinina sérica em pacientes tratados concomitantemente com ciclosporina; portanto observar e monitorar.

POSOLOGIA: Dose usual: 1 a 2 gotas, no(s) olho(s) afetado(s), a cada 2 a 4 horas, nos primeiros 2 dias de tratamento; a seguir: 1 a 2 gotas, 4x/dia, pelo período de até 10 dias.

Observações:

Idosos: A posologia é a mesma recomendada para as outras faixas etárias.

Orientar o paciente a instilar a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares.

Fechar bem o frasco após o uso.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C, protegido da luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade ao fármaco, aos componentes da fórmula ou a outras quinolonas, crianças.

CUIDADOS MÉDICOS: O uso prolongado pode acarretar superinfecção bacteriana ou fúngica.

Orientar o paciente a evitar o excesso de luz solar, pois pode causar reações de fototoxicidade moderada a grave.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: A segurança e eficácia não foram estabelecidas em crianças.

Este medicamento apresenta-se como uma solução límpida com coloração pálida para levemente verde-amarelada.

Superdosagem: se o excesso de dose for aplicado no olho, lavar abundantemente com água ou soro fisiológico; em caso de ingestão acidental, o paciente deve ingerir bastante líquido e em seguida, procurar auxílio médico.

Depois de aberto, a validade é de 28 dias.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Orientar os pacientes que utilizam lentes de contato a retirá-las antes de aplicar e aguardar pelo menos 15 minutos para recolocá-las novamente.

OLANZAPINA

NOME COMERCIAL: Zyprexa, Zydis.

MECANISMO DE AÇÃO: O mecanismo de ação é desconhecido, mas acredita-se que esteja relacionado com o antagonismo dos receptores da dopamina (D2, e maior afinidade pelos receptores 5-HT2). É descrito como antipsicótico de segunda geração ou atípico.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Vd = 109 L

Ligação a proteínas = 93%

Metabolismo = Hepático

Meia-vida de eliminação = 0,5 hora

Tmáx = 6 horas

Excreção = Urina e fezes

Ajuste de dose = IH: iniciar com 5mg/dia e ir monitorando. IR: não necessita de ajuste de dose.

INDICAÇÃO: Tratamento de esquizofrenia e outras psicoses.

REAÇÕES ADVERSAS: Sonolência, tontura, ganho de peso, agitação, efeitos extrapiramidais parkinsonianos, alterações da personalidade, diminuição da libido, diplopia, edema periférico, hipotensão ortostática, taquicardias, arritmias, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, morte súbita, trombose mesentérica, choque, febre, leucopenia, granulocitopenia, pancitopenia, anemia, elevação da AST e ALT, ginecomastia, galactorreia, variações hematológicas assintomáticas, pode produzir hiperglicemia.

RISCOS NA GRAVIDEZ: C.

LACTAÇÃO: Desconhece-se se é excretado no leite. Não amamentar.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Antipsicótico; Atípico.

APRESENTAÇÃO: Comprimidos de 2,5, 5 e 10 mg; comprimido orodispersível 5 e 10mg.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Fármacos que atuam na isoenzima CYP 1A2 ou as glicuronil-transferases, como carbamazepina, omeprazol ou rifampicina: podem aumentar a depuração da olanzapina; efeitos aditivos podem ocorrer com o uso de depressores do SNC ou com álcool; o metabolismo da olanzapina pode ser induzido pelo fumo com aumento da sua depuração de 40%, acentuação dos efeitos dos fármacos

anti-hipertensivos, exacerbação do efeito de anticolinérgicos ou da olanzapina.

POSOLOGIA: Dose inicial: 5 a 10 mg/dia em dose única, independentemente das refeições, podendo ser ajustada de acordo com o quadro clinico, com aumentos de 5 mg/dia a intervalos de uma semana até o limite de 20 mg/dia. As doses superiores a 10 mg não se mostraram muito mais eficazes.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 e 25 °C.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a olanzapina, gravidez, lactação e crianças.

CUIDADOS MÉDICOS: Avaliar relação risco/benefício aos pacientes com depressão de medula óssea, doença mieloproliferativa, hipereosinofilia, hipertrofia prostática, história de convulsão, íleo paralítico, pacientes com leucopenia ou neutrofilia, diminuição da função hepática, glaucoma do ângulo fechado e doença cardiovascular. Realizar controles de função hepática e hemogramas seriados. Ter cuidado com sintomas de síndrome neuroléptica maligna, que pode ocorrer com alguns antipsicóticos.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Superdose acidental: são indicadas medidas de suporte, uma vez que não existe antídoto específico. Orientar os pacientes a não dirigir ou operar máquinas e a não ingerir bebidas alcoólicas. Não removida pela hemodiálise.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Aumentar a vigilância quando administrar a medicação em pacientes com tendências suicidas. Verificar glicemia capilar antes da administração (pode provocar hiperglicemia). Pode provocar hipotensão ortostática: orientar a não levantar rapidamente (permanecer sentado na cama durante uns 5 minutos). Não expor pacientes a temperaturas muito quentes (pode ocorrer desidratação).

ÓLEO DE RÍCINO, FRASCO

NOME COMERCIAL: Laxol.

MECANISMO DE AÇÃO: Estimula o peristaltismo; promove uma inflamação de baixo grau no intestino delgado ou grosso, acumulando água e eletrólitos na luz intestinal.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Início da ação = 1 a 6 horas

Ajuste de dose = Não é necessário

INDICAÇÃO: Constipação intestinal, preparo para procedimentos diagnósticos.

REAÇÕES ADVERSAS: Cólicas, vômitos, diarreia, dor abdominal, desequilíbrio eletrolítico, má absorção de nutrientes, tontura, desmaio, perda de líquidos.

RISCOS NA GRAVIDEZ: X.

LACTAÇÃO: Contraindicado durante a lactação.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral – longe das refeições (de preferência em jejum).

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Laxante; Éster de ácido graxo.

APRESENTAÇÃO: Frascos com 60 ml.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Antiácidos; Cimetidina; Famotidina; Nizatidina, Ranitidina (risco de irritação GI); Diuréticos poupadores de potássio; Suplementos de potássio (pode diminuir a ação destes).

POSOLOGIA: Adultos: 15 a 60 ml, em dose única.

Crianças menores de 2 anos: 1,25 a 1,75 ml, em dose única.

Crianças maiores de 2 anos: 5 a 15 ml, em dose única.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C, protegido da luz.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade ao fármaco ou aos componentes da fórmula, obstrução ou perfuração intestinal, hemorroidas ulceradas, pancreatite, sangramento renal, apendicite, desidratação, cólica abdominal, fissura anal ou retal.

CUIDADOS MÉDICOS: Este medicamento é indicado para constipação refratária a outros tratamentos e não deve ser utilizado por tempo prolongado (redução de potássio no sangue).

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Suspender o uso em caso de dor abdominal.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Orientar o paciente a não exceder o uso, utilizando somente conforme prescrição médica.

ÓLEO MINERAL PURIFICADO

NOME COMERCIAL: Nujol, Purol.

MECANISMO DE AÇÃO: Aumenta a retenção de água nas fezes revestindo as superfícies do bolo fecal com um filme imiscível (água + óleo). O efeito lubrificante facilita a defecação.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Início da ação = 6 a 8 horas. Ingerido ao deitar, a ação é dentro de 12 horas.

TOXINA BUTOLÍNICA

CLASSIFICAÇÃO RENAME: Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica / Sistema musculoesquelético.

NOME COMERCIAL: Botulim, Nabota, Botox, Botulift, Dysport, Prosigne, Xeomin.

MECANISMO DE AÇÃO: Essa toxina atua bloqueando a liberação do neurotransmissor acetilcolina nas junções neuromusculares, levando a uma paralisia muscular flácida. O botulismo pode ser potencialmente fatal, pois a paralisia pode afetar os músculos respiratórios, causando dificuldade respiratória.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA: Toxina Botulínica A é uma forma congelada a vácuo e estéril da toxina botulínica – tipo A, produzida a partir da cultura de *Clostridium botulinum* tipo A, classificado terapeuticamente como agente paralisante neuromuscular.

Age bloqueando a condução neuromuscular em razão da ligação nos receptores terminais dos nervos simpáticos motores, inibindo a liberação de acetilcolina. Quando injetado por via intramuscular em doses terapêuticas, provoca o relaxamento muscular parcial por desnervação química localizada.

Quando um músculo é desnervado quimicamente, pode ocorrer atrofia e podem se desenvolver receptores de acetilcolina extrajuncionais. Há evidência de que o nervo pode voltar a crescer e novamente inervar o músculo, o que faz com que a debilidade seja reversível.

INDICAÇÃO:

• Tratamento de blefaroespasmo essencial benigno ou distúrbios do VII par craniano em pacientes com idade acima de 18 anos.

• Tratamento de rugas glabelares, de grau moderado a severo, associadas a atividades do músculo corrugador e/ou do músculo prócero em adultos com idade entre 18 e 65 anos;

• Tratamento da espasticidade muscular de membros superiores, após ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC), em pacientes acima de 20 anos de idade.

• Tratamento da deformidade do pé equino causada por hipertonia muscular (espasticidade) dinâmica em crianças, acima de 2 anos de idade, portadoras de paralisia cerebral.

REAÇÕES ADVERSAS: Blefaroespasmo/espasmo hemifacial: Reação muito comum: Ptose palpebral (pálpebra caída). Reações comuns: ceratite (inflamação da córnea) superficial puntiforme, lagoftalmos (paralisia da pálpebra, que deixa o olho parcialmente aberto), olho seco, irritação ocular, fotofobia (intolerância à luz), equimoses (manchas arroxeadas na pele) e aumento de lacrimejamento. Reações incomuns: ceratite (inflamação da córnea), ectrópio (pálpebra revirada para fora), diplopia (visão dupla), entrópio (pálpebra revirada para dentro), borramento de visão, tontura, erupção cutânea, paralisia facial, cansaço. Reações raras: edema (inchaço) palpebral. Reações muito raras: ceratite (inflamação da córnea) ulcerativa, defeito epitelial corneal, perfuração da córnea.

Estrabismo: Reações muito comuns: ptose palpebral (pálpebra caída), distúrbios do movimento ocular. Reações incomuns: hemorragias retrobulbares (atrás do globo ocular), perfuração do olho, pupila de Holmes-Adie. Reações raras: hemorragia vítrea (dentro do olho).

Distonia cervical: Reações muito comuns: disfagia (dificuldade para engolir), fraqueza muscular e dor local. Reações comuns: rinite, infecção das vias aéreas superiores, tontura, hipertonia (aumento da rigidez muscular), hipoestesia (diminuição da sensibilidade), sonolência, cefaleia (dor de cabeça), boca seca, náusea, rigidez musculoesquelética, astenia (cansaço), síndrome gripal, mal-estar geral. Reações incomuns: dispneia (falta de ar), diplopia (visão dupla), febre, ptose palpebral (pálpebra caída).

Espasticidade focal:Espasticidade focal de membros superiores associada ao acidente vascular cerebral em adultos: Reações comuns: equimose (mancha arroxeada na pele), dor na extremidade, fraqueza muscular, hipertonia (aumento da rigidez muscular) e dor no local da aplicação, febre, síndrome gripal. Reações incomuns: hipoestesia (diminuição da sensibilidade), artralgia (dor na articulação), astenia (cansaço), dor, bursite, dermatite, cefaleia (dor de cabeça), hipersensibilidade no local da aplicação, mal-estar geral, náusea, parestesia (sensações na pele, tais como formigamento e sensibilidade), hipotensão ortostática (queda de pressão ao ficar em pé), prurido (coceira), erupção cutânea.

Espasticidade focal de membros inferiores associada ao acidente vascular cerebral em adultos: Reações comuns: edema (inchaço) periférico, artralgia (dor na articulação). Não foram observadas mudanças no perfil de segurança após repetição de doses.

Espasticidade focal de membros superiores em pacientes pediátricos: Reações muito comuns: desconforto no local da aplicação. Reações comuns: gripe, pneumonia, inabilidade, hipocinesia (diminuição dos movimentos), fraqueza muscular, espasmos musculares, dedo em gatilho, polaciúria (urinar com frequência), vômitos, deslocamento articular, quedas, contusão, ardor no local da aplicação, dor no local da aplicação, infecção do trato respiratório superior, náusea.

Espasticidade focal de membros inferiores em pacientes pediátricos: Reações muito comuns: infecção viral, infecção no ouvido. Reações comuns: sonolência, distúrbio da marcha, parestesia (sensações na pele, tais como formigamento e sensibilidade), erupção cutânea, mialgia (dor muscular), fraqueza muscular, dor nas extremidades, incontinência urinaria, quedas, mal-estar geral, dor no local da aplicação e astenia (cansaço).

Hiperidrose (suor excessivo): Reações muito comuns: dor no local da injeção. Reações comuns: cefaleia (dor de cabeça), parestesia (sensações na pele, tais como formigamento e sensibilidade), ondas de calor, náusea, hiperidrose (suor excessivo) em outras regiões não tratadas, odor anormal na pele, prurido (coceira), nódulo subcutâneo, alopecia (redução parcial ou total de pêlos), dor na extremidade, dor, edema (inchaço) no local da aplicação,

hemorragia no local da aplicação, hipersensibilidade no local da injeção, irritação no local da injeção, astenia (cansaço). Nota: foi relatado aumento na sudorese não axilar em 4,5% dos pacientes dentro de um mês após a injeção, sem um padrão com relação aos locais anatômicos afetados. Houve desaparecimento em, aproximadamente, 30% dos pacientes dentro de quatro meses.

Bexiga hiperativa (incontinência urinária): Reações muito comuns: infecção no trato urinário, disúria (dificuldade para urinar). Reações comuns: bacteriúria, retenção urinária, volume de urina residual*, polaciúria (urinar pouca quantidade muitas vezes ao dia).

*Elevado volume residual pós-miccional, sem necessidade de cateterismo vesical. Reações adversas relacionadas que ocorreram com relativa frequência foram disúria (dificuldade para urinar) e hematúria (sangue na urina).

Bexiga hiperativa neurogência (incontinência urinária): Reações muito comuns: infecção do trato urinário, retenção urinária. Reações comuns: insônia, constipação (intestino preso), fraqueza muscular, espasmo (contração involuntária) muscular, hematúria* (sangue na urina), disúria* (dificuldade para urinar), divertículo da bexiga, fadiga (cansaço), distúrbios da marcha, disreflexia autonômica*, queda.

*Reações relacionadas ao procedimento.

Linhas faciais hipercinéticas

Linhas glabelares: Reações comuns: cefaleia (dor de cabeça), parestesia (sensações na pele, tais como formigamento e sensibilidade), ptose palpebral (pálpebra caída), náusea, eritema, tensão na pele, fraqueza muscular, dor facial, edema (inchaço) no local da aplicação, equimose (manchas arroxeadas na pele), dor no local da aplicação, irritação no local da aplicação.

Linhas frontais: Reações muito comuns: cefaleia (dor de cabeça), edema (inchaço) palpebral, ardor no local da aplicação, prurido no local da aplicação e dor facial.

Rugas periorbitais: Reações muito comuns: ardor no local da aplicação. Reações comuns: cefaleia (dor de cabeça), ptose palpebral (pálpebra caída), dor facial. Reações raras: diplopia (visão dupla), fraqueza muscular.

Migrânea crônica (enxaqueca crônica): Reações comuns: dor na nuca, cefaleia, migrânea (enxaqueca crônica), ptose palpebral (pálpebra caída), rigidez musculoesquelética, fraqueza muscular, dor no local da injeção, mialgia (dor muscular), dor musculoesquelética, paresia facial (paralisia incompleta), prurido (coceira), espasmo (contração involuntária) muscular, tensão muscular, erupção cutânea, dor na nuca. Reações incomuns: disfagia (dificuldade para engolir), dor na pele, dor no maxilar.

RISCOS NA GRAVIDEZ: Categoria de risco na gravidez: C. Toxina Botulínica A é contraindicado para mulheres grávidas, em período fértil e lactantes.

LACTAÇÃO: Não há conhecimento se o medicamento é excretado no leite materno, não sendo recomendado o uso deste medicamento durante o aleitamento.

ADMINISTRAÇÃO: Uso intramuscular ou subcutâneo.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Relaxante muscular de ação periférica.

APRESENTAÇÃO: Pó liofilizado 50 U, 100 U, 150 U, 200 U, 300 U e 500 U.

POSOLOGIA: A dose inicial recomendada é de 1,25 – 2,5 U (0,05 mL a 0,1 mL de volume para cada local), injetada na porção medial e lateral pré-tarsal do músculo orbicular dos olhos da pálpebra superior e na porção pré-tarsal lateral do músculo *orbicularis oculi* da pálpebra inferior.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: O efeito da toxina botulínica pode ser potencializado por antibióticos aminoglicosídeos, ou quaisquer outras drogas que interfiram na transmissão neuromuscular. Os pacientes que fazem uso dessas drogas devem ser cuidadosamente observados quando forem tratados com Toxina Botulínica A. Recomenda-se cautela em pacientes tratados com polimixinas, tetraciclinas e lincomicina. O uso de relaxantes musculares deve ser feito com cautela, recomendando-se redução da dose inicial do relaxante, ou utilização de drogas de ação intermediária como o vecurônio, em vez dos relaxantes musculares de ação mais prolongada.

O efeito da administração de diferentes sorotipos de neurotoxina botulínica ao mesmo tempo ou com muitos meses de intervalo entre elas é desconhecido. A fraqueza excessiva pode ser agravada com a administração de toxina botulínica antes da redução dos efeitos da toxina botulínica previamente administrada.

ARMAZENAMENTO: Conservar entre 2 ºC e 8 ºC (sob refrigeração). Não congelar.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

CUIDADOS MÉDICOS: Atentar para reações adversas.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Orientar sobre o armazenamento.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Sem informações de destaque.

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

NOME COMERCIAL: Botox, Botox Cosmetic.

MECANISMO DE AÇÃO: A toxina botulínica A é uma neurotoxina produzida pelo clostridium botulinum, bacilo anaeróbico formador de esporos, que parece afetar apenas a membrana pré-sináptica da junção neuromuscular em humanos, onde impede a liberação de acetilcolina dependente de cálcio e produz estado de denervação. A inativação muscular persiste até novas fibrilas crescerem a partir do nervo e formarem placas juncionais em áreas novas da parede da célula muscular.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA: Início da ação (melhora) BLEFAROESPASMO: aproximadamente 3 dias DISTONIA CERVICAL: aproximadamente 2 semanas Estrabismo: aproximadamente 1-2 dias Redução das linhas glabelares: 1-2 dias,

aumentando de intensidade durante a primeira semana Duração da ação Blefaroespasmo = ~3 meses Distonia cervical = < 3 meses Estrabismo = 2-6 semanas Redução das linhas glabelares = até 3 meses Absorção = na dose recomendada, não se espera sua presença no sangue periférico. Ajuste de dose = Nenhum ajuste de dose específico recomendado na IR e na IH.

INDICAÇÃO: Tratamento do estrabismo e do blefaroespasmo associado à distonia (incluindo blefaroespasmo benigno essencial ou distúrbios do nervo VII em paciente com 12 anos de idade ou mais); distonia cervical (torcicolo espasmódico) em pacientes com 16 anos de idade ou mais; melhora temporária da aparência de linhas/rugas faciais (linhas glabelares moderadas a graves com atividade do músculo corrugador e/ou prócero) em pacientes com até 65 anos de idade; tratamento da hiperidrose axilar primária em adultos não adequadamente controlada com tratamentos tópicos. Medicamento órfão: tratamento da contratura muscular dinâmica em pacientes pediátricos com paralisia cerebral.

REAÇÕES ADVERSAS: Os efeitos adversos geralmente ocorrem em 1 semana e podem durar até vários meses. Disfagia, cervicalgia, ptose, desvio vertical, infecção das vias aéreas superiores, cefaleia, prurido, sudorese não axilar, náusea, xerostomia, reação no local da injeção, dor facial, dorsalgia e/ou lombalgia, fraqueza, hipertonia, ceratite puntiforme superficial, ressecamento dos olhos, faringite, infecção respiratória, rinite, tosse, ansiedade, distúrbio da fala, febre, sonolência, tontura, síndrome similar à gripe, diplopia, dispneia, ectrópio, edema palpebral, equimoses, fotofobia, fraqueza facial, hipoestesia, lacrimejamento, rigidez, arritmia, eritema multiforme, erupção psoriasiforme, infarto do miocárdio, prurido, rash cutâneo, reações alérgicas, urticária. Após tratamento de distonia cervical: aspiração, disfonia, plexopatia braquial. Após tratamento de blefaroespasmo: exacerbação da miastenia grave, glaucoma de ângulo fechado agudo, hemorragia vítrea, paralisia facial focal, perfuração corneana, redução do piscar dos olhos levando à ulceração corneana, síncope.

Após tratamento do estrabismo: hemorragia retrobulbar, isquemia do segmento anterior do olho, lesão de gânglio ciliar.

Após redução de linhas glabelares: audição anormal, exacerbação da miastemia grave, glaucoma, oclusão da veia retineana, perda da audição, vertigem com nistagmo.

RISCOS NA GRAVIDEZ: X.C (fabricante).

LACTAÇÃO: Lactação no leite materno desconhecida. Não recomendado.

ADMINISTRAÇÃO: IM.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Agente Paralisante da Função Neuromuscular, Agente Bloqueador Neuromuscular, Toxina; Agente Oftálmico, Toxina.

APRESENTAÇÃO: Frasco-ampola 100 U e 500 U.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Aumento do efeito e da toxicidade: aminoglicosídeos, agentes bloqueadores neuromusculares e outros agentes podem bloquear a transmissão neuromuscular.

POSOLOGIA: Distonia cervical: crianças com 16 anos ou mais e adultos: para orientação quanto à dose, a dose média é de 236 unidades (faixa entre o 25 e o 75 percentil: 198-300 unidades), dividida entre músculos afetados em pacientes previamente tratados com toxina botulínica. A dose inicial em pacientes nunca tratados deve ser mais baixa. A dosagem sequencial deve ser baseada na posição da cabeça e do pescoço do paciente, na localização da dor, na hipertrofia muscular, na resposta do paciente e nas reações adversas prévias. A dose total injetada no músculo esternocleidomastoídeo deve ser ≤ 100 unidades para diminuir o risco de disfagia. Blefaroespasmo: crianças com 12 ou mais e adultos: dose inicial: 1,25-2,5 unidades injetadas nos músculos orbiculares pré-tarsais medial e lateral das pálpebras superior e inferior; a dose pode ser aumentada até 2 vezes a dose anterior quando a resposta à dose inicial durar até 2 meses; dose máxima por local: 5 unidades; dose cumulativa em um período de 30 dias: ≤ 200 unidades. Pode ocorrer tolerância quando o tratamento é realizado em frequência maior que a cada 3 meses, mas o efeito geralmente não é permanente. Estrabismo: crianças com 12 anos ou mais e adultos: dose inicial: músculos verticais e estrabismo horizontal < 20 dioptrias: 1,25-2,5 unidades em qualquer um dos músculos; estrabismo horizontal de 20-50 dioptrias: 2-5-5 unidades em qualquer um dos músculos; paralisia do nervo VI, persistido por mais de 1 mês: 1,5-2,5 unidades no músculo reto medial. Reexaminar o paciente 7-14 dias após cada injeção para avaliar o efeito da dose. Doses subsequentes para pacientes que apresentam paralisia incompleta ao alvo podem ser aumentadas até 2 vezes a dose prévia administrada. A dose máxima recomendada como injeção única para qualquer um dos músculos é de até 25 unidades. Não administrar injeções subsequentes até os efeitos da dose prévia terem desaparecido. Hiperidrose axilar primária: adultos com 18 anos ou mais: intradérmica: 50 unidades/axila. A área da injeção deve ser definida por técnicas-padrão de tingimento. A injeção deve ser distribuída de forma homogênea, em múltiplos locais (10-15), administradas em alíquotas de 0,1-0,2 ml, separadas por ~ 1-2 cm. Redução de linhas glabelares: adultos de até 65 anos: a dose eficaz é definida pela observação da capacidade do paciente de ativar os músculos superficiais injetados. A localização, o tamanho e o uso dos músculos podem variar de modo importante entre os indivíduos. Injetar uma dose de 0,1 ml em cada um dos cinco locais, dois em cada músculo corrugador e um no músculo prócero (dose total de 0,5 ml).

ARMAZENAMENTO: Armazenar os frascos não diluídos sob refrigeração entre 2 e 8 °C por até 24 meses. Após a reconstituição, armazenar em refrigerador (entre 2 e 8 °C) e utilizar em 4 horas (não contém preservativo). Não congelar.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Administrar em 4 horas após o frasco ter sido reconstituído. Reconstituir com soro fisiológico sem preservativo. Misturar delicadamente. Botox: reconstituir o frasco com 1 ml de diluente para obter 10 unidades por 0,1 ml; 2 ml de diluente para obter 5 unidades por 0,1 unidade; 4 ml de diluente para obter 2,5 unidades por 0,1 ml; 8 ml de diluente para obter 1,25 unidade por 0,1 ml. Botox cosmetic: reconstituir

o frasco com 2,5 ml de diluente para obter 0,4 unidade por 0,1 ml (20 unidades por 0,5 ml).

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à albumina, à toxina botulínica ou a qualquer componente da formulação; infecção no local proposto de injeção; gravidez. As contraindicações relativas incluem doenças da transmissão neuromuscular, coagulopatias, incluindo anticoagulação terapêutica; paciente não cooperativo.

CUIDADOS MÉDICOS: Doses mais altas ou a administração mais frequente podem acarretar a produção de anticorpos neutralizadores e perda de eficácia. Manter suporte adequado para o caso de ocorrer reação anafilática. Ter cautela em pacientes com doenças neuromusculares (p. ex., miastenia grave), distúrbios neuropáticos (p. ex., esclerose lateral amiotrófica) ou pacientes utilizando aminoglicosídeos ou outros medicamentos que interferem na transmissão neuromuscular. Assegurar a contracepção adequada em mulheres em idade fértil. Os efeitos a longo prazo da terapia crônica são desconhecidos. Distonia cervical: a disfagia é comum. Ela pode ser grave e exigir métodos alternativos de alimentação. Os fatores de risco incluem menos massa muscular do pescoço, injeções bilaterais no músculo esternocleidomastoídeo ou injeções no levantador da escápula. A disfasia pode estar associada ao aumento de infecção das vias aéreas superiores. Blefaroespasmo: a redução do piscar dos olhos pela injeção do músculo orbicular pode levar à exposição e à ulceração da córnea. Estrabismo: hemorragias retrobulbares podem ocorrer devido à penetração da agulha na órbita. Pode ocorrer desorientação espacial, visão dupla ou localização egocêntrica defeituosa quando um ou mais músculos extraoculares são paralisados. A oclusão do olho afetado pode ajudar. O teste cuidadoso da sensibilidade corneana, evitar injeções na pálpebra inferior e o tratamento de defeitos epiteliais são necessários. Hiperidrose axilar primária: avaliar causas secundárias antes do tratamento (p. ex., hipertiroidismo). A segurança e a eficácia para o tratamento da hiperidrose em outras áreas do corpo não foram estabelecidas. Redução temporária de linha glabelares: não utilizar mais frequentemente que a cada 3 meses. Pacientes com assimetria facial acentuada, ptose, dematacálase excessiva, cicatriz dérmica profunda, pele sebácea espessa ou incapacidade de reduzir substancialmente linhas glabelares (afastando-as fisicamente) foram excluídos dos estudos clínicos.

A redução do piscar dos olhos pela injeção do músculo orbicular pode acarretar exposição e ulceração corneana. Pode ocorrer desorientação espacial, visão dupla ou localização egocêntrica defeituosa quando um ou mais músculos extraoculares são paralisados.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: A formulação deste medicamento contém albumina e pode acarretar risco remoto de transmissão viral. Idosos: nenhum ajuste específico recomendado.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Ter cuidado quando houver inflamação, fraqueza excessiva ou atrofia no local proposto de injeção.

TRAMADOL, CLORIDRATO, INJETÁVEL

NOME COMERCIAL: Tramal, Sensitram, Tramadon, Rapitram.

MECANISMO DE AÇÃO: É agonista de receptor opioide do tipo μ (mi) e, assim, inibe vias álgicas que resultam em redução da percepção dolorosa.

A inibição da recaptação neuronal de noradrenalina e de serotonina também contribui para o efeito analgésico do tramadol.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Absorção: rápida e completa após a administração intramuscular

Distribuição: 203 ± 40 L

Ligação a proteínas: 20%

Metabolismo: hepático, via CYP2D6 e CYP3A4. Ocorre também N- e O-desmetilação e conjugação dos produtos da O-desmetilação com ácido glucurônico.

Meia-vida de eliminação: ± 6 horas

Excreção: Urina

Ajuste de dose=IR: CrCl <30 mL/min: aumentar o intervalo de doses para 12 horas, máximo 200 mg/dia por via oral. Comprimidos de liberação controlada não são recomendados em caso de IR. IH: em caso de cirrose, 50 mg/dia por via oral a cada 12 horas. Comprimidos de liberação controlada não são recomendados em caso de IH.

Farmacocinética: A formulação oral do tramadol é rapidamente e quase completamente absorvida com a biodisponibilidade de 68% após a primeira dose e 90% após doses repetidas, com efeito de pico dentro de 2 a 3 horas.

O tramadol é convertido em metabólitos ativos e inativos no fígado pelo sistema da enzima citocromo P450, via desmetilação mediada por CYP3A4 e CYP2D6 glicuronidação e sulfatação. O principal metabólito, O-desmetil-tramadol (M1), é produzido pela enzima CYP2D6 e é aproximadamente 400 vezes mais potente do que o composto original.

Farmacodinâmica do tramadol: O tramadol age tanto como um efeito agonista opiáceo fraco, causando inibição das vias ascendentes da dor, alterando a percepção e a resposta à dor, quanto como inibidor de recaptação das monoaminas norepinefrina e serotonina, que são neurotransmissores envolvidos na via inibitória descendente da dor responsável pelo alívio da dor. Além disso, apresenta efeito analgésico nos nervos periféricos que, em parte, é semelhante ao de anestésico local.

INDICAÇÃO: Dor de intensidade moderada a severa.

REAÇÕES ADVERSAS: Náusea, vômito, tontura, constipação, xerostomia, cefaleia, sonolência. Raramente ocorrem: depressão respiratória, dispneia, convulsão, hipoglicemia, pancreatite, reação anafilática, síndrome serotoninérgica.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Antisséptico ocular [prata e substancias proteicas (combinação)].

APRESENTAÇÃO: Solução oftálmica estéril a 10%.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

POSOLOGIA: Uso oftálmico. Adultos e crianças: 1 gota em cada olho, 3 ou 4 vezes por dia.

ARMAZENAMENTO: Armazenado a temperatura ambiente (entre 15 e 30 ˚C) e ao abrigo da luz.

RECONSTITUIÇÃO/ DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Não se conhecem contraindicações para o uso do produto.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Orientar a instilar 1 gota no saco conjuntival, 3 a 4 vezes por dia ou a critério médico.

VORICONAZOL, INJETÁVEL

NOME COMERCIAL: Vfend.

MECANISMO DE AÇÃO: Inibe a desmetilação do 14 α-esterol mediada pelo citocromo P450 fúngico, interferindo na integridade da membrana celular do fungo.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Absorção = Absorção rápida e consistente, não afetada por mudanças no pH gástrico.

Vd = 4,6 L/kg

Ligação a proteínas = Estimada em 58%

Biodisponibilidade = Estimada em 96%

Metabolismo = Hepático, metabolizado pelas isoenzimas hepáticas do citocromo P450, CYP2C19 (principal vida), CYP2C9 e CYP3A4 (menos importantes); principal metabólito do voriconazol é o N-óxido voriconazol; saturável (pode apresentar não linearidade).

Meia-vida de eliminação = Variável, depende da dose.

Tmáx = 1-2 horas; meia hora (comprimidos esmagados).

Excreção = Urina (2%), sob forma de metabólitos inativos.

Ajuste de dose = Comprometimento renal: EV: em pacientes com DCE < 50 ml/minuto, passar para VO, pois a formulação parental contém o excipiente sulfobutil-éter-ciclodextrina sódica, que se acumula nos pacientes com IR, e a ciclodetrina é tóxica.

Reposição na diálise = Não é necessária após seções de 4 horas de hemodiálise; Comprometimento hepático: Child-Pugh A e B: dose de ataque normal, manutenção 50% menor. Child--Pugh C: não recomendado, a não ser que os benefícios superem os riscos.

INDICAÇÃO: Aspergilose invasiva, infecção fúngica grave causadas pelo *Scedosporium apiospermum* e *Fusarium* spp (inclusive *Fusarium solani*) em pacientes intolerantes ou refratários a outras terapias, candidíase esofágica, candidemia (em pacientes sem neuropenia), infecções por cândida disseminadas da pele e de vísceras.

REAÇÕES ADVERSAS: Febre, calafrios, cefaleia, dor torácica ou abdominal, visão anormal, fotofobia, cromatopsia, hemorragia ocular, náuseas, vômitos, alteração do teste da função hepática, diarreia, xerostomia, icterícia (inclusive colestática), hemorragia gastrointestinal, duodenite, dispepsia, disfagia, esofagite, flatulência, anemia, pancitopenia, trombocitopenia, leucopenia, taquicardia, hipo ou hipertensão, vasodilatação, aumento da fosfatase alcalina, enzimas hepáticas, hipocalemia, hipomagnesemia, bilirrubinas, creatinina, edema periférico, tonturas, alucinações, prurido, exantema, síndrome de Stevens-Johnson, insuficiência renal aguda e outras alterações da função renal, albuminúria, aumento sérico da ureia, hipercalcemia, hipercalemia, hipernatremia, hematúria, hidronefrose, oligúria ou anúria, incontinência ou retenção urinária, hemorragia uterina ou vaginal, insuficiência adrenal, *diabetes insipido*, hipo ou hipertireoidismo, artralgia, artrite, necrose óssea, mialgia, miastenia, miopatia, osteomalácia, osteoporose, tosse, dispneia, epistaxe, hemoptise, edema pulmonar, pneumonia, outras síndromes respiratórias, alteração da voz, surdez, dor no ouvido.

RISCOS NA GRAVIDEZ: D.

LACTAÇÃO: Excreção no leite materno desconhecida/ter cuidado.

ADMINISTRAÇÃO: IV.

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Antifúngico (azol).

APRESENTAÇÃO: 200 mg (pó) injetável.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Alcaloides do ergot (ergotamina, diidroergotamina) e da vinca (vimblastina, vincristina) ou sulfonilureias (gliburida, glipizida, tolbutamida): possível aumento das concentrações plasmáticas dessas drogas e condução ao ergotismo (devido ao uso de alcaloides do ergot) ou à hipoglicemia (devido ao uso de sulfonilureias).

Astemizol; Cisaprida; Pimozida; Quinidina ou terfenadina: possível prolongamento do intervalo QT e raras ocorrências de *torsade de pointes* (devido às concentrações plasmáticas elevadas dessas drogas).

Benzodiazepínicos (midazolam, triazolam, estatinas (lovastatina); Inibidores de protease do HIV (amprenavir, nelfinavir, saquinavir) ou INNTRs (inibidores ou indutores do CYP450, substratos do CYP3A4): possível inibição do metabolismo dessas drogas pelo voriconazol, possíveis inibição por (amprenavir, delavirdina, efavirenz, nelfinavir ou saquinavir) e indução por (efavirenz ou nevirapina) do metabolismo do voriconazol, é provável que o voriconazol possa aumentar os níveis plasmáticos tanto de benzodiazepínicos e estatinas (efeito sedativo prolongado devido ao uso concomitante de benzodiazepínicos); Carbamazepina; Fenobarbital ou Rifampicina: possível diminuição significativa das concentrações plasmáticas do voriconazol; Ciclosporina; Fenitoína; Prednisolona; Rifabutina; Sirolimus

ZOLPIDEM, HEMITARTARATO

NOME COMERCIAL: Stilnox, Lioram, Stilram.

MECANISMO DE AÇÃO: É um agonista específico do receptor de benzodiazepinico (BZ) do complexo do receptor GABA-A, que tem a hipótese de ser responsável por propriedades sedativas, anticonvulsivantes, ansiolíticas e miorrelaxantes. A ligação preferencial do zolpidem ao receptor BZ1 pode explicar a ausência relativa de efeitos miorelaxantes e anticonvulsivantes, bem como a preservação do sono profundo (estágios 3 e 4).

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Propriedades farmacodinâmicas

O Hemitartarato de Zolpidem é um agente hipnótico pertencente ao grupo das imidazopiridinas. Estudos experimentais demonstraram que Hemitartarato de Zolpidem promove um efeito sedativo em doses muito inferiores àquelas necessárias para obtenção de um efeito anticonvulsivante, relaxante muscular ou ansiolítico. Esses efeitos são devidos a uma atividade agonista seletiva sobre um receptor GABAÔMEGA, que modula a abertura do canal de cloro. O Hemitartarato de Zolpidem é um agonista preferencial da subclasse de receptores ômega 1 (BZD1).

No homem, Hemitartarato de Zolpidem encurta o tempo de indução ao sono, reduz o número de despertares noturnos e aumenta a duração total do sono, melhorando sua qualidade. Esses efeitos estão associados a um perfil eletroencefalográfico específico, diferente daquele observado com as benzodiazepinas. Estudos em laboratório de sono mostraram que Hemitartarato de Zolpidem prolonga o estágio II do sono bem como os estágios de sono profundo (III e IV). Na dosagem recomendada, o Hemitartarato de Zolpidem não possui efeito sobre a duração total do sono paradoxal (fase REM).

Propriedades farmacocinéticas

Absorção

Após administração sublingual, o Hemitartarato de Zolpidem apresenta uma biodisponibilidade de aproximadamente 70%, com as concentrações plasmáticas máximas sendo alcançadas entre 0,5 e 3 horas.

Distribuição

Em doses terapêuticas, Hemitartarato de Zolpidem possui farmacocinética linear.

A ligação às proteínas plasmáticas é da ordem de 92% e o volume de distribuição em adultos é de 0,54 + 0,02 l/Kg.

Eliminação

Hemitartarato de Zolpidem é metabolizado no fígado e eliminado na forma de metabólitos inativos, na urina (aproximadamente 60%) e nas fezes (aproximadamente 40%), não possuindo efeito indutivo sobre as enzimas hepáticas. A meia-vida plasmática é, em média, de 2,4 horas (0,7 a 3,5 horas). Em pacientes idosos, observa-se uma diminuição na depuração hepática, havendo um aumento de cerca de 50% nas concentrações de pico, sem prolongamento significativo na meia-vida (média: 3 horas). O volume de distribuição apresenta-se reduzido em 0,34 + 0,05l/Kg. Na presença de insuficiência renal, com ou sem diálise, ocorre uma leve diminuição na depuração renal, mas os outros parâmetros cinéticos não são alterados. O Hemitartarato de Zolpidem não é dialisável. A biodisponibilidade encontra-se aumentada em pacientes com insuficiência hepática. A depuração é consideravelmente reduzida e a meia-vida prolongada (aproximadamente 10 horas).

INDICAÇÃO: Tratamento da insônia ocasional ou transitória.

REAÇÕES ADVERSAS: Alucinações, agitação, pesadelos, sonolência, dor de cabeça, tontura, insônia exacerbada, fadiga, distúrbios cognitivos, distúrbio visual, agressividade, desilusão, acessos de raiva, comportamento inapropriado, sonambulismo, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, nervosismo, encefalopatia hepática.

RISCOS NA GRAVIDEZ: C

LACTAÇÃO: Embora a concentração de zolpidem no leite materno seja baixa, deve-se ter cautela ao utilizar este medicamento em mulheres durante o período de amamentação.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral

CLASSIFICAÇÃO (CATEGORIA TERAPÊUTICA): Agente hipnótico não benzodiazepínico.

APRESENTAÇÃO: Comprimido – 10 mg.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Depressores do SNC: risco de depressão do SNC. Fluovaxamina, ciprofloxacino, cetoconazol, fluconazol: estes fármacos inibem o metabolismo do zolpidem, aumentando seus efeitos. Fluoxetina, sertralina, bupropriona: risco de alucinação, erva-de-são-joão, rifampicina: redução do efeito do zolpidem.

POSOLOGIA: Tomar 1 comprimido de 10 mg imediatamente antes de deitar ou na cama.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em temperatura ambiente (15 a 30 °C) ao abrigo da luz e umidade.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Insuficiência respiratória severa ou aguda ou com insuficiência hepática severa.

CUIDADOS MÉDICOS: Deve ser usado com cautela em pacientes com síndrome da apneia do sono e miastenia gravis. No caso de sedativos/hipnóticos com curta duração de ação, pode ocorrer o fenômeno de retirada durante intervalo de dose. A falta de efeito do tratamento após 7 a 14 dias de uso pode indicar a presença de um distúrbio psiquiátrico primário ou uma desordem física, devendo o paciente ser reavaliado em intervalos regulares.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Pacientes idosos ou debilitados podem apresentar uma sensibilidade maior aos efeitos do zolpidem. Recomenda-se dose de 5mg (não deve ser exceder 10 mg). Recomenda-se um acompanhamento neste tipo de paciente. A posologia preconizada para pacientes acima de 65 anos deve ser rigorosamente seguida.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Orientar quanto a higiene do sono. Deve ser sempre administrado com água e imediatamente antes de deitar ou na cama.

HOMEOPÁTICOS

O tratamento homeopático atua visando a saúde da pessoa como um todo, considerando fatores físicos, emocionais, comportamentais e espirituais. Sendo assim muitas substâncias são utilizadas em associação.

ACIDUM ACETICUM

POSOLOGIA: Uso oral.

Adultos: 10 gotas 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças: 5 gotas 2 a 3 vezes ao dia. Recomendado o uso para crianças acima de 2 anos.

O medicamento deve ser tomado longe das refeições, no mínimo meia hora antes ou depois. Se for ingeri-lo próximo à escovação dos dentes, o paciente deverá fazê-lo 10 minutos antes ou 30 depois.

ARMAZENAMENTO: Manter em temperatura ambiente (15 a 30 ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. O medicamento não deve ser guardado em locais que contenham cheiros fortes e nem próximos a aparelhos que emitam radiações (televisão, geladeira, detectores de metal, telefones celulares, computador, rádio etc.).

RISCOS NA GRAVIDEZ: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, exceto sob orientação médica.

LACTAÇÃO: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, exceto sob orientação médica.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

INDICAÇÃO: O *Aceticum acidum* é indicado nos casos profundos de anemia com sintomas hidrópicos, ou seja, com retenção anormal de líquidos; vômitos; dificuldades na respiração; forte transpiração; urina pálida e abundante; inapetência; sensação alternada de calor. Possui grande sensibilidade ao frio, violenta dor no estômago seguida de suores frios na fronte. Sede violenta e insaciável que acompanha fraqueza e emagrecimento. Inspiração seguida de tosse.

Muito útil no tratamento do diabetes, com ou sem açúcar na urina, quando há grande sede, fraqueza e palidez. Indicado na agalactia depois do parto; a criança não prospera no peito, a mãe e a criança estão pálidas e magras. Após picada e mordida de insetos. Grande benefício em pacientes com câncer com albumina na urina e edema dos membros inferiores. Útil nas hemorragias de qualquer tipo, acompanhada por intensa queimação no estômago que irradia para o peito.

CONTRAINDICAÇÃO: Pessoas com hipersensibilidade às substâncias da fórmula não devem ingerir/utilizar o produto. No caso do surgimento de alguma hipersensibilidade, sugere-se descontinuar o uso do produto e consultar um médico.

CUIDADOS GERAIS: Nunca use medicamento sem orientação de um profissional habilitado. Todo medicamento homeopático deve ser mantido longe do alcance de crianças. Ao tomar medicamentos em gotas, não encoste a cânula na boca, pois isso poderá levar contaminação para o interior do frasco do medicamento. As gotas podem ser utilizadas diretamente na boca, sublingual ou diluídas em pequena quantidade de água (uma colher de chá). Formulações líquidas deverão ser agitadas, no mínimo, 10 vezes antes de serem administradas.

ACIDUM CARBOLICUM

POSOLOGIA: Uso oral.

Adultos: 10 gotas 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças: 5 gotas 2 a 3 vezes ao dia. Recomendado o uso para crianças acima de 2 anos.

O medicamento deve ser tomado longe das refeições, no mínimo meia hora antes ou depois. Se for ingeri-lo próximo à escovação dos dentes, o paciente deverá fazê-lo 10 minutos antes ou 30 depois.

ARMAZENAMENTO: Manter em temperatura ambiente (15 a 30 ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. O medicamento não deve ser guardado em locais que contenham cheiros fortes e nem próximos a aparelhos que emitam radiações (televisão, geladeira, detectores de metal, telefones celulares, computador, rádio etc.).

RISCOS NA GRAVIDEZ: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, exceto sob orientação médica.

LACTAÇÃO: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, exceto sob orientação médica.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

INDICAÇÃO: É um remédio homeopático eficaz usado no tratamento da prostração e de doenças relacionadas. Alivia os sinais de fadiga e exaustão e trata as dores intensamente. O *Acidum Carbolicum* é um remédio eficaz para o tratamento da escarlatina e trata distúrbios abdominais, incluindo dores no abdômen, indigestão e vômitos. Também é indicado para dores de cabeça fortes com letargia e falta de vontade de trabalhar. Altamente eficaz no tratamento da gripe crônica e também alivia o nariz entupido. Trata dores de garganta e cura cortes e feri-

das nos lábios e dentro da boca. Trata distúrbios estomacais, como flatulência e perda de apetite. Atua como um laxante e alivia problemas relacionados à constipação. Trata a descoloração da urina e o aumento da vontade de urinar com frequência. Remédio útil para o tratamento de leucorreia e cura a formação de espinhas na vagina. Trata dores nos ovários e arranhões no útero. Também pode ser usado no tratamento de doenças de pele, como eczema, coceira e erupções cutâneas.

CONTRAINDICAÇÃO: Pessoas com hipersensibilidade às substâncias da fórmula não devem ingerir/utilizar o produto. No caso do surgimento de alguma hipersensibilidade, sugere-se descontinuar o uso do produto e consultar um médico.

CUIDADOS GERAIS: Todo medicamento deve ser mantido longe do alcance de crianças. Ao tomar medicamentos em gotas, não encoste a cânula na boca, pois isso poderá levar contaminação para o interior do frasco do medicamento. As gotas podem ser utilizadas diretamente na boca, sublingual ou diluídas em pequena quantidade de água (uma colher de chá). Formulações líquidas deverão ser agitadas, no mínimo, 10 vezes antes de serem administradas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

ACIDUM FORMICUM

POSOLOGIA: Uso oral.

Adultos: 10 gotas 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças: 5 gotas 2 a 3 vezes ao dia. Recomendado o uso para crianças acima de 2 anos.

O medicamento deve ser tomado longe das refeições, no mínimo meia hora antes ou depois. Se for ingeri-lo próximo à escovação dos dentes, o paciente deverá fazê-lo 10 minutos antes ou 30 depois.

ARMAZENAMENTO: Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. O medicamento não deve ser guardado em locais que contenham cheiros fortes e nem próximos a aparelhos que emitam radiações (televisão, geladeira, detectores de metal, telefones celulares, computador, rádio etc.).

RISCOS NA GRAVIDEZ: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, exceto sob orientação médica.

LACTAÇÃO: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes e lactantes, exceto sob orientação médica.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

INDICAÇÃO: Indicado para aliviar dores que aparecem repentinamente. É usado para reduzir as dores musculares e para ajudar no bom funcionamento dos rins. Doenças relacionadas ao estômago: dor em queimação no estômago e distúrbios gástricos podem ser aliviados com seu uso.

CONTRAINDICAÇÃO: Pessoas com hipersensibilidade às substâncias da fórmula não devem ingerir/utilizar o produto. No caso do surgimento de alguma hipersensibilidade, sugere-se descontinuar o uso do produto e consultar um médico.

CUIDADOS GERAIS: Todo medicamento deve ser mantido longe do alcance de crianças. Ao tomar medicamentos em gotas, não encoste a cânula na boca, pois isso poderá levar contaminação para o interior do frasco do medicamento. As gotas podem ser utilizadas diretamente na boca, sublingual ou diluídas em pequena quantidade de água (uma colher de chá). Formulações líquidas deverão ser agitadas, no mínimo, 10 vezes antes de serem administradas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

ACIDUM LACTICUM

POSOLOGIA: Uso oral.

Adultos: 10 gotas 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças: 5 gotas 2 a 3 vezes ao dia.

O medicamento deve ser tomado longe das refeições, no mínimo meia hora antes ou depois. Se for ingeri-lo próximo à escovação dos dentes, o paciente deverá fazê-lo 10 minutos antes ou 30 depois.

ARMAZENAMENTO: Manter em temperatura ambiente (15 a 30 ºC). Proteger da luz, do calor e da umidade. O medicamento não deve ser guardado em locais que contenham cheiros fortes e nem próximos a aparelhos que emitam radiações (televisão, geladeira, detectores de metal, telefones celulares, computador, rádio etc.).

RISCOS NA GRAVIDEZ: Este medicamento não deve ser utilizado por gestantes, exceto sob orientação médica.

LACTAÇÃO: Este medicamento não deve ser utilizado por lactantes, exceto sob orientação médica.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

INDICAÇÃO: O *Lacticum acidum* é indicado para dores nos seios, que se estendem para o braço, como o entumescimento das glândulas. Também é indicado para dores reumáticas nas articulações devido ao diabetes; para as náuseas pela manhã que melhoram ao comer. Grande salivação. Muito útil na diarreia em crianças recém-nascidas, com febre alta e prostração.

CONTRAINDICAÇÃO: Pessoas com hipersensibilidade às substâncias da fórmula não devem ingerir/utilizar o produto. No caso do surgimento de alguma hipersensibilidade, sugere-se descontinuar o uso do produto e consultar um médico.

UNHA-DE-GATO

NOME BOTÂNICO: *Uncaria tomentosa.*

MECANISMO DE AÇÃO: Sem informação.

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA: Sem informação.

INDICAÇÃO: Indicada para o tratamento de processos inflamatórios articulares, como osteoartrite e artrite reumatoide (reumatismo).

REAÇÕES ADVERSAS: Têm sido verificados casos de febre, prisão de ventre ou diarreia, que acabam antes da suspensão do medicamento. Os níveis hormonais (estradiol e progesterona) no soro podem ser reduzidos depois de um tempo prolongado utilizando unha-de-gato.

RISCOS NA GRAVIDEZ: Contraindicado.

RISCOS NA LACTAÇÃO: Contraindicado.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

APRESENTAÇÃO: Comprimidos revestidos.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Desaconselha-se seu uso em conjunto com antiácidos e medicamentos imunossupressores, como, por exemplo, a ciclosporina. Efeitos adversos têm sido observados quando se administra em associação a proteínas injetáveis para tratamentos celulares, hormonais etc.

POSOLOGIA: Ingerir um comprimido, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas. Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e com uma quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidos.

ARMAZENAMENTO: Local seco e arejado.

RECONSTITUIÇÃO/DILUIÇÃO: Não se aplica.

SOLUÇÃO COMPATÍVEL: Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes transplantados devem evitar o uso da unha-de-gato, devido à possibilidade de produzir rejeição. Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para uso por crianças.

CUIDADOS GERAIS: Após a utilização do produto, orienta-se esperar 1 ano antes de aceitar um transplante. Devido ao alto efeito imunoestimulante, deve-se evitar o uso da unha-de-gato 2 dias antes e 2 dias depois da aplicação da quimioterapia. Há um relato de falência renal aguda associada à ingestão da unha-de-gato em um paciente com lúpus eritematoso sistêmico. Embora o paciente tenha ingerido vários outros medicamentos ao mesmo tempo, somente o tratamento com unha-de-gato foi descontinuado. Os resultados da urinálise retornaram gradualmente ao normal após a descontinuação do uso. Foi demonstrado que o uso por tempo prolongado (8 semanas) da unha-de-gato resultou em queda dos níveis de estradiol e progesterona no soro. Desta forma, recomenda-se que o tratamento não ultrapasse 2 meses, exceto por orientação médica. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

CUIDADOS MÉDICOS: Atentar-se para contraindicações.

CUIDADOS FARMACÊUTICOS: Sem informação.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Atentar-se para efeitos adversos.

ÍNDICE DE NOME COMERCIAL

AAS
Ácido acetilsalicílico 18
ABELCET
Anfotericina B e Anfotericina B complexo lipídico 91
ABILIFY
Aripiprazol 99
ABLOK
Atenolol 107
ACCOLATE
Zafirlucaste 1206
ACEBROFILINA (GENÉRICO)
Acebrofilina 7
ACECLOFENACO (GENÉRICO)
Aceclofenaco 7
ACETAMIL
Paracetamol (Acetaminofeno) 957
ACETATO DE DEXAMETASONA (GENÉRICO)
Dexametasona, acetato tópico 349
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA
Medroxiprogesterona, acetato 783
ACETATO DE MEGESTROL
Megestrol, acetato 786
ACETILOL
Paracetamol (Acetaminofeno) 957
ACETOFEN
Paracetamol (Acetaminofeno) 957
ACFOL
Ácido fólico 22
ACIBIO
Aciclovir, oftálmico 16
ACI- CLOMED
Aciclovir, oftálmico 16
ACICLOVIR (GENÉRICO)
Aciclovir, injetável 15
Aciclovir, oftálmico 16
Aciclovir, via oral 17
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (GENÉRICO)
Ácido acetilsalicílico 18
ÁCIDO FÓLICO (GENÉRICO)
Ácido fólico 22
ÁCIDO MEFENÂMICO (GENÉRICO)
Ácido mefenâmico 23
ACINIC
Niacina, via oral (ou Vitamina B3, ou Ácido Nicotínico) 889
NICOTÍNICO, ÁCIDO 892
ACIVERAL
Aciclovir, oftálmico 16
ACIVIRAX
Aciclovir, oftálmico 16
ACLASTA
Ácido zoledrônico 31
ACNASE
Benzoperóxido (Peróxido de benzoíla) + enxofre 139
ACNEE LOSS
Benzoperóxido (Peróxido de benzoíla) + enxofre 139
ACNESAN
Peróxido de benzoíla 976
ACNEZIL
Benzoperóxido (Peróxido de benzoíla) + enxofre 139
Peróxido de benzoíla 976
ACNIL
Isotretinoína, via oral 693
ACTEMRA
TOCILIZUMABE 1130
ACTICALCIN
Calcitonina 186
ACTILYSE
ALTEPLASE 67
ACTONEL
Risedronato sódico 1047
ACTOS
Pioglitazona 979
ACULAR
Cetorolaco, tópico oftálmico 237
A CURITIBINA EMPLASTO
ÁCIDO SALICÍLICO TÓPICO 28
A CURITIBINA PASTA
ÁCIDO SALICÍLICO TÓPICO 28
ADACNE
Adapaleno 34
ADALAT
Nifedipina 894
ADALAT OROS
Nifedipina 894
ADALAT RETARD
Nifedipina 894
ADAPALENO (GENÉRICO)
Adapaleno 34
ADAPEL
Adapaleno 34
ADCIRCA
Tadalafila 1100
ADENOCARD
Adenosina 35
ADRENALINA
Epinefrina, injetável 424
ADTIL
Vitamina A + D, via oral 1191
ADVATE
Fator de coagulação VIII, concentrado 474
ADVIL
Ibuprofeno 631
AEROFLUX
Guaifenesina 593
AEROGOLD
Salbutamol, spray e solução inalante 1057
AEROJET
Salbutamol, spray e solução inalante 1057
AEROLIN
Salbutamol, injetável 1056
Salbutamol, spray e solução inalante 1057
Salbutamol, via Oral 1058
AFINITOR
Everolimo 467
AFOPIC
Ácido fólico 22
AFRIN
Oximetazolina 944
AFRIN 12 HORAS
Oximetazolina 944
AFRIN PEDIÁTRICO
Oximetazolina 944
AGENERASE
Amprenavir 89
AGLUCOSE
Acarbose 6
AGLUTIL
Pioglitazona 979
AGRASTAT
Tirofibana, cloridrato 1129
AIRES
Acetilcisteína, injetável 12
Acetilcisteína, solução nasal 13
Acetilcisteína, via oral 14
AKINETON
Biperideno, cloridrato 154
Biperideno, lactato 155
ALBENDAZOL
Albendazol 38
ALBENDAZOL (GENÉRICO)
Albendazol 38
ALBISTIN
Nistatina, tópica 902
Nistatina, via Oral 902
ALBOCRESIL
Ácido metacresolsulfônico, solução (policresuleno) 24
ALBUMAX
Albumina humana 39
ALBUMINA HUMANA
Albumina humana 39
ALBUMINAR
Albumina humana 39
ALCYTAM
Citalopram 262
ALDACTONE
Espironolactona, via oral 445
ALDARA
Imiquimode 645
ALDAZIDA
Hidroclorotiazida 608
ALDOMET
Metildopa 812
ALDOSTERIN
Espironolactona, via oral 445
ALDOTENSIN
Metildopa 812
ALDROX
Hidróxido de alumínio 615
ALDURAZYME
LARONIDASE 710
ALENDIL
Alendronato de sódio 41
ALENDRIN
Alendronato de sódio 41
ALENIA
Formoterol + budesonida 542
ALENTHUS
Venlafaxina 1178
ALENTHUS XR
Venlafaxina 1178
ALERGALIV
Loratadina 772
ALEXAN
Citarabina 263
ALFAD
Alfacalcidol 45
ALFAINTERFERONA 2B RECOMBINANTE
Alfainterferona 2b 50
ALFAST
Alfentanila 58
ALFRON
Alprazolam 64
ALFUSINA
Metildopa 812
ALGEXIN
Escopolamina, via oral 440
ALGIFLEX
Ibuprofeno 631
ALGIPROFEN
Cetoprofeno, injetável 233
ALGI TANDERIL (CARISOPRODOL + PARACETAMOL + DICLOFENACO + CAFEÍNA)
Carisoprodol + ASSOCIAÇÕES, via oral 205
ALIMITA
Pemetrexede 967
ALIVIAN
Meloxicam, injetável 788
Meloxicam, via oral 789
ALIVIUM
Ibuprofeno 631
ALKERAN
Melfalana 787
ALLEGRA
Fexofenadina 501
ALLEXOFEDRIN
Fexofenadina 501
ALLEXOFEDRIN D (ASSOCIADO COM PSEUDOEFEDRINA)
Fexofenadina 501
ALLOPURINOL
Alopurinol 63
ALOIS
Memantina 790
ALOPURINOL (GENÉRICO)
Alopurinol 63
ALPHABRIN
Brimonidina 165
ALPHABRIN P
Brimonidina 165
ALPHAGAN
Brimonidina 165
ALPHAGAN P
Brimonidina 165
ALPHAGAN Z
Brimonidina 165
ALPHAMINE SD
Fator de coagulação IX, concentrado derivado de plasma humano 475
ALTIVA
Fexofenadina 501
ALTROX
Alprazolam 64
ALVENT
Ipratrópio, brometo 677
ALVEOFACT
Beractanto 139
ALVESCO (AEROSSOL)
Ciclesonida, aerossol 240
ALZEPINOL
Oxcarbazepina 938
AMBISOME
Anfotericina B, lipossomal 93
AMBROX
Ambroxol 73
AMICACIL
Amicacina, sulfato 74
AMICACINA (GENÉRICO)
Amicacina, sulfato 74
AMICILON
Amicacina, sulfato 74
AMICORED
CIANOCOBALAMINA 239
AMIKIN
Amicacina, sulfato 74
AMINOFILINA (GENÉRICO)
Aminofilina, injetável 75
AMIOBAL
Amiodarona, cloridrato de, injetável .. 77
Amiodarona, cloridrato de, via oral ... 78
AMIODARONA (GENÉRICO)
Amiodarona, cloridrato de, via oral ... 78
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (GENÉRICO)
Amoxicilina + clavulanato de potássio, injetável 84
AMOXICILINA + CLAVULANATO (GENÉRICO)
Amoxicilina + clavulanato de potássio (Amoxicilina + clavulunato de potássio) 83
AMOXICILINA (GENÉRICO)
Amoxicilina, via oral 82
AMOXIL
Amoxicilina, via oral 82
AMPHOCIL
Anfotericina B e Anfotericina B complexo lipídico 91
AMPICIL
Ampicilina sódica, injetável 88
AMPICILAB
Ampicilina 85
AMPICILASE
Ampicilina 85
Ampicilina sódica, injetável 88
AMPICILIL
Ampicilina 85
AMPICILINA + SULBACTAM (GENÉRICO)
Ampicilina + sulbactam 87
AMPICILINA SÓDICA (GENÉRICO)
Ampicilina sódica, injetável 88
AMPITOTAL
Ampicilina sódica, injetável 88
AMPLACILINA
Ampicilina 85

ÍNDICE DE CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA

β-BLOQUEADOR SELETIVO (β1)
Metoprolol, tartarato, via oral 825

ADJUVANTE ANTITABAGISMO; ANTIDEPRESSIVO; INIBIDOR DA RECAPTAÇÃO DA DOPAMINA
Bupropiona 179

ADJUVANTE NA INTERRUPÇÃO DO TABAGISMO (AGONISTA PARCIAL DOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DA ACETILCOLINA)
Vareniclina 1169

AGENTE ALCALINIZANTE; ANTIÁCIDO; SUPLEMENTO ELETROLÍTICO PARENTERAL
Bicarbonato de sódio 151

AGENTE ANTICOLINÉRGICO; ANTIPARKINSONIANO
Biperideno, lactato 155

AGENTE ANTICOLINÉRGICO; MIDRIÁTICO: ANTÍDOTO; AGENTE ANTIESPASMÓDICO
Atropina, sulfato de, 0,25 mg/ml, injetável 112

AGENTE ANTI-ENXAQUECA; AGONISTA DO RECEPTOR 5-HT1B, 1D DA SEROTONINA. APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO 25, 50 E 100 MG
Sumatriptano (Sumatriptana) 1094

AGENTE ANTI-ENXAQUECA; DERIVADO DA ERGOTAMINA
Diidroergotamina, nasal 373

AGENTE ANTI-ESPASMÓDICO URINÁRIO
Oxibutinina 939

AGENTE ANTIFIBRINOLÍTICO; AGENTE HEMOSTÁTICO
Ácido aminocaproico, via oral 20

AGENTE ANTIFÚNGICO, PARENTAL; EQUINOCANDINAS
Caspofungina 209

AGENTE ANTIFÚNGICO, TÓPICO
Ciclopirox 245; Oxiconazol, tópico 943

AGENTE ANTI-HEMOFÍLICO; AGENTE HEMOSTÁTICO; ANÁLOGO DA VASOPRESSINA; SINTÉTICO
Desmopressina 343

AGENTE ANTI-HEMOFÍLICO; ANTIFIBRINOLÍTICO
Ácido tranexâmico 29

AGENTE ANTILIPEMIANTE; ÁCIDO FÍBRICO
Genfibrozila 573

AGENTE ANTINEOPLÁSICO; ANTIANDROGÊNICO
Bicalutamida 150

AGENTE ANTINEOPLÁSICO; ANTICORPO MONOCLONAL
Alentuzumabe 42

AGENTE ANTINEOPLÁSICO; ANTICORPO MONOCLONAL; INIBIDOR DO RECEPTOR DO FATOR DE CRESCIMENTO EPIDÉRMICO
Cetuximabe 238

AGENTE ANTINEOPLÁSICO; ANTIMETABÓLICO
Hidroxiureia 625

AGENTE ANTIPARKINSONIANO, AGONISTA DA DOPAMINA
Levodopa + Benserazida 740; Levodopa + Carbidopa 742

AGENTE ANTIPARKINSONIANO; INIBIDOR DA COMT
Entacapona 422

AGENTE ANTIPLAQUETÁRIO; ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO; ANTITROMBÓTICO
Clopidogrel 280

AGENTE ANTIPLAQUETÁRIO; VASODILATADOR
Dipiridamol, injetável 381

AGENTE ANTIPROGESTACIONAL; INIBIDOR DE GNRH
Gestrinona 576

AGENTE ANTI-PSICÓTICO, ATÍPICO
Clozapina 304

AGENTE ANTIRETROVIRAL; INIBIDOR DA PROTEASE
Indinavir 656

AGENTE ANTIRRETROVIRAL; INIBIDOR DA FUSÃO PROTEICA
Enfuvirtida 419

AGENTE ANTIRRETROVIRAL; INIBIDOR DA PROTEASE
Darunavir 331

AGENTE ANTIRRETROVIRAL; INIBIDOR DA PROTEASE
Tipranavir 1127

AGENTE ANTIRRETROVIRAL; INIBIDOR DA TRANSCRIPTASE REVERSA
Entecavir 423; Estavudina 446

AGENTE ANTITUBERCULOSE
Isoniazida 686; Isoniazida + Rifampicina 687; Pirazinamida 985

AGENTE ANTITUBERCULOSE; ANTIBIÓTICO, MISCELÂNEA
Capreomicina 194

AGENTE ANTITUBERCULOSE; ANTIBIÓTICO; MISCELÂNEA
Rifabutina 1034

AGENTE ANTIVIRAL
Penciclovir 968; Ribavirina 1030

AGENTE ANTIVIRAL; INIBIDOR DA NEURAMINIDASE
Zanamivir 1206

AGENTE BLOQUEADOR DE NEUROMUSCULAR; NÃO DESPOLARIZANTE
Cisatracúrio 259

AGENTE BLOQUEADOR DO FATOR DE NECROSE TUMORAL; INIBIDOR DA ANGIOGÊNESE
Talidomida 1103

AGENTE CERATOLÍTICO (AGENTE QUERATOLÍTICO); HIDRATANTE TÓPICO
Ureia 1149

AGENTE DE DESPIGMENTAÇÃO; DESPIGMENTADOR
Hidroquinona 613

AGENTE DE DISSOLUÇÃO DA LITÍASE BILIAR
Ursodiol ou Ácido Ursodesoxicólico 1151

AGENTE DE RESGATE (QUIMIOTERAPIA); ANTÍDOTO; AGENTE MODULADOR PARA A QUIMIOTERAPIA
Folinato de cálcio (ácido folínico), injetável 538; Folinato de cálcio (ácido folínico), via oral 540

AGENTE DIABÉTICO. DERIVADO DA MEGLITINIDA
Repaglinida 1029

AGENTE GASTROINTESTINAL; PROCINÉTICO; ANTAGONISTA DA DOPAMINA
Domperidona 393

AGENTE HEMOSTÁTICO; DERIVADO DE PRODUTOS SANGUÍNEOS
Aprotinina, injetável 98

AGENTE HIPNÓTICO NÃO BENZODIAZEPÍNICO
Zolpidem, Hemitartarato 1215

AGENTE IMUNOSSUPRESSOR
Daclizumabe 322

AGENTE IMUNOSSUPRESSOR; PRODUTO CUTÂNEO TÓPICO
Tacrolimo, tópico 1099

AGENTE IMUNOSSUPRESSOR, PRODUTO CUTÂNEO TÓPICO
Pimecrolimo 978

AGENTE MUCOLÍTICO
Levodropropizina 743

AGENTE MUCOLÍTICO
Ambroxol 73

AGENTE MUCOLÍTICO; ANTÍDOTO
Acetilcisteína, injetável 12
Acetilcisteína, solução nasal 13

AGENTE MUCOLÍTICO; ANTÍDOTO
Acetilcisteína, via oral 14

AGENTE OFTÁLMICO; ANTIGLAUCOMA
Betaxolol 147; Levobunolol 739

AGENTE OFTÁLMICO; ANTIGLAUCOMA; INIBIDOR DA ANIDRASE CARBÔNICA
Dorzolamida 397

AGENTE OFTÁLMICO, ANTIGLAUCOMA; PROSTAGLANDINA, OFTÁLMICA
Bimatoprosta 152

AGENTE OFTÁLMICO; MIDRIÁTICO
Atropina, colírio 111

AGENTE PARALISANTE DA FUNÇÃO NEUROMUSCULAR, AGENTE BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR, TOXINA; AGENTE OFTÁLMICO, TOXINA
Toxina botulínica tipo A 1137

AGENTE QUELANTE; ANTÍDOTO
Desferroxamina, mesilato (deferroxamina, mesilato) 341

AGENTE REDUTOR DA VISCOSIDADE SANGUÍNEA
Pentoxifilina, injetável 971; Pentoxifilina, via oral 972

AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS
Upadacitinibe 1148

AGENTE TOCOLÍTICO
Atosibana, injetável 109

AGENTE TROMBOLÍTICO
Estreptoquinase 451

AGONISTA ALFA-2 ADRENÉRGICO; SEDATIVO
Dexmedetomidina, injetável 355

AGONISTA ALFA/BETA
Efedrina 410

AGONISTA ALFA/BETA; ANTÍDOTO; SIMPATOMIMÉTICO E HIPERTENSOR
Epinefrina, injetável 424

AGONISTA ALFA/BETA; SIMPATICOMIMÉTICO; VASOCONSTRITOR NASAL
Fenilefrina, nasal (em associação) 481

AGONISTA BETA-2 ADRENÉRGICO
Bambuterol 122

AGONISTA BETA-2-ADRENÉRGICO
Formoterol + budesonida 542

AGONISTA BETA-2-ADRENÉRGICO
Salbutamol, via oral 1058

AGONISTA BETA-2-ADRENÉRGICO
Salbutamol, injetável 1056

AGONISTA BETA2-ADRENÉRGICO (AÇÃO PROLONGADA); BRONCODILATADOR E ANTIASMÁTICO
Salmeterol 1059

AGONISTA COLINÉRGICO
Betanecol 146

AGONISTA DA SEROTONINA E DA HISTAMINA
Pizotifeno 992

AGONISTA DO HORMÔNIO LIBERADOR DA GONADOTROFINA
Triptorrelina 1146

AGONISTA DO HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROPINA
Nafarelina, spray nasal 871

AGONISTA DO RECEPTOR 5-HT4 DA SEROTONINA
Tegaserode (tegaserod) 1107

AGONISTA H1 DA HISTAMINA
Betaistina 143

AGONISTA β2 ADRENÉRGICO DE AÇÃO CURTA
Salbutamol, spray e solução inalante 1057

AINE (ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO HORMONAL) TÓPICO
Etofenamato 460

AMEBICIDA
Etofamida 459