

Examen de regularidad Estadística aplicada 2018

Emiliano P. López

November 11, 2018

Ejercicio 1

a) Complete la siguiente tabla ANOVA ingresando los valores de los grados de libertad y los cuadrados medios esperados (teóricos).

Se completaron los E(MS) utilizando el modelo con restricciones (como los arroja R)

Fuente de variabilidad	Df	MS	E(MS)
T	$(t-1) = (4-1) = 3$	3.79	$\sigma^2 + r\sigma_{T^*R(A)}^2 + acr\theta_T^2$
A	$(a-1) = (3-1) = 2$	13.27	$\sigma^2 + rt\sigma_{R(A)}^2 + tcr\theta_A^2$
T*A	$(t-1)(a-1) = (4-1)(3-1) = 6$	2.78	$\sigma^2 + r\sigma_{TR(A)}^2 + cr\theta_{TA}^2$
R(A)	$a(c-1) = 3(10-1) = 27$	2.58	$\sigma^2 + rt\sigma_{R(A)}^2$
T*R(A)	$(t-1)a(c-1) = (4-1)3(10-1) = 81$	1.06	$\sigma^2 + r\sigma_{TR(A)}^2$
Error	$tac(r-1) = 4310(2-1) = 120$	0.91	σ^2

Donde,

- t es la cantidad de niveles del factor T (tipos de quesos cheddar)
- a es la cantidad de niveles del factor A (grupos de edad)
- c es la cantidad de niveles del factor R (profesionales)
- r es la cantidad de réplicas

b) Se ajustó el siguiente modelo para los datos donde Y_{ijkm} es la calificación de amargor de la m-ésima porción de queso tipo i del k-ésimo evaluador en el grupo de edad j:

$$Y_{ijkm} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + C_{k(j)} + D_{ik(j)} + \epsilon_{ijkm}$$

Establezca todas las condiciones que se deben asumir sobre los términos del modelo para poder llevar a cabo los procedimientos de análisis de varianza.

El modelo previo es de efectos mixtos, de términos fijos y aleatorios, donde para los efectos aleatorios es de interés estudiar la varianza de dichos efectos mientras que para los fijos el interés probar la hipótesis directamente sobre tales efectos (medias).

Las suposiciones sobre el error aleatorio es que sigue una distribución normal con media cero y varianza constante, $N(0, \sigma^2)$, y son independientes entre sí. A continuación se detalla cada término del modelo:

- α_i , efecto fijo, i niveles para el factor tipos de queso (T)
- β_j , efecto fijo, j niveles para el factor grupos de edad (A)
- $(\alpha\beta)_{ij}$, efecto fijo interacción entre T y A
- $C_{k(j)}$, efecto aleatorio, k niveles de profesionales (R) anidados a los grupos de edad
- $D_{ik(j)}$, efecto aleatorio interacción entre los tipos de queso y los profesionales anidados a los grupos de edad

Para los términos $C_{k(j)}$, $D_{ik(j)}$ y ϵ_{ijkm} son variables aleatorias independientes normales, con media cero y varianzas σ_C^2 , $\sigma_{\alpha C}^2$ y σ^2 , por lo tanto, en la varianza total del modelo los factores α y β no aportan dado que son fijos, pero sí se mantiene el componente de interacción D por ser C aleatorio. Se puede escribir del siguiente modo:

$$var(Y_{ijkm}) = \sigma_C^2 + \sigma_{\alpha C}^2 + \sigma^2$$

c)

- $H_0: \beta_j = 0$, para $j = 1 \cdots a$
- $H_1: \beta_j \neq 0$

$$F = \frac{MSA}{MSR(A)} = \frac{13.27}{2.58} = 5.1434$$

Como $pvalor = 1 - pf(5.1434, 2, 27) = 0.0128 < 0.05$, por lo tanto rechazamos H_0 y concluimos que el efecto de la edad del evaluador es significativa.

Ejercicio 2

```
In [11]: # lectura de datos
datos = read.csv("hongos.txt", sep = "\t")
head(datos)
attach(datos)
```

time	humidity	grow.media	growth
25	45	M1	8.1
25	45	M1	8.9
25	60	M1	2.2
25	60	M1	1.1
25	85	M1	18.6
25	85	M1	12.3

```
In [12]: timef = as.factor(time) # conversion a factor
humidityf = as.factor(humidity)
growmediaf = as.factor(grow.media)
```

a) Escriba un modelo para el análisis de estos datos. Indique el significado de cada parámetro que usa en el contexto del problema, valores de los subíndices y todas las suposiciones realizadas.

El modelo es:

$$y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + \epsilon_{ijkl}$$

A continuación se describen los parámetros del modelo y el rango de los índices:

- μ : es la media global
- α_i : es el tiempo, con $i = 1 \dots 3$
- β_j : es la humedad, con $j = 1 \dots 3$
- γ_k : es el medio de crecimiento, con $k = 1 \dots 2$
- $(\alpha\beta\gamma)_{ijk}$: efecto de la interacción entre el tiempo, humedad y crecimiento
- $(\alpha\beta)_{ij}$: efecto de la interacción entre tiempo y humedad
- $(\alpha\gamma)_{ik}$: efecto de la interacción entre tiempo y medio de crecimiento
- $(\beta\gamma)_{jk}$: efecto de la interacción entre la humedad y medio de crecimiento
- ϵ_{ijkl} : es el error experimental, con $l = 1 \dots 36$

Las suposiciones del modelo son:

- $\epsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2)$, independientes idénticamente distribuidos

Las restricciones del modelo son:

- $\alpha_1 = 0$
- $\beta_1 = 0$
- $\gamma_1 = 0$
- $(\alpha\beta)_{1j} = 0$
- $(\alpha\beta)_{i1} = 0$
- $(\alpha\gamma)_{1k} = 0$
- $(\alpha\gamma)_{i1} = 0$
- $(\beta\gamma)_{1k} = 0$
- $(\beta\gamma)_{j1} = 0$
- $(\alpha\beta\gamma)_{1jk} = 0$
- $(\alpha\beta\gamma)_{i1k} = 0$
- $(\alpha\beta\gamma)_{ij1} = 0$

b) Explique por que decidió incluir (o no) un término correspondiente a la interacción triple entre los tres factores en el modelo propuesto.

Se incluyó un término de interacción triple en el modelo ya que tenemos 3 factores fijos y bajo el supuesto de independencia, se puede esperar que exista una posible interacción entre ellos.

c) ¿Que gráficos utilizaría para dar una respuesta exploratoria al problema planteado? Explique que precauciones tendría al realizarlo y por que.

Debido a que tenemos tres factores fijos que interactúan entre sí, no tendría sentido ver el boxplot, pero sí sería útil analizar gráficos de interacción para cada medio de cultivo (M1 y M2),


y observando la interacción entre la humedad y el tiempo.


Para tener una idea del comportamiento, lo más razonable sería dejar el tiempo en el eje de abscisas y ver para las distintas humedades la correspondiente respuesta (crecimiento del hongo).

Debemos tener la precaución de mostrar las interacciones entre dos de los factores fijando un nivel del tercero, ya que sino veremos un promedio para el nivel fijado.

A continuación observamos el tipo de gráfico de interacción mencionado:.

```
In [17]: interaction.plot(timef[grow.media=="M1"], humidityf[grow.media=="M1"],  
                           growth[grow.media=="M1"],  
                           interaction.plot(timef[grow.media=="M2"], humidityf[grow.media=="M2"],  
                           growth[grow.media=="M2"])
```





d) El ajuste del modelo a los datos arroja la siguiente tabla anova... En función de estos resultados, escriba un nuevo modelo que le parezca adecuado para los datos.

```
In [14]: modelo = aov(growth~timef*humidityf*growmediaf)
         summary(modelo)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
timef	2	86.3	43.1	5.609	0.01278	*
humidityf	2	540.6	270.3	35.144	6.09e-07	***
growmediaf	1	1009.1	1009.1	131.206	1.06e-09	***
timef:humidityf	4	34.9	8.7	1.135	0.37155	
timef:growmediaf	2	123.8	61.9	8.049	0.00318	**
humidityf:growmediaf	2	132.6	66.3	8.622	0.00236	**
timef:humidityf:growmediaf	4	29.4	7.4	0.957	0.45459	
Residuals	18	138.4	7.7			

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

De la tabla ANOVA previa podemos descartar aquellos factores o interacción de factores cuyo p -valor sea mayor a la significancia $\alpha = 0.05$, de este modo se excluye del modelo los siguientes términos:

- timef:humidityf, ($\alpha\beta$)
- timef:humidityf:growmediaf, ($\alpha\beta\gamma$)

Finalmente el modelo nos queda:

$$y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + \epsilon_{ijkl}$$

e) A partir del ultimo modelo, ¿que gráficos exploratorios podria realizar ahora para estudiar la dependencia entre la respuesta y los factores considerados? ¿En que se diferencia esta respuesta de la dada en el ítem c)?

Luego de descartar el término de interacción doble timef:humidityf y triple timef:humidityf:growmediaf realizaría dos gráficos de interacción para los términos cuya interacción sea significativa, es decir:

- timef:growmediaf: dejando fijo la humedad (β)
- humidityf:growmediaf: dejando fijo el tiempo (α)

En el *item c*), sin tener conocimiento sobre las interacciones, se fijó el medio de crecimiento y se observaron las interacciones entre el tiempo y la humedad, sin embargo ahora vemos que este factor interactúa con cada uno de los otros dos factores en forma separada, por lo que es relevante analizar su comportamiento sin ser éste el factor fijado.

f) Prosiguiendo con su análisis, el investigador obtuvo la siguiente tabla:

```
In [16]: # genera tabla del enunciado
contrasts(humidityf) = contr.poly(3)
modelo2 = lm(growth~timef*humidityf*growmediaf -
              (timef:humidityf:growmediaf + timef:humidityf))
summary(modelo2)
```

Call:

```
lm(formula = growth ~ timef * humidityf * growmediaf - (timef:humidityf:growmediaf +
  timef:humidityf))
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-5.0111	-1.3486	-0.0333	1.1403	6.0722

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	8.53333	1.14018	7.484	6.03e-08	***
timef50	-0.03333	1.61246	-0.021	0.983665	
timef75	-0.70000	1.61246	-0.434	0.667782	
humidityf.L	2.60451	1.14018	2.284	0.030762	*
humidityf.Q	5.27321	1.14018	4.625	9.05e-05	***
growmediafM2	6.63333	1.61246	4.114	0.000347	***

```

timef50:growmediafM2      2.95000    2.28036    1.294 0.207159
timef75:growmediafM2      8.91667    2.28036    3.910 0.000591 ***
humidityf.L:growmediafM2  5.91613    1.61246    3.669 0.001101 **
humidityf.Q:growmediafM2 -3.03465    1.61246   -1.882 0.071075 .

```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.793 on 26 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9032, Adjusted R-squared: 0.8697

F-statistic: 26.96 on 9 and 26 DF, p-value: 5.566e-11

OBSERVACIÓN: La tabla del enunciado contiene un error ya que supuso que la humedad se encontraba equispaciada cuando en realidad no es así, a continuación se usa la misma tabla para que los resultados sean consistentes a los del enunciado.

¿A qué análisis corresponde este resumen? Qué representa cada uno de los términos?

Cuando los niveles de un factor son cuantitativos y presentan un orden es interesante realizar un análisis de tendencias.

La tabla previa se corresponde con un análisis de tendencia para estudiar si la variable respuesta se incrementa o decrementa cuando varía la *Humedad* usando una estimación lineal o cuadrática.

Para dar respuesta a este interrogante es necesario comparar los *p-valores* con un nuevo α_{PC} que determine la probabilidad de cometer al menor un error de tipo I para una familia de contrastes ortogonales. Para el cálculo se requiere un valor deseado de $\alpha_0 = 0.05$ utilizando la siguiente ecuación:

$$\alpha_{PC} = 1 - (1 - \alpha_0)^{1/9} = 0.0056$$

En la tabla, los factores o interacciones de factores que terminan en .Q o .50 refieren a la tendencia cuadrática, mientras que los que finalizan con .L o .75, a la lineal.

g) En función del reporte presentado en la tabla anterior, escriba un modelo genérico (sin el valor de los parámetros) adecuado para describir la (superficie de) respuesta del crecimiento de la especie de hongo estudiada en función de los factores considerados.

Sea x_1 , x_2 y x_3 tiempo, humedad y medio de crecimiento respectivamente, y ϵ el error aleatorio, según la tabla previa el modelo cuadrático genérico tiene la siguiente forma:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2 + \beta_3 x_2 + \beta_4 x_2^2 + \beta_5 x_3 + \beta_6 x_1 x_3 + \beta_7 x_1^2 x_3 + \beta_8 x_2 x_3 + \beta_9 x_2^2 x_3 + \epsilon$$

h) Explique como procedería para determinar cual es la combinación de factores que mas favorece el crecimiento de hongos. ¿Encuentra alguna limitación o dificultad en el procedimiento que propone?

Para determinar la mejor combinación de los factores sería conveniente realizar comparaciones múltiples usando Dunnet, en este caso previamente habría que optimizar para elegir el máximo, para eso es posible usar la función `maxHSU` ya que queremos saber aquellas combinaciones que favorecen el crecimiento. Se recomienda que el tamaño de muestra del tratamiento control sea grande, a fin de estimar su media con mayor precisión.

La limitación que podríamos encontrar es que al contar con pocas réplicas (2 por hongo) tenemos baja potencia

```
In [7]: source("mymultcomp.R")
        fABC = factor(paste(timef, humidityf, growmediaf))
        maxHSU(growth, fABC, alpha=0.05, mse=7.7, dof=18)

[1] "WARNING: esta funcion considera que todos los ni son iguales"
[1] "50 85 M2"
[1] "75 85 M2"
```

1. NA 2. '50 85 M2' 3. '75 85 M2'


i) Indique cual es el crecimiento medio del hongo que predice el modelo si se cultiva en el medio M2 durante 50 horas y con una humedad del 60%.

A partir de la tabla de medias vemos que para el medio M2, durante 50 horas a una humedad del 60%, tenemos una media de 16.95.

```
In [8]: library(lsmeans)
        lsmeans(modelo, ~timef*humidityf*growmediaf)
        plot(lsmeans(modelo, ~timef*humidityf*growmediaf))
```

timef	humidityf	growmediaf	lsmean	SE	df	lower.CL	upper.CL
25	45	M1	8.50	1.961009	18	4.3800734	12.619927
50	45	M1	9.05	1.961009	18	4.9300734	13.169927
75	45	M1	8.25	1.961009	18	4.1300734	12.369927
25	60	M1	1.65	1.961009	18	-2.4699266	5.769927
50	60	M1	6.45	1.961009	18	2.3300734	10.569927
75	60	M1	3.85	1.961009	18	-0.2699266	7.969927
25	85	M1	15.45	1.961009	18	11.3300734	19.569927
50	85	M1	10.00	1.961009	18	5.8800734	14.119927
75	85	M1	11.40	1.961009	18	7.2800734	15.519927
25	45	M2	11.00	1.961009	18	6.8800734	15.119927
50	45	M2	13.00	1.961009	18	8.8800734	17.119927
75	45	M2	17.30	1.961009	18	13.1800734	21.419927
25	60	M2	13.00	1.961009	18	8.8800734	17.119927
50	60	M2	16.95	1.961009	18	12.8300734	21.069927
75	60	M2	21.20	1.961009	18	17.0800734	25.319927
25	85	M2	21.50	1.961009	18	17.3800734	25.619927
50	85	M2	24.30	1.961009	18	20.1800734	28.419927
75	85	M2	31.65	1.961009	18	27.5300734	35.769927

Confidence level used: 0.95



j) Todo el análisis efectuado hasta aquí supuso que las mediciones son independientes. ¿Considera que es adecuada esa suposición? Justifique su respuesta y, en caso de estar en desacuerdo con la metodología empleada, indique que cambios introduciría en el procedimiento de análisis (no necesita hacer nada en R).

Para corroborar la suposición de que las mediciones son independientes habría que graficar el orden en que se colectó un dato contra el residuo correspondiente, de esta manera, si al graficar en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical los residuos, se detecta una tendencia o patrón no aleatorio claramente definido, esto es evidencia de que existe una correlación entre los errores y, por lo tanto, el supuesto de independencia no se cumple.

Para el caso puntual, sería razonable dudar que los factores sean independiente del tiempo, por lo que había que utilizar un modelo estadístico que incluya al resto de los factores como función del tiempo.

Ejercicio 3

a) Opción elegida:

- No se puede calcular con la información provista.

Para calcular el número de réplicas por tratamiento sin tener en cuenta los bloques es necesario conocer D , utilizado en el cálculo del parámetro de no centralidad λ de la distribución F, en este caso podríamos ir variando incrementalmente para graficar la potencia, o sea que podríamos salvar este inconveniente, sin embargo, también es necesario contar con el MSE del experimento sin bloques, y en este caso no es posible suponerlo. Por este motivo es que concluimos que no se puede calcular la cantidad de réplicas mínimas para igualar la precisión del experimento original.

b) Opción elegida:

- 5) 0.00205

Como las comparaciones son con contrastes ortogonales recalculamos la probabilidad de error de tipo I individual haciendo $\alpha_{PC} = (1 - \alpha_F)^{1/N_c}$, donde N_c es la cantidad de contrastes. El cálculo nos arroja:

```
In [9]: alphaF = 0.05
        Nc = 25
        (alpha_pc = 1 - (1- alphaF)^(1/Nc))

0.0020496284126208
```

c) Opción elegida:

- 5) Todas las anteriores.

Cuando el tamaño de observaciones es diferente, el estadístico $F = \frac{MS_{TRT}}{MSE}$ no tiene siempre una distribución F exacta como sí lo es en el caso de que el tamaño de muestras sean iguales. Para el caso de diferente n deben modificarse la suma de cuadrados MS y por ende se dificulta el cálculo de la $E(MS)$. Respecto a la potencia, esta se maximiza cuando las muestras tienen el mismo tamaño.

d) Opción elegida:

- 4) Tukey HSD debería usarse cuando los tratamientos tienen efectos fijos.

Tukey es un método para comparar medias de tratamientos y, según el enunciado el único factor que existe es aleatorio, por lo que no sería razonable utilizarlo.

e) Opción elegida

- 1) $L = -3\mu_{11} - 1\mu_{21} + 1\mu_{31} + 3\mu_{41} - 3\mu_{12} - 1\mu_{22} + 1\mu_{32} + 3\mu_{42}$

Los coeficientes para un contraste ortogonal con un polinomio de tendencia lineal con 4 niveles en la variable cuantitativa son (-3, -1, 1, 3), lo que se corresponde para el caso del enunciado donde desea ver la tendencia para dos niveles del factor F2.

f) Opción elegida:

- (0.8,1.0)

Haciendo el cálculo de la potencia obtenemos un valor de 0.967. A continuación el método de cálculo

```
In [10]: D = 19 # diferencia de medias
         b = 3  # 3 niveles del factor B
         a = 2  # 2 niveles del factor A
         r = 10
         n = a*b*r
         sigma2 = 100
         lambda = r*D^2/(2*sigma2)
         alpha = 0.05
         Q = qf(1-alpha, (a-1)*(b-1), n-a*b)
         (potencia = 1-pf(Q, (a-1)*(b-1), n-a*b, lambda))
```

0.967181638979737