

SF1626 Flervariabelanalys

Föreläsning 13

Henrik Shahgholian

Vid Institutionen för matematik, KTH

VT 2018, Period 3

Vektoranalys

Dagens Lektion, Avsnitt 15.1-15.2

- Vektorfält
- Konservativa vektorfält
- Potentialfunktioner

Vektorfält

Vektorvärda funktioner kan också betraktas som vektorfält.

I så fall kan de illustreras med *pilar/vektoer*

Vanliga beteckningar är **F**, **G**, etc.

Tolkning: I varje punkt (x, y, z) sitter en vektor $\mathbf{F}(x, y, z)$

Exempel 1: Skissa de plana vektorfälten



$$\mathbf{F}(x, y) = (x+y, x), \quad \mathbf{G}(x, y) = (-y, 0), \quad \mathbf{H}(x, y) = (x(1-y), y(x-1))$$

Se några exempel:

<http://demonstrations.wolfram.com/MultipoleFields/>

<http://demonstrations.wolfram.com/DielectricSphereInAUniformElectricField/>

<http://demonstrations.wolfram.com/A2DFlowField/>



Fältet $\mathbf{H}(x, y) = (x(1 - y), y(x - 1))$ presenterat med olika bild intensitet.

Vektorfält

Exempel of tillämpningar

- 1 Gravitationsfält
- 2 Elektrostatiska fält
- 3 Magnetfält
- 4 Hastighetsfält
- 5 Gradientfält

Ofta antar vi att de är minst C^1 , där de är definierade.

Formel definition of vektorfält

Ett vektorfält associerar en vektor med varje punkt i rummet. Vektorfält används för att ange en hastighet och riktning för (ex.vis) en flytande vätska i rummet.

Quiz (här):

1) Rita följande vektorfält i planet:

$$\mathbf{F}(x, y) = (x, y), \quad \mathbf{G}(x, y) = (-y, x).$$

2) Rita färdvägen (kurvan) för en kork som släpps i vektorfältet \mathbf{F} , eller \mathbf{G} .

Dessa färdvägar kallas

Fältlinjer/strömlinje/flödeslinje/trajektorier/integralkurva.¹

Fältlinje: är en kurva till vilken vektorfältet är tangentiellt i varje punkt.

¹Ett kärt barn har många namn!

Vektorfält

Fältlinjer/strömlinje/flödeslinje/trajektorja/integralkurva

Hur hittar man Fältlinjer: \mathbb{R}^2

Om $\mathbf{F}(x, y) = (P, Q)$ så ges fältlinjerna av²

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q}.$$

Observera att detta kan skrivas som

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{d}{dt} \rightarrow \mathbf{r}' = (x', y') = (P, Q).$$

²På liknande sätt fås fältlinjerna i 3d (sidan 861-862).

Vektorfält

Fältlinjer och nivåkurvor

Exempel 2 (Jfr uppg. 2, seminarium 5): Låt $f(x, y) = xy$. Bestäm ett vektorfält \mathbf{F} (ej identisk noll) s.a. fältlinjerna till \mathbf{F} är nivåkurvor till f .

Fältlinjer ges av $\mathbf{r}' = \mathbf{F} = (P, Q)$. Det ska vara tangent till nivåkurvor.

Vi har även $\nabla f = (y, x)$ är ortogonal mot nivåkurvor till f , dvs

$$\nabla f \cdot \mathbf{F} = 0 \quad \rightarrow \quad (y, x) \cdot (P, Q) = 0 \quad \rightarrow \quad yP + xQ = 0.$$

Ett enkelt val ger att $P = -x$, $Q = y$.

Vektorfält

Fältlinjer och nivåkurvor

Quiz (hemma): Kan ni bestämma alla vektorfält i Exempel 2, ovan?

Alla sådana vektorfält ges av $P = \frac{-Qx}{y}$, då $y \neq 0$. Vektorfälten ska vara deriverbara därför ska $Q = yH(x, y)$ och vi får

$(-xH(x, y), yH(x, y))$, där $H(x, y)$ är en kontinuerlig funktion.

Vektorfält

Konservativa vektorfält

Om det finns en funktion φ sådan att $\nabla\varphi = \mathbf{F}$ så sägs vektorfältet \mathbf{F} vara **konservativt**. Funktionen φ kallas i så fall för en **potentialfunktion** till \mathbf{F} .

Exempel 2:

Varje gradientfält $\mathbf{F} = \nabla f$ för en given funktion f är konservativt fält.

Exempel 3:

Är det plana fältet $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$ konservativt?

Vektorfält

Vilkor för konservativitet

Plana vektorfält: $\mathbf{F}(x, y) = (P, Q)$.

Om inte $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ så kan vektorfältet inte vara konservativt.

3d-vektorfält: $\mathbf{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$.

Om inte

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

så kan vektorfältet inte vara konservativt.

Vektorfält

Quiz (här): Konservativa vektorfält

Undersök vilka av dessa vektorfält är konserveraktiva

1) $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$.

2) $\mathbf{G}(x, y) = (y, x)$.

3) $\mathbf{H}(x, y) = (\sin x, \sin y, \sin z)$.

4) $\mathbf{K}(x, y) = (yz, xz, xz)$.

Vektorfält

Ekvipotentialkurvor och Ekvipotentialytor

Nivåytor till potentialfunktionen kallas ekvipotentialytor till vektorfältet.

För plana vektorfält är motsvarigheten ekvipotentialkurvor.

Exempel 4: Visa att det plana vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = (x, -y)$$

är konservativt och bestäm dess fältlinjer och ekvipotentialkurvor

Svar: $\varphi(x, y) = x^2/2 - y^2/2 + C$, fältlinjerna är hyperbler med koordinataxlarna som asymptoter, ekvipotentialkurvorna är hyperbler med linjerna $y = \pm x$ som asymptoter.

Vektorfält

Quiz (här):

Avgör om det finns en potentialfunktion för vektorfälten nedan och om ja, bestäm en potentialfunktion:

1 $\mathbf{F} = (y, x)$

2 $\mathbf{G} = (y, x, 1)$

3 $\mathbf{H}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$

Vektorfält

Quiz (hemma):

Vilka av vektorfälten nedan är konservativa. Bestäm en potentialfunktion då fältet är konservativt.

1 $\mathbf{F} = \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$

2 $\mathbf{G} = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2}$

Vektorfält

Se till att du kan dessa:

- a. Hur visar man att ett vektorfält är konservativt?
- b. Hur visar man att ett vektorfält inte är konservativt?
- c. Vad betyder ordet potentialfunktion?
- d. Hur hittar man en potentialfunktion?