

Stukan 7 & 8

Ordkunskap: Se till att du känner till de viktiga formlerna som berör följande begrepp:

räta linjens ekvation (på parameterform)

planets ekvation (på skalärform / standardform)

planets ekvation (på parameterform)

kryssprodukt (synonym: vektorprodukt)

Övning 1. a) Beräkna kryssprodukten $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$.

b) Givet ett plan som beskrivs parametriskt av ekvationen $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Finn en ekvation på skalärform, dvs. på formen $Ax + By + Cz + D = 0$, till detta plan.

c) Säg nu att vi har ett plan vars ekvation på skalärform är $x + y - z = 1$. Hur hittar vi en ekvation på parameterform till detta plan då?

Övning 2. Betrakta triangeln ABC med hörn i punkterna $A = (1, 0, 1)$, $B = (2, -3, 2)$ och $C = (4, 1, 0)$.

a) Utnyttja kryssprodukt för att bestämma triangelns area.

b) Utnyttja skalärprodukt för att bestämma cosinus för vinkeln vid hörnet A .

Övning 3. Bestäm skärningspunkten mellan de två räta linjerna som ges av $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ respektive $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

Övning 4. Givet fyra punkter $A = (6, -3, 0)$, $B = (3, -7, 1)$, $C = (3, 7, -1)$ och $D = (4, 5, -3)$.

a) Bestäm på parameterform en ekvation till den räta linjen \mathcal{L}_1 som går genom A och B .

b) Bestäm på parameterform en ekvation till den räta linjen \mathcal{L}_2 som går genom C och D .

c) Bestäm på skalärform en ekvation till det plan som innehåller \mathcal{L}_2 och som är parallellt med \mathcal{L}_1 .

d) Bestäm slutligen det minsta avståndet mellan linjerna \mathcal{L}_1 och \mathcal{L}_2 .

Övning 5. Beräkna det minsta avståndet från punkten $P = (2, -3, 8)$ till x -axeln.

Facit: Se nästa sida.

Övning 1. a) $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix}$. Ett bra sätt att dubbelkolla om svaret kan stämma är att se till att $\begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix}$ är ortogonal mot både $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ och $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Enkla skalärprodukter ger $\begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = 0$, vilket påvisar ortogonaliteten.

b) Vi behöver en punkt P i planet och en normalvektor \vec{n} till planet. Med hjälp av planets ekvation på parameterform kan vi välja $P = (3, 0, -4)$. Notera också att $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ och $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ är två vektorer parallella med planet, så \vec{n} borde vara vinkelrät mot båda dessa vektorer. Vi kan således ta fram \vec{n} med hjälp av en kryssprodukt:

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix}$$

Planets ekvation på skalärform är således

$$1(x - 3) + 9(y - 0) + 16(z - (-4)) = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 3 + 9y + 16z + 64 = 0$$

$$\Leftrightarrow x + 9y + 16z + 61 = 0, \text{ eller med andra ord } x + 9y + 16z = -61.$$

c) Vi kan börja med att välja tre punkter i planet, säg $P = (1, 1, 1)$, $Q = (2, 0, 1)$ och $R = (1, 0, 0)$. Två vektorer parallella med planet är $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0)$ och $\overrightarrow{PR} = (0, -1, -1)$. Eftersom \overrightarrow{PQ} och \overrightarrow{PR} inte är varandras multipler är de inte parallella med varandra. En ekvation på parameterform till planet är då

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Anmärkning: 1. Vi kan naturligtvis också svara med till exempel

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. Ett sätt att kontrollera svaret är att prova gå från parameterformen tillbaka till skalärformen med samma strategi som används på delfrågan b). En normalvektor till planet är

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Då $P = (1, 1, 1)$ ligger i planet är planets ekvation på skalärform

$$1(x - 1) + 1(y - 1) + (-1)(z - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 1 + y - 1 - z + 1 = 0, \text{ eller med andra ord } x + y - z = 1. \text{ Det stämmer!}$$

Övning 2. a) Det är bra att du ritar en idéskiss först. Notera att $\overrightarrow{AB} = (1, -3, 1)$ och $\overrightarrow{AC} = (3, 1, -1)$. Enligt ett känt samband kan vi räkna ut arean av den parallelogram som spänns upp av \overrightarrow{AB} och \overrightarrow{AC} enligt

$$\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix} \right\| = 2 \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \right\| = 2\sqrt{1^2 + 2^2 + 5^2} = 2\sqrt{30}$$

Triangeln ABC har således arean

$$\frac{2\sqrt{30}}{2} = \sqrt{30}$$

b) Låt den avsedda vinkeln heta θ (eller Theodor). Enligt ett känt samband får vi

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{(1, -3, 1) \cdot (3, 1, -1)}{\|(1, -3, 1)\| \|(3, 1, -1)\|} = \frac{-1}{\sqrt{11}\sqrt{11}} = -\frac{1}{11}$$

Övning 3. Ekvationerna innebär att varje punkt på den ena linjen har koordinater

$$(x, y, z) = (1 + 2t, 3t, t)$$

och att varje punkt på den andra linjen har koordinater

$$(x, y, z) = (5s, 5 + s, 5 - 3s)$$

Linjerna bör skära varandra där

$$(1 + 2t, 3t, t) = (5s, 5 + s, 5 - 3s)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 2t = 5s \\ 3t = 5 + s \\ t = 5 - 3s \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t - 5s = -1 \\ 3t - s = 5 \\ t + 3s = 5 \end{cases}$$

Detta ekvationssystem kan lösas med hjälp av gymnasiematematik eller gausseliminering i samband med matriser. Gör vi rätt finner vi att $t = 2$ och $s = 1$.

Skärningspunkten är således $(x, y, z) = (1 + 2t, 3t, t) = (1 + 2 \cdot 2, 3 \cdot 2, 2) = (5, 6, 2)$. Vi kan förstås också räkna ut denna punkt med $(x, y, z) = (5s, 5 + s, 5 - 3s) = (5 \cdot 1, 5 + 1, 5 - 3 \cdot 1) = (5, 6, 2)$.

Övning 4. a) Detta är en standarduppgift. Vi kan svara med

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + t \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) Ett möjligt svar är

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix} + s \overrightarrow{CD} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

c) Detta plan borde vara parallellt med både \overrightarrow{AB} och \overrightarrow{CD} . En normalvektor till planet är

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CD} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

För enkelhets skull kan vi dock välja $\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 10 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Då planet innehåller \mathcal{L}_2 , innehåller det också punkten $C = (3, 7, -1)$. Planets ekvation på skalärform är

$$2(x - 3) + (-1)(y - 7) + 2(z - (-1)) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - 6 - y + 7 + 2z + 2 = 0, \text{ dvs. } 2x - y + 2z + 3 = 0.$$

d) Detta är som att bestämma det minsta avståndet mellan linjen \mathcal{L}_1 och planet, ty planet är parallellt med \mathcal{L}_1 och innehåller \mathcal{L}_2 . Eftersom A ligger på \mathcal{L}_1 är problemet ekvivalent med att bestämma det minsta avståndet mellan punkten $A = (6, -3, 0)$ och planet $2x - y + 2z + 3 = 0$.

Avståndsformeln (för det minsta avståndet mellan en punkt och ett plan) ger

$$\left| \frac{2 \cdot 6 - 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 0 + 3}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} \right| = \left| \frac{18}{\sqrt{9}} \right| = 6$$

Alternativt kan vi beräkna avståndet mellan punkten $B = (3, -7, 1)$ och planet. Samma svar erhålls:

$$\left| \frac{2 \cdot 3 - 1 \cdot (-7) + 2 \cdot 1 + 3}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} \right| = \left| \frac{18}{\sqrt{9}} \right| = 6$$

Övning 5. Detta är som att beräkna det minsta avståndet mellan punkten $P = (2, -3, 8)$ och den rätta linjen som ges av

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tag en punkt på linjen, säg $Q = (0, 0, 0)$. Bilda vektorn $\overrightarrow{QP} = (2, -3, 8)$. En vektor parallell med linjen är $\vec{u} = (1, 0, 0)$. Det sökta avståndet är enligt en känd strategi precis

$$\|\overrightarrow{QP} - \text{proj}_{\vec{u}} \overrightarrow{QP}\| = \dots = \left\| \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{0^2 + (-3)^2 + 8^2} = \sqrt{73}$$