Aufgabensammlung Algebra und Zahlentheorie

Emma Bach

Wintersemester 25/26

- Gruppen -

Übung 0.2. Man gebe ein unverkürzbares Erzeugendensystem der Gruppe $\mathbb{Z}^2$ an, welches aus drei Elementen besteht.

Übung 1.2. Wie viele Untergruppen hat die additive Gruppe eines dreidimensionalen Vektorraums über dem Körper mit drei Elementen?

Lösung.

1. Das neutrale Element erzeugt die triviale Untergruppe.
2. Jedes der 26 anderen Elemente erzeugt eine Untergruppe, welche zu $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ isomorph ist. Dabei erzeugen v und $-v$ die selbe Untergruppe, es gibt also 13 "Klassen" von linear unabhängigen Vektoren.
3. Jedes Paar von linear unabhängigen Vektoren erzeugt ein Untergruppe, welche zu $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ isomorph ist. Da ein solches Paar dadurch definiert werden kann, welche linear unabhängige Klasse nicht enthalten ist, gibt es hiervon ebenfalls 13.
4. Zuletzt ist $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ selbst eine Untergruppe.

Insgesamt gibt es also 28 Untergruppen. □

Übung 1.2.B. Wie viele Untergruppen hat allgemein $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^n$?

Übung 1.3. Man bestimme alle Untergruppen von $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

Lösung. Die Untergruppen sind $d\mathbb{Z}/20\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/\frac{20}{d}\mathbb{Z})$, für jeden Teiler d von 20. □

Übung 1.4. Sind $H, K \subset G$ zwei Untergruppen einer endlichen Gruppe G mit $|H|$ teilerfremd zu $|K|$ und $|H| \cdot |K| = |G|$, so induziert die Verknüpfung eine Bijektion $H \times K \to G$.

Lösung. Betrachte die Multiplikationsabbildung $m : H \times K \to G$, $(h, k) \mapsto hk$. Wir wollen zeigen, dass diese injektiv ist, dann folgt aus $|H \times K| = |H| \cdot |K| = |G|$ gemäß Schubfachprinzip auch Bijektivität.

Sei also $h_1 k_1 = h_2 k_2$. Durch Multiplikation mit h_2^{-1} von Links und mit k_1^{-1} von Rechts folgt

$$\begin{aligned} h_2^{-1} h_1 &= h_2^{-1} h_1 k_1 k_1^{-1} \\ &= h_2^{-1} h_2 k_2 k_1^{-1} \\ &= k_2 k_1^{-1}, \end{aligned}$$

also insbesondere

$$h_2^{-1} h_1 = k_2 k_1^{-1} \in H \cap K$$

$H \cap K$ ist sowohl von H als auch von K eine Untergruppe. Da $|H|$ und $|K|$ teilerfremd sind, muss $H \cap K$ also die triviale Gruppe sein, also gilt insbesondere $h_2^{-1} h_1 = k_2 k_1^{-1} = 1$, woraus $h_1 = h_2$ und $k_1 = k_2$ folgt. Somit ist die Abbildung injektiv, also bijektiv. $\square$

Übung 2.1.a). Gegeben zwei Elemente x, y endlicher Ordnung einer abelschen Gruppe G teilt die Ordung von xy das kleinste gemeinsame Vielfache der Ordnungen von x, y.

Lösung. Es gilt $g^k = e$ gdw. ord $(g) \mid k$. Sei also $n = \text{kgV}(\text{ord } x, \text{ord } y)$. Dann folgt direkt $x^n = e = y^n$. Da G abelsch ist, folgt

$$(xy)^n = x^n y^n = e,$$

also ord $(xy) \mid \text{kgV}(\text{ord } x, \text{ord } y)$. $\square$

Übung 2.1.b). Sind die Ordnungen von x und y Teilerfremd, so gilt sogar

$$\text{ord } (xy) = (\text{ord } x) \cdot (\text{ord } y)$$

Lösung. Da $\mathrm{ggT}(\mathrm{ord}\ x, \mathrm{ord}\ y) = 1$ folgt

$$\mathrm{ord}\ x \cdot \mathrm{ord}\ y = \mathrm{kgV}(\mathrm{ord}\ x, \mathrm{ord}\ y).$$

Wir wissen bereits $\mathrm{ord}\ (xy) \mid \mathrm{kgV}(\mathrm{ord}\ x, \mathrm{ord}\ y)$, also folgt $\mathrm{ord}\ (xy) = \mathrm{kgV}(\mathrm{ord}\ x, \mathrm{ord}\ y)$ bereits, falls wir

$$\mathrm{kgV}(\mathrm{ord}\ x, \mathrm{ord}\ y) = \mathrm{ord}\ x \cdot \mathrm{ord}\ y \mid \mathrm{ord}\ (xy)$$

zeigen können.

Es gilt per per Definition

$$(xy)^{\mathrm{ord}\ xy} = e,$$

also folgt aus der Kommutativität der Gruppenoperation wieder

$$x^{\mathrm{ord}\ xy} y^{\mathrm{ord}\ xy} = e,$$

also insbesondere

$$x^{\mathrm{ord}\ xy} = y^{-\mathrm{ord}\ xy}$$

Es gilt also $x^{\mathrm{ord}\ xy} \in \langle y \rangle$ und $y^{-\mathrm{ord}\ xy} \in \langle x \rangle$, also wie in 1.4 insbesondere

$$x^{\mathrm{ord}\ xy} \in \langle y \rangle \cap \langle x \rangle .$$

Da die Ordnungen von x und y teilerfremd sind folgt wieder durch Lagrange $\langle y \rangle \cap \langle x \rangle = \langle e \rangle$. Also gilt $x^{\mathrm{ord}\ xy} = e$ und $y^{\mathrm{ord}\ xy} = (y^{-\mathrm{ord}\ xy})^{-1} = e^{-1} = e$, also sind $\mathrm{ord}\ x$ und $\mathrm{ord}\ y$ beides Teiler von $\mathrm{ord}\ xy$, also folgt aus der Teilerfremdheit der beiden Ordnungen

$$\mathrm{kgV}(\mathrm{ord}\ x, \mathrm{ord}\ y) = \mathrm{ord}\ x \cdot \mathrm{ord}\ y \mid \mathrm{ord}\ (xy),$$

was zu zeigen war. □

Übung 2.3. Wie viele Gruppenhomomorphismen gibt es von $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ zur symmetrischen Gruppe $\mathcal{S}_4$?

Lösung. Gemäß universeller Eigenschaft des Quotienten gilt

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \mathcal{S}_4) = \{f \in \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, \mathcal{S}_4) \mid f(8\mathbb{Z}) = \mathrm{id}\}$$

Gemäß Vorlesung gilt $\mathrm{Grp}(\mathbb{Z}, G) \cong G$, also

$$\{f \in \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, \mathcal{S}_4) \mid f(8\mathbb{Z}) = \mathrm{id}\} = \left\{\sigma \in \mathcal{S}_4 \mid \sigma^8 = \mathrm{id}\right\}$$

Wir suchen also alle Elemente von $\mathcal{S}_4$, deren Ordnung 8 teilt. Die Elemente von $\mathcal{S}_4$ sind:

1. Die Identität (Ordnung 1),
2. Sechs Transpositionen (Ordnung 2),
3. Drei Doppeltransmutationen (Ordnung 2),
4. Acht 3-Zyklen (Ordnung 3),
5. Sechs 4-Zyklen (Ordnung 4).

Es kommen also alle Elemente bis auf die 3-Zyklen in Frage, insgesamt gibt es also $24 - 8 = 16$ Gruppenhomomorphismen. □

Übung 2.4. Gegeben einen surjektiven Gruppenhomomorphismus $\varphi : G \twoheadrightarrow \overline{G}$ und einen Normalteiler $\overline{N} \subset \overline{G}$ mit Urbild $\varphi^{-1}(\overline{N}) := N \subset G$ induziert φ einen Gruppenisomorphismus

$$\varphi_q : G/N \xrightarrow{\sim} \overline{G}/\overline{N}$$

Lösung. Sei $q : \overline{G} \to \overline{G}/\overline{N}$ die kanonische Quotientenabbildung. Wir betrachten die Verktettung $\varphi_q := q \circ \varphi$. Da q und φ beide surjektiv sind, ist φ_q ebenfalls surjektiv. Der Kern-Bild-Isomorphiesatz gibt uns nun

$$\varphi_q : G/\ker \varphi_q \xrightarrow{\sim} \text{im } \varphi_q = \overline{G}/\overline{N}$$

Und für den Kern gilt:

$$\begin{aligned} \ker(\varphi_q) &= (q \cdot \varphi)^{-1}([e_{\overline{G}}]) \\ &= \varphi^{-1} q^{-1}([e_{\overline{G}}]) \\ &= \varphi^{-1}(\overline{N}) \\ &= N. \end{aligned}$$

Also haben wir wie gewünscht

$$\varphi_q : G/N \text{im } \varphi_q = \overline{G}/\overline{N}.$$

□

Übung 3.2.a. Jede Untergruppe einer zyklischen Gruppe ist zyklisch.

Lösung. Sei $(G, +)$ eine zyklische Gruppe mit Erzeuger $a \in G$. Sei H eine Untergruppe von G. Wäre H nicht zyklisch, so gäbe es Elemente $h, h' \in H$, sodass kein Element von H sie beide erzeugt.

Da G selbst zyklisch ist, existieren $n, n' \in \mathbb{Z}$, sodass $h = n \cdot a$ und $h' = n' = a$. Durch den Euklidischen Algorithmus finden wir $r, s \in \mathbb{Z}$, sodass

$$\mathrm{kgV}(n, n') = rn + sn'$$

Nun gilt allerdings:

$$\begin{aligned} \mathrm{kgV}(n, n') \cdot a &= (rn + sn') \cdot a \\ &= rna + sn'a \\ &= rh + sh' \in H, \end{aligned}$$

und da $\mathrm{kgV}(n, n')$ sowohl n als auch n' teilt, erzeugt $\mathrm{kgV}(n, n') \cdot a \in H$ sowohl h als auch h'. □

Übung 3.2.b. Für beliebiges $m \in \mathbb{N}$ hat jede Untergruppe von $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ die Form $d\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ für einen Teiler d von m, und jeder Teiler liefert eine solche Untergruppe.

Lösung. Wir haben soeben gezeigt, dass jede Untergruppe von $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ zyklisch ist. Da nach Lagrange die Ordnung jeder Untergruppe die Ordnung der Gruppe teilt, muss sie also auch von einem Element der entsprechenden Ordnung erzeugt werden.

Jedes Element $k \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ hat Ordnung

$$\mathrm{ord}\ k = \frac{m}{\mathrm{ggT}(k, m)}$$

Sei also H eine Untergruppe von $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ der Ordnung $\frac{m}{d}$. Gemäß der eben genannten Gleichung muss jeder Erzeuger k von H d als Teiler haben. Somit muss jedes solches k in der von d erzeugten Untergruppe $d\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ liegen, welche ebenfalls Ordnung $\frac{m}{d}$ hat. Somit erzeugt jedes solches k die selbe Untergruppe. Gleichzeitig gibt es für jedes d nur eine solche Untergruppe, also stehen die gefragten Mengen in Bijektion. □

Übung 3.3.

1. Wie viele Erzeuger hat die multiplikative Gruppe eines Körpers mit elf Elementen?

2. Man gebe einen solchen Erzeuger an.
3. Wie viele Elemente des Körpers mit elf Elementen sind Quadrate?
4. Wie viele Elemente des Körpers mit elf Elementen sind dritte Potenzen?

Lösung. Durch Ausprobieren trivial :) □

Übung 4.1. Seien $H \supset N$ eine Gruppe mit einem Normalteiler und X eine Menge mit H-Operation. Man zeige, dass es auf dem Bahnenraum X/N genau eine Operation der Quotientengruppe H/N gibt, sodass

$$(hN)(Nx) = Nhx$$

Lösung.

1. Wir wollen zuerst zeigen, dass aus $Nx = Ny$ für jedes $h \in H$ auch $Nhx = Nhy$ folgt.

   Da $Nx = Ny$ existiert ein $n \in N$, sodass $x = ny$. Es folgt $hx = hny$. Da N ein Normalteiler ist, gilt desweiteren

   $$n' := hnh^{-1} \in N.$$

   Für dieses n' folgt $hn = n'h$, also $hx = n'hy$. Da $n' \in N$ folgt also

   $$Nhx = Nhy$$

2. Als nächstes wollen wir aus dieser Vorüberlegung die Wohldefiniertheit der definierten Operation folgern, also zeigen, dass zusätzlich für $g, h \in H$ aus $gN = hN$ auch $(gN)(Nx) = (hN)(Nx)$ folgt.

   Da N ein Normalteiler ist, gilt auch $gN = Nh$, also gibt es ein $n \in N$, sodass $g = nh$, also $gx = nhx$, also $Ngx = Nhx$. Somit gilt

   $$(gN)(Nx) = Ngx = Nhx = (hN)(Nx).$$

3. Zuletzt wollen wir zeigen, dass diese Verknüpfung tatsächlich eine Gruppenoperation definiert. Zu zeigen ist also:

   (a) $(1N)(Nx) = Nx$. Dies gilt trivial, da $(1N)(Nx) = N1x = Nx$.

   (b) Sei $g, h \in G$. Dann wollen wir

   $$((gN)(hN))(Nx) = (gN)((hN)(Nx))$$

Dies folgt ebenfalls recht schnell:

$$\begin{aligned}((gN)(hN))(Nx) &= (ghN)(Nx) \\ &= N(gh)x \\ &= N(g)(hx) \\ &= (gN)(Nhx) \\ &= (gN)((hN)(Nx)\end{aligned}$$

□

Übung 4.3. Man gebe ein Repräsentantensystem an für die Konjugationsklassen der Gruppe aller Isometrien der euklidischen Ebene.

Übung 4.4. Man bestimme alle Kompositionsreihen der Gruppe der Drehsymmetrien eines Würfels.

Übung 5.1. Sei G eine endliche Gruppe mit einem Normalteiler N und p prim. Dann ist eine Untergruppe $P \subset G$ genau dann eine p-Sylow von G, wenn $P \cap N$ eine p-Sylow von N ist und das Bild von P in G/N eine p-Sylow von G/N.

Lösung.

1. Sei P eine p-Sylow von G.

   (a) Da P eine p-Sylow ist, gilt $p \nmid \frac{|G|}{|P|}$. Da NP eine Untergruppe von G ist, gilt $\frac{|NP|}{|P|} \mid \frac{|G|}{|P|}$, also insbesondere $p \nmid \frac{|NP|}{|P|}$.

   Wenden wir den Isomorphiesatz auf $f : P \to NP/N$, $p \mapsto Np$ an, erhalten wir

   $$P/(P \cap N) = P/(\ker f) \cong \mathrm{im} f = NP/N$$

   somit gilt

   $$p \nmid \frac{|NP|}{|P|} = \frac{|N|}{|N \cap P|}$$

   Da $N \cap P$ eine p-Gruppe in N ist, folgt daraus auch, dass $N \cap P$ eine p-Sylow von N ist.

   (b) (...)

2. Sei $N \cap P$ eine p-Sylow von N und $q(P) = P/N$ eine p-Sylow von G/N. Dann ist P "offensichtlich" eine p-Gruppe in G. Es bleibt noch zu zeigen,

dass $p \nmid \frac{|G|}{|P|} = [G : P]$. Durch den Isomorphiesatz folgt weiterhin

$$\frac{|NP|}{|P|} = \frac{|N|}{|N \cap P|}$$

Desweiteren gilt

$$[G : NP] = [G/N : P/N]$$

Es gilt nun

$$\begin{aligned}[G : P] &= [G : NP][NP : P] \\ &= [G/N : P/N][N : N \cap P]\end{aligned}$$

Da P/N eine p-Sylow von G/N und $N \cap P$ eine p-Sylow von N ist, teilt p keinen dieser beiden Terme, also auch nicht $[G : P]$, was zu zeigen war.

□

Übung 5.2. Für jede Primzahl p sind die einzigen Gruppen der Ordnung $2p$ bis auf Isomorphismus die zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}$ und die Diedergruppe D_p.

Lösung. Sei G eine Gruppe der Ordnung $2p$. Gemäß viertem Sylowsatz ist die Zahl n_2 der 2-Sylows von G ein Teiler von $\frac{|\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}|}{2} = p$, also entweder 1 oder p. Das zweite Kriterium aus dem vierten Sylowsatz besagt $n_2 \cong 1 \mod 2$, was keinen der beiden Fälle ausschließt.

Desweiteren ist die Anzahl n_p der p-Sylows von G ein Teiler von $\frac{|\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}|}{2} = 2$, also entweder 1 oder 2. In diesem Fall besagt das zweite Kriterium $n_p \cong 1 \mod p$, was den Fall $n_p = 2$ ausschließt.

Der Fall $p = 2$ ist bereits bekannt, sei also $p > 2$ angenommen.

1. Angenommen, $n_2 = p$. Jede dieser Gruppen hat per Definition 2 Elemente, ist also isomorph zur zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Somit hat G p Elemente der Ordnung 2. Sei a ein solches Element. Gemäß Satz von Cauchy existiert desweiteren ein Element b der Ordnung p.

   Gemäß Satz von Lagrange gilt ord $ab \in \{1, 2, p, 2p\}$.

   (a) Im Fall (ord ab) $= 2p$ wäre G zyklisch, was der Annahme wiedersprechen würde, dass G p 2-Sylows hat.

   (b) Im Fall (ord ab) $= 1$ hätten wir $p = 2$, (?) was wir ausgeschlossen

hatten.

(c) Im Fall $(\text{ord } ab) = p$ wäre $\langle ab \rangle$ eine zweite p-Sylow, was wir ausgeschlossen hatten.

Somit gilt $(\text{ord } ab) = 2$. Wir erhalten die Präsentation

$$G = \langle a, b \mid \text{ord } b = p, \text{ord } a = \text{ord } ab = 2 \rangle ,$$

welche eindeutig die Diedergruppe D_p definiert.

2. Angenommen, $n_2 = 1$. Da G auch nur eine p-Sylow hat, sind beide Sylowuntergruppen normal. Es folgt, dass der Schnitt der beiden Gruppen die triviale Gruppe ist, also ist G das direkte Produkt der beiden, also $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Gemäß Chinesischem Restsatz ist nun $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ isomorph zu $\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}$, also G zyklisch.

□

Übung 5.3. Sei $p > q$ und q kein Teiler von $p - 1$. So ist jede Gruppe der Ordnung pq zyklisch.

Lösung. Sei G eine Gruppe der Ordnung pq. Gemäß Lagrange hat jedes Element von G die Ordnung $1, p, q$, oder pq. Insbesondere erzeugen die Elemente der Ordnung p und q die jeweiligen Sylowgruppen.

Gemäß der Sylowsätze ist die Anzahl n_p der p-Sylows von G ein Teiler von q, also $n_p = 1$ oder $n_p = q$. Gleichzeitig muss $n_p \cong 1 \mod \frac{|G|}{q} = p$, also $p \mid n_p - 1$. Da $p > q$ und beide Zahlen prim sind, ist dies im Fall $n_p > 1$ unmöglich, also folgt $n_p = 1$. Diese p-Sylow enthält p Elemente, von denen $p - 1$ Erzeuger sind. Somit gibt es $p - 1$ Elemente der Ordnung p.

Analog ist die Anzahl n_q der q-Sylows von G ein Teiler von p, der Kongruent zu 1 modulo q ist. Wäre $n_q = p$, hätten wir $p \cong 1 \mod q$, also $q \mid p - 1$, was wir ausgeschlossen hatten. Also existiert auch genau eine q-Sylow, also existieren $q - 1$ Elemente der Ordnung q.

Zusammen mit dem Neutralen Element erhalten wir $p + q - 1$ Elemente der Ordnung ungleich pq. Für Primzahlen $p > q$ gilt $p + q - 1 < pq$, also ist mindestens ein Element übrig, welches demenstprechend Ordnung pq hat und somit die Gruppe G erzeugt. Somit ist G zyklisch. □

- Ringe -

Übung 5.4. In jedem Ring R gilt für alle $a, b \in R$:

1. $0 \cdot a = 0$
2. $-a = (-1) \cdot a$
3. $(-1) \cdot (-1) = 1$
4. $(-a) \cdot (-b) = ab$

Lösung. 1.

$$\begin{aligned} 0 &= 0a + (-0a) \\ &= (0+0)a + (-0a) \\ &= 0a + 0a + (-0a) \\ &= 0a \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} a + (-1) \cdot a &= 1 \cdot a + (-1) \cdot a \\ &= (1 + (-1)) \cdot a \\ &= 0a \\ &= 0 \end{aligned}$$

Analog gilt auch $(-1) \cdot a = -a$.

3. $(-1) \cdot (-1) = -(-1) = 1$

4.

$$\begin{aligned} (-a) \cdot (-b) &= a \cdot (-1) \cdot (-b) \\ &= a \cdot (-(-b)) \\ &= a \cdot b \end{aligned}$$

□

Übung 6.8.

1. Jeder Ringhomomorphismus bildet Einheiten auf Einheiten ab.
2. Jeder Ringhomomorphismus $K \to R$ von einem Körper K in einen Ring R mit $0_R \neq 1_R$ ist injektiv.

Lösung. Sei $\varphi : R \to S$ ein Ringhomomorphismus.

1. Sei x eine Einheit. Dann gilt

$$\begin{aligned} 1_S &= \varphi(1_R) \\ &= \varphi(x \cdot x^{-1}) \\ &= \varphi(x) \cdot \varphi(x^{-1}) \end{aligned}$$

   und analog $1_S = \varphi(x^{-1}) \cdot \varphi(x)$. Somit ist $\varphi(x)$ ebenfalls eine Einheit, mit $\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})$.

2. Sei nun K ein Körper und $\varphi : K \to R$ ein Ringhomomorphismus. Dann ist jedes $x \in K \setminus \{0_K\}$ invertierbar, also gemäß der letzten Teilaufgabe ebenso jedes $\varphi(x) \in \operatorname{im} \varphi \setminus \{0_R\}$.

   Angenommen, φ wäre nicht injektiv. Dann gäbe es $x, y \in K$ mit $x - y \neq 0_K$, aber $\varphi(x) - \varphi(y) = 0_R$. Da $x - y \neq 0_K$, ist $(x - y)$ invertierbar. Es folgt:

$$\begin{aligned} \varphi(x) - \varphi(y) &= 0_R \\ \implies \varphi(x - y) &= 0_R \\ \implies \varphi(x - y)\varphi(x - y)^{-1} &= 0_R \\ \implies 1_R &= 0_R \end{aligned}$$

   Ist nun $1_R \neq 0_R$ gegeben, ist dies ein Widerspruch, also φ injektiv.

□

Übung 7.9. $\mathbb{Z}[X]$ ist kein Hauptidealring.

Lösung. Wäre $\mathbb{Z}[X]$ ein Hauptidealring, so könnte $\langle 2, X \rangle$ von einem einzigen Element a erzeugt werden. Dieses müsste ein gemeinsamer Teiler von 2 und X sein, also $a = \pm 1$. Es müsste also $\langle \pm 1 \rangle = \langle 2, X \rangle$. Allerdings gilt $1 \notin \langle 2, X \rangle$. □

Übung 7.10. Im Quotientenring eines faktoriellen Rings R nach einem Hauptideal zu einem Element $a \neq 0$ ist das Bild von $b \in \mathbb{R}$ genau dann kürzbar, wenn a und b teilerfremd sind.

Lösung. 1. Seien $a, b \in R$ gegeben, sodass $\overline{b} \in R/\langle a \rangle$ kürzbar ist. Wären a und b nicht teilerfremd, gäbe es ein irreduzibles $p \in R$ mit $p \mid a$ und $p \mid b$. Es gibt also ein $d \in R$, sodass $pd = a$. Es gilt außerdem $d \notin \langle a \rangle$, sonst wäre p eine Einheit, also nicht irreduzibel. Nun ist gleichzeitig b ein Vielfaches von p, also bd ein Vielfaches von $pd = a$, also

$$\overline{b \cdot d} = \overline{0} = \overline{b \cdot 0}$$

Mit $d \neq 0$. Also wäre $\overline{b}$ nicht kürzbar. Dies ist ein Widerspruch, also müssen a und b doch teilerfremd sein.

2. Seien a und b teilerfremd. Da R faktoriell ist finden wir eine bis auf Reihenfolge eindeutige Primfaktorzerlegung, und da a und b teilerfremd sind haben sie keinen Primfaktor gemeinsam. Gilt nun $\overline{b \cdot c} = \overline{b \cdot d} \in R/\langle a \rangle$, so folgt $\overline{b(c-d)} = \overline{0}$, also ist $b(c-d)$ ein Vielfaches von a und muss dementsprechend alle Primfaktoren von a in seiner Primfaktorisierung enthalten. Da a und b teilerfremd sind, müssen alle dieser Faktoren in $c - d$ enthalten sein. Somit gilt aber $\overline{c - d} = \overline{0}$, was zu zeigen war.

□

Übung 8.15. Ist R ein faktorieller Ring mit Bruchkörper K und sind $P, Q \in K[X]$ normierte Polynome mit $PQ \in R[X]$, so folgt bereits $P, Q \in R[X]$

Lösung. Sei p ein beliebiges irreduzibles Element von R. Per Definition ist p keine Einheit, also $p^{-1} \notin R$. Es folgt $\forall r \in R : v_p(r) \geq 0$. Insbesondere folgt für $PQ \in R[X]$ $w_p(PQ) \geq 0$.

Gemäß Lemma von Gauss gilt nun

$$0 \leq w_p(PQ) = w_p(P) + w_p(Q) \leq 0$$

Da P und Q desweiteren normiert sind, gilt $0 \geq w_p(P), w_p(Q)$, also $w_p(P) = w_p(Q) = 0$, also $P, Q \in R[X]$. □

Übung 8.16. Sei p prim und $r \geq 1$. So erfüllt das p^r-te Kreisteilungspolynom die Identität

$$\Phi_{p^r}(X) = \Phi_p\left(X^{p^{r-1}}\right)$$

Lösung. Per Definition der Kreisteilungspolynome gilt:

$$\begin{aligned} X^n - 1 &= \prod_{\zeta^n = 1} (X - \zeta) \\ &= \prod_{(\text{ord } \zeta) | n} (X - \zeta) \\ &= \prod_{d | n} \Phi_d(X) \end{aligned}$$

Also insbesondere:

$$\begin{aligned} X^{p^r} - 1 &= \prod_{d | p^r} \Phi_d(X) \\ &= \Phi_{p^r}(X) \cdot \prod_{d | p^{r-1}} \Phi_d(X) \\ &= \Phi_{p^r}(X) \cdot (X^{p^{r-1}} - 1). \end{aligned}$$

Wir stellen dies nach $\Phi_{p^r}(X)$ um und erhalten:

$$\Phi_{p^r}(X) = \frac{X^{p^r} - 1}{X^{p^{r-1}} - 1}$$

Gleichzeitig gilt für p prim:

$$\begin{aligned} X^p - 1 &= \prod_{d | n} \Phi_d(X) \\ &= \Phi_1(X) \cdot \Phi_p(X) \\ &= (X - 1) \cdot \Phi_p(X), \end{aligned}$$

also:

$$\Phi_p(X) = \frac{X^p - 1}{X - 1}$$

Es folgt also:

$$\begin{aligned} \Phi_p(X^{p^{r-1}}) &= \frac{(X^{p^{r-1}})^p - 1}{X^{p^{r-1}} - 1} \\ &= \frac{X^{p^r} - 1}{X^{p^{r-1}} - 1} \\ &= \Phi_{p^r}(X) \end{aligned}$$

□

- Körper -

Übung 6.7. Man konstruiere einen Körper mit $169 = 13^2$ Elementen.

> *Lösung.* Gemäß der folgenden Aufgabe ist $\mathbb{F}_{13}/\left\langle X^2 - 7\right\rangle$ ein solcher Körper. □

Übung 6.7.B. Sei K ein endlicher Körper mit q Elementen und P vom Grad n über K irreduzibel. Dann ist $K/\langle P\rangle$ ein Körper mit q^n Elementen.

Übung 7.11. Sei k ein Körper.

1. Alle Polynome vom Grad 1 sind irreduzibel in $k[X]$.
2. Ist $P \in k[X]$ irreduzibel und vom Grad $\deg P > 1$, so hat P keine Nullstelle in k.
3. Ist $P \in k[X] \setminus k$ vom Grad $\deg P \leq 3$ und hat P keine Nullstelle in k, so ist P irreduzibel in $k[X]$.
4. Ist k algebraisch abgeschlossen, so sind die irreduziblen Polynome in $k[X]$ genau die Polynome vom Grad 1.
5. Man gebe ein Polynom positiven Grades in $\mathbb{R}[X]$ an, das keine Nullstelle hat, aber dennoch nicht irreduzibel ist.

Übung 8.13. Die Definition der Summation in Bruchkörpern über Integritätsringen ist wohldefiniert.

Übung 9.20. Sei $K \subset L$ ein Körper der Charakteristik ungleich zwei. Sei $\alpha, \beta \in L^\times$ mit $\alpha^2, \beta^2 \in K$: Dann gilt $K(\alpha) = K(\beta)$ genau dann, wenn $\alpha/\beta \in K$.

> *Lösung.* 1. Sei $K(\alpha) = K(\beta)$. Dann existieren $x, y \in K$, sodass
>
> $$\alpha = x + \beta y$$
>
> Im Fall $x = 0$ folgt aus $\beta \in L^\times$ direkt $\frac{\alpha}{\beta} = y \in K$.
>
> Im Fall $y = 0$ gilt $\alpha = x \in K$, und da symmetrisch auch $z, w \in K$ existieren, sodass $\beta = z + \alpha w \in K$, giltv auch $\frac{\alpha}{\beta} \in K$.
>
> Im Fall $x, y \neq 0$ folgt:
>
> $$\alpha^2 = x^2 + 2\beta xy + \beta^2 y^2 \implies \beta = \frac{\alpha^2 - x^2 - \beta^2 y^2}{2xy} \in K$$

Analog gilt $\alpha \in K$, also auch $\frac{\alpha}{\beta} \in K$.

2. Sei $\frac{\alpha}{\beta} \in K$. Dann gilt $\alpha = k\beta$, also $K(\alpha) = K(\beta)$.

□

Übung 10.23. Seien $R \supset K$ ein kommutativer Ring mit einem Teilring, der sogar ein Körper ist. Sei R endlichdimensional als K-Vektorraum und ein Integritätsring. Dann ist R auch selbst bereits ein Körper.

Musterlösung. Zu zeigen ist nur, dass für jedes $\alpha \in R \setminus \{0\}$ ein Inverses existiert. Wir betrachten $K[\alpha] = \langle K, \alpha \rangle$. $K[\alpha]$ ist offensichtlich (?) das Bild der Einsetzungsabbildung $\varphi_\alpha : K[X] \to R$. Somit gilt gemäß Isomorphiesatz

$$K[X]/(\ker \varphi_\alpha) \cong K[\alpha]$$

Da R endlichdimensional über K ist, ist der Kern von φ_α nichttrivial. Da $K[X]$ ein Körper ist ist es insbesondere ein Hauptidealring, also gilt $\ker \varphi_\alpha = \langle P \rangle$ für ein $P \in K[X]$. Da R zusätzlich ein Integritätsring ist, muss dieses P irreduzibel sein. Aber dann ist $K[X]/(\ker \varphi_\alpha) \cong K[\alpha]$ ein Körper, also existiert in $K[\alpha] \subset R$ ein Inverses von α. □

Alternative Lösung. Betrachte die Lineare Abbildung $Ax : R \to R; r \mapsto rx$. Da R ein Integritätsring ist, existiert kein $r \in R \setminus \{0\}$, sodass $rx = 0$, also ist A_x injektiv. Da R als K-Vektorraum endlichdimensional ist, gilt außerdem die Dimensionsformel. Aus $\dim(\ker A_x) = 0$ folgt also $\dim(\mathrm{im}(A_x)) = \dim R$, also ist die Abbildung surjektiv. Somit existiert für jedes x ein y, sodass $xy = 1$, also $y = x^{-1}$. Somit ist R ein Körper. □

Übung 11.25. Man zeige, dass es im Polynomring über einem endlichen Körper irreduzible Polynome von jedem positiven Grad gibt.

Lösung. Jeder endliche Körper ist von der Form $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^r$. Sei ein solcher Körper und ein $n \in \mathbb{N}$ gegeben. Wir wissen bereits, dass dann ein Körper der Mächtigkeit $q^n = p^{r \cdot n}$ mit einer Einbettung $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$ existiert.

Zusätzlich ist die multiplikative Gruppe eines endlichen Körpers immer zyklisch, also gibt es einen Erzeuger $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}^\times$ mit $\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q(\alpha)$, insbesondere ist diese

Erweiterung primitiv.

Damit ist der Grad des Minimalpolynoms von α gleich dem Grad der Körpererweiterung $[\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q] = n$. Per Definition ist dieses Polynom irreduzibel. $\square$

Übung 11.26. Man gebe die Verknüpfungstafeln des Körpers mit vier Elementen an.

Lösung. Es kommen für die Addition zwei Tafeln in Frage, die korrekte Tafel wird dadurch klar, dass die Charakteristik nicht 4 sein kann, also ist die Additionsgruppe nicht zu $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ isomorph, es muss also $V = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ sein. $\square$

Übung 12.1. Gegeben eine endliche Körpererweiterung $K \subset L$ ist jedes Polynom aus dem Polynomring $L[X]$ Teiler eines Polynoms aus $K[X]$.

Lösung.

1. Sei $P \in L[X]$ zunächst irreduzibel und normiert. Sei $L \subset L'$ eine endliche Körpererweiterung, in der P eine Nullstelle α hat. Da P über $L[X]$ irreduzibel und normiert ist, ist es das Minimalpolynom von α. Da L/K und L'/L endlich sind, ist gemäß Turmregel auch L'/K endlich. Dementsprechend hat α auch ein Minimalpolynom $P' \in K[X]$. Da $P' \in L[X]$ und da P das Minimalpolynom über $L[X]$ ist, folgt $P \mid P'$.
2. Sei $P \in L[X]$ nun irreduzibel und nicht normiert. Dann teilt P trotzdem die selben Polynome wie die normierte Version, also funktioniert die selbe Konstruktion.
3. Sei zuletzt $P \in L[X]$ reduzibel. Da L ein Körper ist, ist $L[X]$ faktoriell, also existiert eine Zerlegung $Q = \prod_{i=1}^n P_i$ in reduzible Polynome. Für jedes dieser Polynome existiert ein $P_i' \in K[X]$ sodass $P_i' \mid K[X]$, es folgt $Q \mid \prod_{i=1}^n P_i' \in K[X2]$.

$\square$

Übung 12.2. Sei p eine Primzahl und seien $\zeta, \xi \in \mathbb{C}$ zwei primitive p-te Einheitswurzeln.

1. Es gilt $\mathbb{Q}(\zeta) = \mathbb{Q}(\xi)$.
2. Es gibt genau einen Körperhomomorphismus $\mathbb{Q}(\zeta) \to \mathbb{Q}(\zeta)$ mit $\zeta \mapsto \xi$.

Lösung. 1. Folgt daraus, dass alle primitiven p-ten Einheitswurzeln bereits die gesamte Gruppe der p-ten Einheitswurzeln erzeugen.

2. Aus der Vorlesung ist bekannt, dass der einzige Körperhomomorphismus $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ die Identität ist. Somit lässt sich jedes $x \in \mathbb{Q}(\zeta)$ als $x = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i \zeta^i$ schreiben, woraufhin die Invarianz von $\mathbb{Q}$ und die Vorschrift $\varphi(\zeta) = \xi$ bereits das Bild von x eindeutig festlegen.

□

Übung 12.3.a. Seien M/L und L/K algebraische Körpererweiterungen.

1. Ist M/K normal, so ist auch M/L normal.
2. Sind $L_1 L_2 \subset M$ normale Körpererweiterungen von K, so ist $L_1 \cap L_2$ normal über K.

Lösung. 1. Per Definition zerfällt für jedes $\alpha \in M$ das Minimalpolynom $\mathrm{Irr}(\alpha, K)$ über M komplett in Linearfaktoren. Zu zeigen ist, dass auch $\mathrm{Irr}(\alpha, L)$ über M in Linearfaktoren zerfällt.

(a) Angenommen, $\mathrm{Irr}(\alpha, K)$ ist über $L[X]$ irreduzibel. Dann gilt $\mathrm{Irr}(\alpha, K) = \mathrm{Irr}(\alpha, L)$, also zerfällt $\mathrm{Irr}(\alpha, L)$ über M ebenfalls in Linearfaktoren.

(b) (?)

2. $\mathrm{Irr}(\alpha, K)$ zerfällt über L_1 und L_2 in Linearfaktoren, und da alle Polynomringe über Körpern faktoriell sind, sind diese Zerlegungen bis auf Reihenfolge eindeutig. Somit müssen alle dieser Linearfaktoren bereits in $L_1 \cap L_2$ liegen, also zerfällt das Polynom auch über $L_1 \cap L_2$ in Linearfaktoren.

□

Übung 12.3.b. Man finde Körper $M \supset L \supset K$, sodass M/L und L/K normal sind, aber M/K nicht.

Lösung. $K = \mathbb{Q}$, $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $M = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$. L ist der Zerfällungskörper von $x^2 - 2$, und M ist der Zerfällungskörper von $x^2 - \sqrt{2}$. Aber $\mathrm{Irr}(\sqrt[4]{2}, \mathbb{Q}) = x^4 - 2$ zerfällt über $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ nicht in Linearfaktoren, da die komplexen Nullstellen fehlen. □

Übung 12.4. Es sei K ein Körper, $P \in K[X]$ ein Polynom vom Grad n und L/K der

Zerfallungskörper von P. Man zeige $[L : K] \mid n!$.

Lösung. Wir führen einen Beweis per Induktion über $\deg P := n$.

1. $n = 1$: Dann ist P bereits ein Linearfaktor, also zerfällt es bereits über K, also $L = K$ und $[L : K] = 1 \mid 1 = 1!$.

2. Sei nun $P \in K[X]$ vom Grad n. Wir unterscheiden zwei Fälle.

   (a) Sei P zuerst irreduzibel. Sei α eine Nullstelle von P. Da P irreduzibel ist, ist es das Minimalpolynom von α über K, also gilt

   $$[K(\alpha) : K] = n$$

   Über $K(\alpha)$ gilt nun $P(X) = (x - \alpha)Q(X)$, wobei $Q \in K(\alpha)[X]$. Es gilt $\deg Q = n - 1$. Sei nun L der Zerfällungskörper von P über K. Dann ist L auch der Zerfällungskörper von Q über $K(\alpha)$. Gemäß Induktionshypothese gilt also

   $$[L : K(\alpha)] \mid (n-1)!,$$

   und per Turmregel folgt

   $$[L : K] = [L : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] \mid n!$$

   (b) Sei nun $P = P_1 \cdot P_2$ reduzibel. Sei $\deg P_1 := n_1$, $\deg P_2 := n_2$. Seien L_1 und L_2 die Zerfällungskörper von P_1 und P_2. Dann ist der Zerfällungskörper von P der Körper $L = \langle L_1, L_2 \rangle$. Es gilt per Induktionshypothese $[L_1 : K] \mid n_1!$, $[L_2 : K] \mid n_2!$.

   Wir behaupten nun ohne Beweis

   $$[L : K] \mid [L_1 : K] \cdot [L_2 : K],$$

   woraus das gewünschte Ergebnis folgt.

□

Übung 13.2. Gegeben ein Körper K und $p, q \in K$ ist das Polynom $P = X^3 + pX + q$ genau dann nicht separabel, wenn $27q^2 + 4p^3 = 0$.

Lösung. Per Definition ist P nicht separabel, wenn es in seinem Zerfallungskörper keine mehrfachen Nullstellen hat, also wenn P und P' über dem Zerfallungskörper keine gemeinsamen Nullstellen haben.

1. Angenommen, es gäbe eine gemeinsame Nullstelle α. Dann hätten wir:

$$P(\alpha) = \alpha^3 + p\alpha + q = 0$$

und:

$$P'(\alpha) = 3\alpha^2 + p = 0$$

(a) Angenommen, char $K = 3$. Dann hätten wir

$$\begin{aligned} 3\alpha^2 + p &= 0 \\ \implies p &= 0 \\ \implies 27q^2 + 4p^3 &= 4p^3 = 0 \end{aligned}$$

(b) Angenommen, char$K \neq 3$. Dann gilt:

$$P'(\alpha) = 3\alpha^2 + p = 0 \implies \alpha^2 = -\frac{p}{3},$$

also folgt:

$$\begin{aligned} 0 &= P(\alpha) \\ &= \alpha^3 + p\alpha + q \\ &= \alpha \cdot \left(-\frac{p}{3}\right) + p\alpha + q \\ &= \frac{2p}{3}\alpha + q \end{aligned}$$

i. In char $K = 2$ erhalten wir $q = 0$, es folgt

$$27q^2 + 4p^3 = 27q^2 = 0$$

ii. In char$K \notin \{2, 3\}$ stellen wir die Gleichung um zu:

$$\begin{aligned} &\frac{2p}{3}\alpha + q = 0 \\ \Leftrightarrow &\frac{2p}{3}\alpha = -q \\ \Leftrightarrow &\alpha = -\frac{3q}{2p} \end{aligned}$$

Setzen wir dies in P ein, erhalten wir:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{3q}{2p}\right)^3 + \left(-\frac{3q}{2p}\right) + q &= 0 \\ \Leftrightarrow -\frac{27q^3}{8p^3} - \frac{3q}{2p} + q &= 0 \\ \Leftrightarrow -27q^3 - 12qp^3 + 8qp^3 &= 0 \\ \Leftrightarrow 27q^3 + 4p^3 &= 0 \end{aligned}$$

2. Sei nun $27q^3 + 4p^3 = 0$. Dann folgt in Charakteristik 2 $q = 0$ und in Charakteristik 3 $p = 0$. Für $p = 0$ folgt $P = \alpha^3 + q = (X + \sqrt[3]{q})^3$, und für $q = 0$ folgt $P = X^3 + pX = X(X^2 + p)$, und in anderer Charakteristik kann wie in der vorherigen Rechnung $27q^3 + 4p^3 = 0$ auf $P\left(-\frac{3q}{2p}\right) = 0$ zurückgeführt werden.

□

Übung 13.3. Seien $M \supset L \supset K$ Körper. Ist M/L separabel und L/K separabel, so ist M/K separabel.

Übung 13.4. Seien K ein Körper, $a \in K^\times$ und $n \geq 1$.

1. Im Zerfällungskörper des Polynoms $X^n - a$ zerfällt auch das Polynom $X^n - 1$ stets in Linearfaktoren.
2. Im Zerfallungskörper des Polynoms $X^n - 1$ zerfällt $X^n - a$ nicht notwendig in Linearfaktoren.

Lösung. 1. Seien α_i die Nullstellen von $X^n - a$. Dann sind α_i/α_1 Nullstellen von $X^n - 1$.

2. Über $\mathbb{Q}$ zerfällt $X^2 - 1$ in Linearfaktoren, aber nicht $X^2 - 2$.

□

- Zahlen -

Übung 0.1. Man führe an einem Beispiel den euklidischen Algorithmus aus und finde eine Darstellung des ggT als Linearkombination der beiden Ausgangszahlen.

Lösung. Sei $a = 21$, $b = 13$. Dann gilt

$$\begin{aligned} 21 &= 1 \cdot 13 + 8 \\ 13 &= 1 \cdot 8 + 5 \\ 8 &= 1 \cdot 5 + 3 \\ 5 &= 1 \cdot 3 + 2 \\ 2 &= 1 \cdot 1 + 1 \end{aligned}$$

Zurückeinsetzen ergibt:

$$\begin{aligned} 1 &= (-1 \cdot 1 + 1 \cdot 2) \\ &= (2 - (3 - 2)) \\ &= (-1 \cdot 3 + 2 \cdot 2) \\ &= (-1 \cdot 3 + 2 \cdot (5 - 3)) \\ &= (-3 \cdot 3 + 2 \cdot 5) \\ &= (-3 \cdot (8 - 5) + 2 \cdot 5) \\ &= (-3 \cdot 8 + 5 \cdot 5) \\ &= (-3 \cdot 8 + 5 \cdot (13 - 8)) \\ &= (-8 \cdot 8 + 5 \cdot 13) \\ &= (-8 \cdot (21 - 13) + 5 \cdot 13) \\ &= (-8 \cdot 21 + 13 \cdot 13) \end{aligned}$$

□

Übung 2.2. Man gebe alle Zahlen an, die bei Division durch 8 Rest 4 lassen, bei Division durch 13 Rest 2, und bei Division durch 11 Rest 9.

Lösung. Da $8, 11$ und 13 teilerfremd sind, existiert gemäß Chinesischem Restsatz

eine eindeutige Lösung modulo $8 \cdot 11 \cdot 13 = 1144$.

$$x = 4 + 8a$$

$$\begin{aligned}
4 + 8a &\equiv 2 \mod 13 \\
\implies 8a &\equiv 11 \mod 13 \\
\implies 40a &\equiv 55 \mod 13 \\
\implies a &\equiv 3 \mod 13 \\
\implies x &= 4 + 8a \\
&= 4 + 8 \cdot (3 + 13b) \\
&= 28 + 104b
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
28 + 104b &\equiv 9 \mod 11 \\
104b &\equiv -19 \mod 11 \\
&\equiv -8 \mod 11 \\
&\equiv 3 \mod 11 \\
\implies 5b &\equiv 3 \mod 11 \\
\implies b \equiv 25b &\equiv 27 \equiv 5 \mod 11 \\
\implies b &= 5 + 11c \\
\implies x &= 28 + 104 \cdot (5 + 11c) \\
&= 28 + 520 + 1144c \\
&= 548 + 1144c
\end{aligned}$$

□

Übung 3.1. **(Verallgemeinerte Fermat'sche Kongruenz)** Gegeben paarweise verschiedene Primzahlen $p_1, \ldots, p_r$ und eine Zahl e, sodass für alle $i \in \{1, \ldots r\}$ $e \equiv 1 \mod (p_i - 1)$ gilt, gilt für alle $a \in \mathbb{Z}$ die Kongruenz

$$a^e \equiv a \mod (p_1 \cdot \ldots \cdot p_r)$$

Lösung. Wir wollen $a^e = a$ für alle $a \in \mathbb{Z}/\prod p_i\mathbb{Z}$. Gemäß Chinesischem Restsatz ist dies Isomorph zu $\prod \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$. Wir müssen also nur $a_i^e = a_i$ für alle $a_i \in \mathbb{Z}/p_i$ zeigen. Für $a_i = 0$ gilt dies sowieso. Für alle anderen Zahlen folgt das Ergebnis aus dem kleinen Satz von Fermat, nach dem gilt

$$a_i^{p_i - 1} = 1,$$

also

$$a_i^e = 1^{\frac{e-1}{p_i-1}} \cdot a_i = a_i$$

□

Übung 3.4. Gibt es ein Vielfaches von 23, dessen letzte Ziffern 45 sind? Gibt es eine Potenz von 23, deren letzte Ziffern 45 sind?

Übung 6.5. Man finde das multiplikative Inverse der Nebenklasse von 21 in $\mathbb{F}_{31}$.

Lösung. Der euklidische Algorithmus gibt eine Darstellung $1 = a21 + b31$, dann ist a das Inverse. □

Übung 6.6. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \equiv 7 \mod 8$. Dann ist n keine Summe von drei Quadraten.

Lösung. Summen von 3 Quadraten mod 8 ausprobieren. □

Übung 7.12. Man schreibe 130 als Produkt von Gaußprimzahlen.

Lösung. $130 = 2 \cdot 5 \cdot 13 = (1+i)(1-i) \cdot (1+2i)(1-3i) \cdot (2+3i)(2-3i)$ □

Übung 9.19. Was ist die Summe der dritten Potenzen der vier Komplexen Nullstellen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ des Polynoms $X^4 + 3X^3 - 5X^2 + X + 13$?

Übung 10.21. Man bringe das Inverse von $7 + \sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ in die Form $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{2}^2$.

Übung 10.24.a. Ist $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ algebraisch über $\mathbb{Q}$?

Übung 10.24.b. Was ist das Minimalpolynom von $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ über $\mathbb{Q}$?

Lösung. Ein Kandidat ist $x^4 - 10x^2 + 1$. Gemäß 8.14 müsste für rationale Nullstellen p/q $p \mid 1$ und $q \mid 1$ gelten, also $p/1 = \pm 1$. Dies sind keine Nullstellen,

also gibt es keine Faktorisierung in ein Polynom vom Grad 1 enthält. Die Einzige Möglichkeit ist nun $x^4 - 10x^2 + 1 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$, aber ein Koeffizientenvergleich liefert, dass auch diese Lösung unmöglich ist. $\square$

Übung 10.24.c. Liegt $\sqrt{2}$ in $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$?

Lösung. Es gilt trivial $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Das Minimalpolynom von $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ hat Grad 4, also gilt auch $\mathbb{Q}(\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})) = 4$. Es gilt jedoch auch

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 4.$$

Da also die beiden Körpererweiterungen den gleichen Grad haben, und eine eine Teilmenge der anderen ist, muss bereits Gleichheit herrschen. $\square$

Explizitere Lösung:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} &= \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \\ &= \sqrt{2} - \sqrt{3}, \end{aligned}$$

also $\frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{3}) = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. $\square$

Übung 11.27. Man zeige mithilfe der Axiomatischen Definition der natürlichen Zahlen, dass es für $a, b \in \mathbb{N}$ mit $b \neq 0$ eindeutig bestimmte $c, d \in \mathbb{N}$ gibt, sodass $d < b$ und $a = bc + d$.

Übung 11.28. Man gebe einen Körperisomorphismus $\mathbb{F}_7(\sqrt{3}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_7(\sqrt{5})$ an.

- Sonstiges zu Polynomen -

Übung 8.14. Gegeben ein Polynomen

$$a_n T^n + \ldots + a_1 T + a_0$$

mit ganzzahligen Koeffizienten und eine rationale Wurzel p/q mit p, q teilerfremden ganzen Zahlen ist p ein Teiler von a_0 und q ein Teiler von a_n

Lösung.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k &= 0 \\
\implies a_0 + \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k\right) + a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n &= 0 \\
\implies p \mid a_0 &= -\left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k\right) - a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n \\
q \mid a_n &= -\left(\frac{q}{p}\right)^n \left(a_0 + \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k\right)\right)
\end{aligned}$$

□

Übung 9.17. $P = X^7 - 9$ ist irreduzibel in $\mathbb{Z}[X]$.

Lösung. Sei $I : \mathbb{Z}[X] \to \mathbb{Z}[Y]$ die Injektion $X \to Y^2$. Dann gilt $I(P) = Y^{14} - 9 = (Y^7 - 3)(Y^7 + 3) := P_1 P_2$. Nach Eisenstein sind P_1 und P_2 über $\mathbb{Q}$ irreduzibel.

Sei nun $P = QR$, sodass R keine Einheit ist. Dann gilt $I(P) = I(QR) = I(Q)I(R)$, also $I(R) \mid I(P)$, also $I(R) \in \{P_1, P_2\}$. Allerdings besteht das Bild von I nur aus Polynomen mit geradem Grad, wir erhalten einen Widerspruch. □

Übung 9.18. Man faktorisiere $(X^n + Y^n)$ über $\mathbb{C}[X, Y]$.

Lösung.

$$\begin{aligned}
X^n + Y^n &= \frac{X^{2n} + Y^{2n}}{X^n - Y^n} \\
&= \frac{Y^{2n}\big((\frac{X}{Y})^{2n} - 1\big)}{Y^n\big((\frac{X}{Y})^{n} - 1\big)} \\
&= \frac{Y^{2n}\prod_{\zeta^{2n}=1}\big(\frac{X}{Y} - \zeta\big)}{Y^n\prod_{\xi^{n}=1}\big(\frac{X}{Y} - \xi\big)} \\
&= \frac{\prod_{\zeta^{2n}=1}(X - \zeta Y)}{\prod_{\xi^{n}=1}(X - \xi Y)} \\
&= \prod_{\substack{\zeta^{2n}=1,\\ \zeta^{n}\neq 1}} (X - \zeta Y)
\end{aligned}$$

□

´

Übung 10.22.B. Das Minimalpolynom von $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ über $\mathbb{R}$ ist

$$P = (X - z)(X - \overline{z})$$

Lösung. Da $z \notin \mathbb{R}$ kann es kein Minimalpolynom vom Grad 1 geben. Gleichzeitig gilt:

$$\begin{aligned}
&(X - z)(X - \overline{z}) = (X - (a + bi))(X - (a - bi)) \\
=&X^2 - X(a + bi) - X(a - bi) + (a + bi)(a - bi) \\
=&X^2 - 2aX + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

also ist $P \in \mathbb{R}[X]$ normiert vom Grad 2 mit z als Nullstelle, also das Minimalpolynom. □

Übung 13.1. Man finde alle komplexen mehrfachen Nullstellen des Polynoms

$$P = X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 4$$

Lösung. λ ist genau dann eine mehrfache Nullstelle von P, wenn es eine Nullstelle der Ableitung P' ist. Die Ableitung ist:

$$P' = 4X^3 - 12X^2 + 10X - 4$$

Wir berechnen den größten gemeinsamen Teiler der beiden Polynome, und den

dazugehörigen Rest, durch Polynomdivision:

$$\begin{aligned}
&X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 4 \\
=&\left(\frac{1}{4}X\right) \cdot \left(4X^3 - 12X^2 + 10X - 4\right) - X^3 + 2.5X^2 - 3X + 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&- X^3 + 2.5X^2 - 3X + 4 \\
=&\left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \left(4X^3 - 12X^2 + 10X - 4\right) - 0.5X^2 - 0.5X + 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\implies P &= \left(\frac{1}{4}X - \frac{1}{4}\right)P' + (-0.5X^2 - 0.5X + 3) \\
&:= t_1 \cdot P' + r_1
\end{aligned}$$

Wir teilen nun P' durch r_1 mit Rest:

$$\begin{aligned}
&4X^3 - 12X^2 + 10X - 4 \\
=&(-8X) \cdot \left(-0.5X^2 - 0.5X + 3\right) - 16X^2 + 34X - 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&- 16X^2 + 34X - 4 \\
=&(32) \cdot \left(-0.5X^2 - 0.5X + 3\right) + 50X - 100
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P' &= (-8X + 32) \cdot r_1 + 50X - 100 \\
&:= t_2 \cdot r_1 + r_2
\end{aligned}$$

Zuletzt teilen wir r_1 durch r_2 ohne Rest:

$$\begin{aligned}
(-0.5X^2 - 0.5X + 3) : (50X - 100) &= -\frac{1}{100}X \\
(-0.5X^2 + X) \\
(-1.5X + 3) : (50X - 100) &= -\frac{3}{100}
\end{aligned}$$

Also ist $r_2 = 50X - 100 = 50(X - 2)$ der größte gemeinsame Teiler von P und P'. Insbesondere ist 2 eine Nullstelle von P', also eine mehrfache Nullstelle von P, also ist $(X-2)^2 = X^2 - 4X + 4$ ein Faktor von P. Wir erhalten durch erneute Polynomdivision:

$$\begin{aligned}
&X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 4 : X^2 - 4X + 4 = X^2 + 1 \\
&\underline{X^4 - 4X^3 + 4X^2} \\
&\qquad\qquad X^2 - 4X + 4 \\
&\qquad\qquad \underline{X^2 - 4X + 4} \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad 0
\end{aligned}$$

Also gilt $P = (X-2)^2(X-i)(X+i)$. $\square$

- Sonstiges -

Übung 0.3. Seien $(M, \top)$ ein Monoid und e sein neutrales Element. Man zeige: M ist genau dann eine Gruppe, wenn es für jedes $a \in M$ ein $\overline{a} \in M$ gibt, sodass $\overline{a} \top a = e$, und dieses Element $\overline{a}$ ist dann notwendig bereits das Inverse von a in M.

Lösung.

$$\begin{aligned} a \top \overline{a} &= e \top (a \top \overline{a}) \\ &= (\overline{\overline{a}} \top \overline{a}) \top a \top \overline{a} \\ &= \overline{\overline{a}} \top (\overline{a} \top a) \top \overline{a} \\ &= \overline{\overline{a}} \top e \top \overline{a} \\ &= \overline{\overline{a}} \top \overline{a} \\ &= e \end{aligned}$$

Also ist das Linksinverse auch das Rechtsinverse, also bildet M eine Gruppe. □

Übung 0.4. Ein endliches Monoid $(M, \top)$, in dem für jedes Element $a \in M$ die Multiplikationsabbildung injektiv ist, muß bereits eine Gruppe sein.

Lösung. Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung $M \to M$, also folgt gemäß Schubfachprinzip aus Injektivität bereits Surjektivität. Somit existiert für jedes a ein b mit $a \top b = e$, und gemäß Übung 0.3 ist dieses b auch das Linksinverse und M ist eine Gruppe. □

Übung 1.1. Ein Element a eines Monoids M ist genau dann invertierbar, wenn es $b, c \in M$ gibt, sodass $b \top a = e = a \top c$.

Lösung.

$$\begin{aligned} b &= b \top e \\ &= b \top (a \top c) \\ &= (b \top a) \top c \\ &= e \top c \\ &= c \end{aligned}$$

□

Übung 4.2. Gegeben $p, q \in \mathbb{N}$ mit $q \geq 1$ gibt es genau $\frac{(pq)!}{p!(q!)^p}$ Partitionen einer Menge mit pq Elementen in p Teilmengen mit jeweils q Elementen.