

Algebrauppgift 4 - Ekvationssystem

Emma Bastås

Oktober 23, 2022

Uppgiften är att till varje reellt tal a bestämma antalet lösningar till följande ekvationssystem:

$$\begin{cases} (4-a)x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ -2x_1 + (1-a)x_2 + 2x_3 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 + (4-a)x_3 = 1 \end{cases} . \quad (\star)$$

Först noterar vi att alla tre ekvationer är linjära, och vi kan därför skriva om ekvationssystem till denna ekvivalenta matrisekvation:

$$(\star) \iff AX = B$$

där:

$$A = \begin{pmatrix} 4-a & 2 & -1 \\ -2 & 1-a & 2 \\ -1 & 2 & 4-a \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

För linjära matrisekvationer på denna form finns precis tre möjligheter avseende lösningar:

- Det finns ingen lösning.
- Det finns precis en lösning.
- Det finns oändligt många lösningar.

Att determinanten till A är skild från noll är ekvivalent med att A har en invers, vilket i sin tur är ekvivalent med att $AX = B$ har precis en lösning (nämligen $X = A^{-1}B$). Är determinanten noll så gäller då antingen att ingen eller oändligt många lösningar till $AX = B$ finns.

Vi finner nu de värden på a för vilket $\det A = 0$. Här använder vi oss helt

enkelt av den otympliga formeln för determinanter för 3×3 matriser, $\det(a_{ij}) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$:*

$$\begin{aligned} \det A &= 0 \\ \iff (4-a)(1-a)(4-a) + 2 \cdot 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \cdot 2 \\ &\quad - (4-a) \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot (-2) \cdot (4-a) - (-1) \cdot (1-a) \cdot (-1) = 0 \\ \iff -a^3 + 9a^2 - 23a + 15 &= 0. \end{aligned} \tag{1}$$

Vi finner att $\det A = 0$ är en ekvivalent ekvation till (1). Att lösa tredjegradekvationer i det generella fallet ligger utanför ramen för denna kurs, men vi har tur (eller snarare ett tillrättat problem) och kan med hjälp av Rationella rotsatsen, faktorsatsen och polynomdivision lösa ekvationen.[†]

Vi finner att lösningarna till $\det A = 0$ är $a = 1$, $a = 3$ och $a = 5$. Detta är ekvivalent med att $AX = B$ har oändligt många, eller inga lösningar för var och ett av dessa värden på a . För alla andra värden på a gäller därav en unik lösning till ekvationen.

Nu återstår att bestämma antalet lösningar för $a = 1$, $a = 3$ och $a = 5$.

Fallet $a = 1$:

Vi låter $a = 1$, ställer upp ekvationen $AX = B$ för Gauss-Jordan eliminering och utför 2 operationer:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow_+]{\begin{array}{c} \boxed{-1} \\ \boxed{-2} \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right).$$

Skrivsättet här är bara lite smidig notation, det som egentligen sker är följande:

$$\begin{aligned} &AX = B \\ \iff \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ -1 & & 1 \end{pmatrix} AX &= \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ -1 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & -2 & 1 \end{pmatrix} B \\ &\iff \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{2}$$

*Sarrus regel eller cofaktorexpansion går såklart lika bra.

[†]Se kapitel 9 och 10 i algebrakompndiumet för en redogörelse för hur detta görs.

Detta är ekvivalent med ekvationsystemet:

$$\begin{cases} \dots = 1 \\ \dots = -2 \\ 0x_0 + 0x_1 + 0x_2 = 4 \end{cases}$$

och det är uppenbart att detta saknar lösningar. Alltså saknar den ekvivalenta ekvationen $AX = B$ lösningar för $a = 1$.