

# Seminarieuppgift 4 - Absolutbelopp

Emma Bastås

September 30, 2022

Uppgiften är att finna de värden på  $x$  som uppfyller olikheten:

$$2|x+2| < |x| + |x+3|. \quad (\star)$$

Vi adderar  $2|x+2|$  till båda led och skriver sedan om uttrycket med hjälp av identiteten  $|x| = \sqrt{x^2}$ :

$$\begin{aligned} (\star) &\iff 0 < |x| + |x+3| - 2|x+2| \\ &\iff 0 < \sqrt{x^2} + \sqrt{(x+3)^2} - 2\sqrt{(x+2)^2}. \end{aligned} \quad (\star\star)$$

Låt  $f(x)$  definieras till uttrycket  $(\star\star)$ :

$$f(x) = \sqrt{x^2} + \sqrt{(x+3)^2} - 2\sqrt{(x+2)^2}.$$

Uppgiften omformuleras nu till denna ekvivalenta problemställning:

$$\text{Finn alla värden på } x \text{ så att } f(x) > 0.$$

Nu finner vi alla nollställena till  $f(x)$ , vi börjar med att ställa upp ekvationen och flytta över en av rötterna till högerledet:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ \iff \sqrt{x^2} + \sqrt{(x+3)^2} - 2\sqrt{(x+2)^2} &= 0 \\ \iff \sqrt{x^2} + \sqrt{(x+3)^2} &= 2\sqrt{(x+2)^2}. \end{aligned} \quad (1)$$

Båda led kvadreras varefter vi förenklar så att de kvarvarande kvadratrötterna står ensam i högerledet:

$$\begin{aligned} (1) &\implies \left( \sqrt{x^2} + \sqrt{(x+3)^2} \right)^2 = \left( 2\sqrt{(x+2)^2} \right)^2 \\ &\iff x^2 + 2\sqrt{x^2}\sqrt{(x+3)^2} + (x+3)^2 = 4(x+2)^2 \\ &\iff 2x^2 + 10x + 7 = 2\sqrt{x^2}\sqrt{(x+3)^2}. \end{aligned} \quad (2)$$

Återigen kvadreras båda led och vi förenklar:

$$\begin{aligned}
 (2) &\implies (2x^2 + 10x + 7)^2 = (2\sqrt{x^2}\sqrt{(x+3)^2})^2 \\
 &\iff 4x^4 + 40x^3 + 128x^2 + 140x + 49 = 4x^4 + 24x^3 + 36x^2 \\
 &\iff 16x^3 + 92x^2 + 140x + 49 = 0.
 \end{aligned} \tag{3}$$

Nu har vi kört fast, visserligen går det att lösa tredjegradslikvationer av denna karaktär, men det ligger utanför denna seminariekurs. Om vi blickar tillbaka till (2) ser vi räddningen. Vi kan återigen använda identiteten  $|x| = \sqrt{x^2}$  på (2):

$$\begin{aligned}
 (2) &\iff 2x^2 + 10x + 7 = 2\sqrt{x^2}\sqrt{(x+3)^2} \\
 &= 2\sqrt{(x(x+3))^2} \\
 &= 2|x(x+3)| \\
 &= 2|x^2 + 3x|.
 \end{aligned}$$

Nu kikar vi på ekvationen för fallet  $x^2 + 3x \geq 0$  och löser den resulterande ekvationen:

$$2x^2 + 10x + 7 = 2x^2 + 6x \iff 4x + 7 = 0 \iff x = -\frac{7}{4}.$$

Vi ser att  $x = -\frac{7}{4}$  löser ekv (2) vilket innebär att detta också är en lösning för (3) eftersom den medförs av (2). Faktorsatsen ger nu att  $(x + \frac{7}{4})$  är en faktor till (3) och vi kan således utföra polynomdivision. Resultaten av en sådan division ger:

$$(3) \iff (x + \frac{7}{4})(16x^2 + 64x + 28) = 0. \tag{4}$$

De resterande lösningarna till (3) är nollställerna till andragradspolynomet i (4), vi löser denna andragradsekvation med valfri metod, lösningarna blir:

$$x = -\frac{7}{2} \quad \text{och} \quad x = -\frac{1}{2}.$$

$f(x) = 0$  har medfört ekv (4) som har de tre lösningarna  $x = -7/2$ ,  $x = -7/4$  och  $x = -1/2$ , vi testar nu alla tre värden  $f(x) = 0$  och finner att endast

$x = -1/2$  är en lösning till  $f(x) = 0$ .

Vi väljer nu två konkreta tal  $a$  och  $b$  som ligger till vänster respektive höger om nollstället, säg  $a = -2$  och  $b = 0$ . Vi finner att  $f(a) = 3$  och  $f(b) = -1$ . Nu har vi faktiskt all information vi behöver för att visa att  $f < -1/2$  är lösningen till (\*\*):

$f(x)$  är en kontinuerlig funktion och  $x = -1/2$  är dess enda nollstället. Det finns en punkt i intervallet  $] -\infty, -1/2[$ , nämligen  $a$  så att  $f(a) > 0$ . Om det finns en punkt  $\mu$  i detta intervall så att  $f(\mu) < 0$  så säger kontinuitetssatsen\* att  $f(x)$  då antar alla värden mellan  $f(a)$  och  $f(\mu)$  i intervallet  $[a, \mu]$ , då måste  $f(x)$  anta värdet 0 i detta intervall. Men  $x = -1/2$  är det enda nollstället och ligger inte i intervallet. Antagandet att det finns ett sådant  $\mu$  i intervallet leder till en motsägelse, alltså måste dess motsats vara sann; det finns inget sådant  $\mu$  i intervallet, och då gäller att  $f(x) > 0$  för alla  $x$  i intervallet.

På samma sätt visar vi att det för alla värden av  $x$  intervallet  $] -1/2, \infty[$  gäller att  $f(x) < 0$  eftersom  $b$  ligger i detta intervall och  $f(b) < 0$ .

□

---

\*Persson och Böiers, *Analys i en variabel* upplaga 3:2 s.153