Organisation

- Identification des .fits
- B, V mag
- Teff
- Log(g)
- Metallicity
- Rayon, masse
- E(B-V)

=> K2 EPIC data

Correction RV

Simple calcul Doppler pour retrouver le “bon” spectre

- Utilisation fonction masque (pas de moi)
- Application aux deux types de spectres
- Fit Gaussien



Sindex

- HK:
  - Utilisation des valeurs de la littérature
  - Deux bandes de continuum, et une bande par raie, total de 4.
- IRT:
  - Moins de littérature, application similaire
  - Deux bandes de continuum, et une bande par raie, total de 5.

Intégration des valeurs dans les bandes (triangulaire).

Ex1

EPIC212166808



Ex2

EPIC211529603



Comparaison S et B-V





Comparaison S(H,K) S(I,R,T)



R’

- HK:
  - Calcul avec les formules du Lovis
  - Correction métallicité avec un fit sur les données des .fits
- IRT:
  - Même correction photométrique que pour HK (peut être a changer)
  - Semble très dépendant de B-V

Temp BV


Distribution of stars depending on the Teff and B-V values.
Teff vs B-V
Model from Lovis et al., [Fe/H]= 0
[Fe/H]= 0.5
[Fe/H]= -0.5
Fit calculated on the data, [Fe/H]= 0
[Fe/H]= 0.5
[Fe/H]= -0.5
Teff (K)
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
B-V

Comparaison R’ avec B-V





Comparaison R’ avec Teff



Comparaison R’(H,K) R’(I,R,T)



Améliorations, changements, etc...

- Chercher une meilleure correction Rphot pour IRT
- Trouver un lien entre R’irt et R’hk