

Dimension von Varietäten

Yvan Ngumeteh

Emma Ahrens

2. Mai 2018

Satz 1 (Hilbert's Nullstellensatz für Hyperebenen). *Sei k algebraisch abgeschlossen, $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ nicht konstant und $\emptyset \neq H_f \subseteq k^n$ die korrespondierende Hyperebene. Wir können f schreiben als $f = f_1^{n_1} \cdots f_r^{n_r}$ mit f_1, \dots, f_r irreduzibel und paarweise teilerfremd. Dann ist*

$$H_f = H_{f_1} \cup \cdots \cup H_{f_r} \quad \text{and} \quad \mathbf{I}(H_f) = (f_1 \cdots f_r).$$

Insbesondere gilt, falls f irreduzibel ist, dass $\mathbf{I}(H_f) = (f)$.

Definition 2 (Algebraische Elemente). *Sei A eine k -Algebra. Dann heißt die Menge $a_1, \dots, a_m \in A$ algebraisch unabhängig, falls kein Polynom $0 \neq F \in k[X_1, \dots, X_m]$ existiert mit $F(a_1, \dots, a_m) = 0$.*

Im Folgenden sind A und B kommutative Ringe mit Eins und $A \subseteq B$.

Definition 3 (Ganze Elemente). *Wir nennen $b \in B$ ganz über A , wenn es Elemente $a_1, \dots, a_n \in A$ gibt mit*

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1b + a_0 = 0$$

für ein $n \in \mathbb{N}$. Außerdem heißt B ganz über A , wenn jedes Element aus B ganz über A ist.

Lemma 4. *Sei $b \in B$. Dann ist äquivalent:*

1. *b ist ganz über A*
2. *Der von b generierte Teilring $A[b] \subseteq B$ ist ein endlich erzeugter A -Modul.*
3. *Es existiert ein Teilring $C \subseteq B$ mit $A[b] \subseteq C$ und C ist ein endlich erzeugter A -Modul.*

Korollar 5. *Sei A, B kommutative Ringe mit $A \subseteq B$.*

1. *Falls $B = A[b_1, \dots, b_n]$, wobei jedes $b_i \in B$ ganz über $A[b_1, \dots, b_{i-1}]$ ist, dann ist B endlich erzeugter A -Modul und ganz über A .*
2. *Die Menge $\bar{A}_B := \{b \in B \mid b \text{ ganz über } A\}$ ist ein Teilring von B und heißt ganzer Abschluss von A in B .*
3. *Sei $C \subseteq B$ ein Teilring mit $A \subseteq C$. Falls C ganz ist über A und B ganz ist über C , dann ist auch B ganz über A .*
4. *Falls B ein Körper ist und ganz über A , dann ist A auch ein Körper.*

Eine k -Algebra ist im Folgenden immer eine kommutative, assoziative k -Algebra mit Eins.

Satz 6 (Noetherscher Normalisierungssatz). *Sei A eine endlich erzeugte k -Algebra. Dann existieren algebraisch unabhängige Elemente $a_1, \dots, a_d \in A$, so dass A ganz ist über dem Teilring $k[a_1, \dots, a_d]$.*

Satz 7 (Schwache Form von Hilbert's Nullstellensatz). *Sei k algebraisch abgeschlossen. Dann sind die maximalen Ideale in $k[X_1, \dots, X_n]$ genau die Ideale der Form $(X_1 - v_1, \dots, X_n - v_n)$ mit $v_i \in k$. Allgemeiner gilt, falls A eine beliebige k -Algebra ist, dass $A/I \cong k$ für jedes maximale Ideal I in A .*