

# Banco de cuestiones de Microbiología II

Versión V4.24 - 472 preguntas. Incluye Virología, Parasitología, Artrópodos y Serpientes.

## Índice interactivo

Generalidades de Virología - 21 preguntas  
Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8 - 45 preguntas  
Papilomavirus - 33 preguntas  
Adenovirus - 31 preguntas  
Parvovirus y Poxvirus - 38 preguntas  
Picornavirus - 34 preguntas  
Orthomixovirus y Reovirus - 33 preguntas  
Paramixovirus - 36 preguntas  
Rhabdovirus - 30 preguntas  
Togavirus y Flavivirus - 30 preguntas  
Retrovirus - 31 preguntas  
Generalidades, huéspedes y prevención - 10 preguntas  
Paludismo - 10 preguntas  
Trypanosoma - 10 preguntas  
Toxoplasma gondii - 10 preguntas  
Leishmania - 10 preguntas  
Protozoarios intestinales y urogenitales - 10 preguntas  
Nematodos intestinales - 10 preguntas  
Cestodos - 10 preguntas  
Trematodos - 10 preguntas  
Artrópodos de importancia médica - 10 preguntas  
Importancia médica de serpientes - 10 preguntas

# Generalidades de Virología

**1. Un alumno afirma que un virus clínicamente importante puede llevar ADN y ARN al mismo tiempo. Según las generalidades de virología, cuál corrección es la más adecuada?**

- A. Puede llevar ambos si posee envoltura lipídica.
- B. Puede llevar ambos durante la fase de eclipse.
- C. Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos.
- D. El ARN aparece solo en virus de cápside desnuda.
- E. El ADN aparece solo en virus con simetría helicoidal.

**2. Si un virión conserva infectividad después de desecación, ácido gástrico y detergentes, que rasgo estructural lo explica mejor?**

- A. Cápside desnuda proteica.
- B. Envoltura con glucoproteínas.
- C. Genoma segmentado.
- D. Transcriptasa inversa.
- E. Simetría compleja.

**3. En un esquema básico, capsómeros de polipeptidos que rodean el ácido nucleico forman la cápside. Como se denomina el conjunto cápside más ácido nucleico?**

- A. Envoltura viral.
- B. Peplómero viral.
- C. Cuerpo de inclusión.
- D. Viroplasma.
- E. Nucleocápside.

**4. Durante el diagnóstico de una infección viral aguda, se busca detectar directamente material genético del virus. Qué técnica corresponde mejor a ese objetivo?**

- A. Prueba de coagulasa.
- B. PCR o RT-PCR.
- C. Prueba de ureasa.
- D. Coprocultivo bacteriano.
- E. Tinción de Gram.

**5. La envoltura viral suele relacionarse con una mayor fragilidad ambiental. Qué consecuencia práctica se espera?**

- A. Mayor resistencia a bilis.
- B. Mayor tolerancia a desecación.
- C. Mayor estabilidad en aguas residuales.
- D. Mayor sensibilidad a detergentes.
- E. Mayor resistencia a pH ácido.

**6. Un virus causa enfermedad por destruir células durante su replicación. Qué término general describe mejor ese efecto?**

- A. Citólisis viral.
- B. Latencia antigénica.
- C. Tolerancia humoral.
- D. Recombinación bacteriana.
- E. Antagonismo fúngico.

**7.Cuál combinación relaciona mejor estructura y conducta biológica viral?**

- A. Envoltura - resistencia extrema a ácido.
- B. Cápside desnuda - mayor fragilidad ambiental.
- C. Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.
- D. ARN - imposibilidad de variación genética.
- E. ADN - transmisión solo vectorial.

**8. Si un virus no produce energía por sí mismo y necesita maquinaria celular, que propiedad esta siendo destacada?**

- A. Es una célula procariota atípica.
- B. Es un hongo intracelular facultativo.
- C. Es una bacteria sin pared celular.
- D. Es un protozoo con metabolismo reducido.
- E. Es un parásito intracelular obligado.

**9. En la secuencia general de replicación, que evento ocurre después de la unión/penetración y antes de la síntesis de nuevos componentes?**

- A. Formación de anticuerpos IgG.
- B. Liberación del genoma viral.
- C. Eliminación renal del virión.
- D. Producción de exotoxinas.
- E. Encapsulación por eosinófilos.

**10. Un informe integra transmisión respiratoria, fecal-oral, sexual, vectorial y zoonótica. Qué enfoque del curso resume mejor esa lista?**

- A. Fases morfológicas de protozoarios.
- B. Tipos de inmunidad bacteriana.

- C. Etapas de esporulación fungica.
- D. Vías epidemiológicas de virus estudiados.
- E. Clases de antibióticos betalactámicos.

**11. ¿Cuál es una característica fundamental de los genomas víricos según su composición de ácidos nucleicos?**

- A. Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico.
- B. Carecen de ácido nucleico y se replican mediante proteínas estructurales.
- C. Pueden contener tanto ADN como ARN en una misma partícula.
- D. El genoma siempre es una cadena doble de ADN circular.

**12. ¿Qué unidad de medida se utiliza habitualmente para determinar el tamaño de un virión?**

- A. Nanómetros (nm)
- B. Micrómetros (µm)
- C. Milímetros (mm)
- D. Angstroms (Å)

**13. Se define como nucleocápside a la estructura formada por:**

- A. La envoltura lipídica y las glucoproteínas externas.
- B. El conjunto de capsómeros antes de unirse al genoma.
- C. La membrana plasmática de la célula que rodea al virus.
- D. El ácido nucleico asociado a la cápside proteica.

**14. ¿En qué lugar de la célula hospedadora ocurre generalmente la replicación de los virus ADN?**

- A. Núcleo
- B. Retículo endoplásmico
- C. Aparato de Golgi
- D. Citoplasma

**15. ¿Qué término describe el periodo en el que un virus está presente en el cuerpo pero en estado de reposo, sin multiplicarse ni producir síntomas?**

- A. Infección lítica
- B. Periodo de eclipse
- C. Periodo de latencia
- D. Fase prodrómica

**16. En el contexto de la citopatogenia, una infección transformadora se caracteriza por:**

- A. La replicación viral continua a niveles muy bajos sin matar la célula.
- B. El fracaso total de la entrada del virus a la célula diana.
- C. La muerte rápida de la célula por lisis.
- D. La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada.

**17. ¿Cuál es el mecanismo de liberación más común para los virus que poseen envoltura?**

- A. Difusión simple
- B. Lisis celular
- C. Gemación
- D. Endocitosis inversa

**18. ¿Qué familia de virus posee un genoma de ARN segmentado y causa la gripe?**

- A. Picornaviridae
- B. Coronaviridae
- C. Retroviridae
- D. Orthomyxoviridae

**19. ¿Cuál de las siguientes técnicas se considera el estándar actual para detectar genomas de ARN viral?**

- A. Hibridación in situ (FISH)
- B. Microscopía electrónica
- C. RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa)
- D. PCR convencional

**20. ¿Cuál de estos virus es un ejemplo de virus ADN con cápside desnuda (sin envoltura)?**

- A. Herpesvirus
- B. Adenovirus
- C. Hepadnavirus
- D. Poxvirus

**21. Los síntomas iniciales e inespecíficos como fiebre, cefalea o dolor corporal que preceden a los síntomas graves se denominan:**

- A. Recidiva
- B. Viremia
- C. Pródromos
- D. Resolución

## Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8

**1. Una paciente presenta lesiones vesiculares recurrentes en la misma zona. Qué propiedad del VHS explica mejor estas recurrencias?**

- A. Latencia en ganglios sensoriales.
- B. Mutación diaria de la cápside.
- C. Eliminación completa del genoma.
- D. Replicación exclusiva en eritrocitos.
- E. Resistencia por cápside desnuda.

**2. Para iniciar una infección por VHS, que condicion de entrada es más coherente con su patogenia?**

- A. Eritrocito maduro intacto.
- B. Hepatocito sin receptor.
- C. Hueso cortical compacto.
- D. Cartilago articular sano.
- E. Piel o mucosa lesionada.

**3. En la replicación de herpes simple, las proteínas beta se relacionan principalmente con:**

- A. Ensamble tardío de cápside.
- B. Replicación del ADN viral.
- C. Bloqueo de la fusión celular.
- D. Formación de oocistos.
- E. Maduración en mosquito.

**4. Un niño desarrolla varicela y años después herpes zoster.Cuál secuencia biológica es la más correcta?**

- A. Infección intestinal, quiste y excisión.
- B. Bacteriemia primaria, endospora y toxina.
- C. Viremia nula, eliminación total y reinfección.
- D. Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.
- E. Vectorización, esporozoito y merozoito.

**5. El virus varicela-zoster comparte con los herpesvirus la capacidad de:**

- A. Establecer infección persistente de por vida.
- B. Vivir libremente fuera de células.
- C. Formar huevos en heces humanas.
- D. Replicarse solo en citoplasma sin núcleo.
- E. Tener ARN segmentado negativo.

**6. Un paciente inmunodeprimido con VHS tiene riesgo aumentado de cuadros graves porque estos virus:**

- A. Nunca reactivan en inmunidad normal.
- B. Son siempre benignos en todo hospedador.
- C. Pueden producir morbilidad significativa.
- D. No inducen infección latente.
- E. Carecen de tropismo tisular.

**7. Qué hallazgo citológico apoya una infección por herpesvirus, aunque no distingue con precisión el tipo viral?**

- A. Huevos mameonados.
- B. Larvas filariformes.
- C. Quistes con cuatro núcleos.
- D. Eritrocitos parasitados en anillo.
- E. Células gigantes multinucleadas.

**8. En herpes simple, la zona de latencia más característica corresponde a:**

- A. Macrófagos esplénicos.
- B. Neurona de ganglio sensorial.
- C. Hepatocito periportal.
- D. Eritroblasto medular.
- E. Queratinocito cornificado.

**9.Cuál afirmación compara mejor VHS-1 y VHS-2?**

- A. No comparten ADN ni antígenos.
- B. Ambos son virus ARN envueltos.
- C. Solo VHS-2 puede permanecer latente.
- D. Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.
- E. Solo VHS-1 se replica en núcleo.

**10. En una sospecha de encefalitis herpética, la herramienta diagnóstica directa más útil para LCR suele ser:**

- A. Hemocultivo anaerobio.
- B. Cinta adhesiva perianal.
- C. PCR para ADN viral.
- D. Gota gruesa de malaria.

E. Búsqueda de huevos operculados.

**11. Un adolescente con fiebre, faringitis, adenopatías y linfocitos atípicos tuvo contacto íntimo por saliva. Qué virus encaja mejor?**

- A. Citomegalovirus.
- B. Virus herpes humano 8.
- C. Adenovirus entérico.
- D. Parvovirus B19.
- E. Virus Epstein-Barr.

**12. La mononucleosis infecciosa por VEB se interpreta como resultado principalmente de:**

- A. Lisis de eritrocitos por toxina preformada.
- B. Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados.
- C. Migración larvaria hacia pulmón.
- D. Destrucción directa de hepatocitos por oocistos.
- E. Replicación viral exclusiva en neutrófilos.

**13. En VEB, qué célula es clave como diana y zona de latencia?**

- A. Eritrocito maduro.
- B. Neurona motora.
- C. Miocito esquelético.
- D. Linfocito B.
- E. Célula parietal gástrica.

**14. Un paciente inmunodeficiente con VEB presenta riesgo especial de:**

- A. Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.
- B. Tos ferina y bronquiolitis neonatal.
- C. Larva migrans ocular por nematodo.
- D. Hidatidosis hepática multivesicular.
- E. Anemia por uncinarias.

**15. Qué cuadro se asocia con VHH-6/VHH-7 en la infancia?**

- A. Rabia furiosa.
- B. Condiloma acuminado.
- C. Exantema súbito.
- D. Fiebre amarilla urbana.
- E. Parálisis flácida poliomielítica.

**16. La asociación clínica más característica de VHH-8 es:**

- A. Eritema infeccioso.
- B. Panencefalitis esclerosante.
- C. Gastroenteritis por rotavirus.
- D. Quiste hidatídico.
- E. Sarcoma de Kaposi.

**17. CMV congénito debe sospecharse con mayor atención cuando existe:**

- A. Ingestión de pescado crudo con B12 baja.
- B. Infección materna y daño fetal compatible.
- C. Mordedura de perro con hidrofobia.
- D. Prurito anal nocturno familiar.
- E. Piodermitis por estreptococo.

**18. En CMV, qué hallazgo histológico clásico orienta el diagnóstico?**

- A. Huevos con espina lateral.
- B. Trofozoitos con eritrocitos ingeridos.
- C. Cápside desnuda en forma de bala.
- D. Inclusiones intranucleares en ojo de buho.
- E. Larvas en cinta adhesiva.

**19. Una mononucleosis con anticuerpos heterófilos negativos puede relacionarse con:**

- A. Rabdovirus.
- B. Dengue primario.
- C. Citomegalovirus.
- D. Fasciola hepática.
- E. Taenia saginata.

**20.Cuál combinación es más correcta?**

- A. VEB - saliva - linfocito B.
- B. CMV - mosquito - hepatocito exclusivo.
- C. VHH-8 - agua - enterocito.
- D. VHH-6 - carne cruda - músculo.
- E. VEB - garrapata - eritrocito.

**21. ¿Cuál es el sitio primario de latencia para el Virus de Epstein-Barr (VEB) según la fisiopatología descrita?**

- A. Células epiteliales de la bucofaringe
- B. Monocitos
- C. Linfocitos T protectores
- D. Linfocitos B

**22. En el contexto de la patogenia del VEB, ¿qué fenómeno explica la aparición de la mononucleosis infecciosa?**

- A. La lisis directa de todas las células epiteliales infectadas
- B. Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T
- C. Una respuesta inmunitaria ausente o ineficaz
- D. La producción exclusiva de anticuerpos heterófilos

**23. ¿Qué característica morfológica define a las células de Downey observadas en frotis citológicos de pacientes con mononucleosis?**

- A. Células epiteliales con aspecto veloso en la cavidad bucal
- B. Cuerpos de inclusión basófilos en forma de 'ojo de búho'
- C. Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado
- D. Linfocitos B monoclonales con mandíbula deformada

**24. ¿Cuál es la tríada clásica de síntomas que presenta un paciente con mononucleosis infecciosa?**

- A. Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa
- B. Fiebre súbita, convulsiones y exantema generalizado
- C. Microcefalia, ictericia y calcificación intracerebral
- D. Fatiga crónica, cefalea y diarrea persistente

**25. En pacientes con SIDA, ¿cuál es la manifestación oportunista del VEB que afecta específicamente a las células epiteliales de la boca?**

- A. Leucoplasia vellosa oral
- B. Linfoma de Burkitt
- C. Retinitis por VEB
- D. Carcinoma nasofaríngeo

**26. ¿Cuál es el principal vector o vía de transmisión del Citomegalovirus (CMV) mencionado como el más relevante?**

- A. Saliva
- B. Aerosoles respiratorios
- C. Semen
- D. Lágrimas

**27. ¿Qué hallazgo histológico es patognomónico de la infección por CMV y constituye su efecto citopatológico (ECP)?**

- A. Células epiteliales con inclusiones intracitoplasmáticas filamentosas
- B. Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho'
- C. Presencia de linfocitos de Downey
- D. Linfocitos B policlonales en proliferación

**28. ¿Cuál es la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas según el material de estudio?**

- A. Virus de la Malaria
- B. Citomegalovirus (CMV)
- C. Virus Herpes Humano 6 (VHH-6)
- D. Virus de Epstein-Barr (VEB)

**29. ¿En qué tipo de células establece su latencia el Citomegalovirus (CMV)?**

- A. Células epiteliales y endoteliales
- B. Monocitos y linfocitos
- C. Linfocitos B únicamente
- D. Neuronas sensoriales

**30. En recién nacidos prematuros, ¿cuál es el riesgo principal tras recibir transfusiones de sangre contaminadas con CMV?**

- A. Neumonía y hepatitis
- B. Convulsiones febriles
- C. Pérdida auditiva bilateral
- D. Sarcoma de Kaposi

**31. La roséola o exantema súbito es causada por la infección de qué virus específicos?**

- A. VHS-1 y VHS-2
- B. VHH-8 únicamente
- C. VHH-6B y VHH-7
- D. VEB y CMV

**32. ¿Qué síntoma es un factor de 'atención' importante en la infección por VHH-6 durante la infancia (6-24 meses)?**

- A. Linfoma africano
- B. Rotura del bazo
- C. Ceguera por retinitis
- D. Convulsiones febriles

**33. ¿Cómo se describe el exantema característico de la roséola súbita?**

- A. Vesículas dolorosas en dermatomas específicos
- B. Exudado blanquecino en la faringe con fatiga extrema
- C. Pápulas umbilicadas que pican intensamente

D. Lagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito

**34. ¿Cuál es la recomendación preventiva para la mononucleosis en cuanto al contacto con el virus en etapas tempranas de la vida?**

- A. Aislamiento total de los niños para evitar la infección latente
- B. Vacunación obligatoria antes de los 2 años
- C. Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños
- D. Administración de ganciclovir profiláctico en guarderías

**35. En el diagnóstico de laboratorio para mononucleosis, ¿qué técnica se reserva exclusivamente para casos graves?**

- A. Aislamiento viral en cultivo
- B. Prueba de anticuerpos heterófilos
- C. Citología de linfocitos atípicos
- D. Sondas de ADN y PCR

**36. ¿Cuál es la principal complicación neurológica mencionada que puede surgir de una mononucleosis infecciosa?**

- A. Retraso mental profundo
- B. Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis
- C. Sordera unilateral
- D. Convulsiones febriles

**37. Respecto al Linfoma de Burkitt, ¿en qué población geográfica y bajo qué condición coadyuvante es endémico?**

- A. Niños en África con malaria
- B. Pacientes con SIDA en Europa
- C. Neonatos en América con CMV
- D. Adultos en Asia con carcinoma nasofaríngeo

**38. Si un paciente con mononucleosis presenta síntomas por más de 4 semanas, ¿cómo se clasifica el cuadro?**

- A. Enfermedad linfoproliferativa mortal
- B. Recidiva latente
- C. Cuadro crónico
- D. Infección lítica aguda

**39. ¿Cuál es la diferencia principal entre la infección primaria y la recidiva de CMV durante el embarazo?**

- A. Ambas tienen el mismo riesgo de malformaciones
- B. Solo la recidiva se transmite por vía ascendente
- C. La infección primaria es extremadamente grave para el feto
- D. La recidiva siempre causa microcefalia

**40. ¿Qué secreción corporal se identifica como la vía de transmisión para el VHH-6 y VHH-7?**

- A. Leche materna únicamente
- B. Sangre y derivados
- C. Orina y lágrimas
- D. Secreciones bucales (saliva y aerosoles)

**41. ¿En qué grupo de pacientes el CMV causa frecuentemente esofagitis y colitis?**

- A. Ancianos con mononucleosis
- B. Mujeres embarazadas seropositivas
- C. Niños sanos en edad escolar
- D. Pacientes con SIDA

**42. ¿Qué porcentaje de adultos suele tener presente el VHH-6 en su saliva?**

- A. La mayoría de los adultos
- B. Solo aquellos que trabajan en hospitales
- C. Menos del 10%
- D. Únicamente adultos con SIDA

**43. En el diagnóstico diferencial, ¿qué distingue a la mononucleosis por CMV de la causada por VEB?**

- A. El CMV no causa fiebre ni fatiga
- B. La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos
- C. El VEB no produce linfocitosis
- D. Solo el VEB se transmite por la saliva

**44. Respecto a las enfermedades linfoproliferativas por VEB, ¿qué ocurre en sujetos que carecen totalmente de inmunidad celular?**

- A. Desarrollan inmunidad natural permanente sin síntomas
- B. Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal
- C. El virus no puede infectarlos al no haber linfocitos T
- D. Sufren únicamente de faringitis leve recurrente

**45. ¿Cuál es la principal forma de prevenir la transmisión de la mononucleosis infecciosa?**

- A. Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos
- B. Uso de mascarillas N95 en lugares públicos

- C. Tratamiento profiláctico con aciclovir a toda la población
- D. Vacunarse anualmente durante la adolescencia

## Papilomavirus

### 1. La estructura que mejor describe al HPV es:

- A. ARN segmentado con envoltura.
- B. ADN circular bicatenario sin envoltura.
- C. ARN negativo helicoidal con envoltura.
- D. ADN monocatenario envuelto.
- E. ARN bicatenario con doble cápside.

### 2. Un virus que infecta queratinocitos del estrato espinoso y produce verrugas corresponde mejor a:

- A. Rotavirus.
- B. Rabdovirus.
- C. Citomegalovirus.
- D. Papilomavirus humano.
- E. Plasmodium.

### 3. La latencia local del HPV se relaciona principalmente con:

- A. Queratinocito infectado.
- B. Neurona de ganglio dorsal.
- C. Linfocito B de memoria.
- D. Eritroblasto medular.
- E. Hepatocito periportal.

### 4. Qué asociación entre genotipo y riesgo clínico es más adecuada?

- A. HPV 6/11 - alto riesgo cervical.
- B. HPV 1 - sarcoma de Kaposi.
- C. HPV 16/18 - cáncer cervical.
- D. HPV 2 - encefalitis necrosante.
- E. HPV 5 - paludismo grave.

### 5. El mecanismo oncogénico del HPV de alto riesgo se explica mejor por:

- A. Producción de neurotoxina salival.
- B. Destrucción de eritrocitos por merozoitos.
- C. Bloqueo de canales de sodio bacterianos.
- D. Formación de huevos en vía biliar.
- E. Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.

### 6. Un condiloma acuminado genital se asocia con más frecuencia a:

- A. Adenovirus urinario.
- B. HPV mucoso de bajo riesgo.
- C. Virus de la rabia.
- D. Toxoplasma tisular.
- E. Diphyllbothrium.

### 7. Cuál vía de adquisición es más coherente con HPV mucoso genital?

- A. Inhalación en cuevas.
- B. Picadura de Anopheles.
- C. Ingestión de berro acuático.
- D. Contacto sexual directo.
- E. Mordedura de perro.

### 8. Una razón por la cuál la infección por HPV puede persistir es que:

- A. El virus destruye siempre todo el epitelio basal en horas.
- B. El virus no infecta células humanas.
- C. La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.
- D. La replicación ocurre solo en eritrocitos circulantes.
- E. La cápside tiene envoltura muy frágil.

### 9. El método preventivo más relevante frente a lesiones malignas asociadas a HPV es:

- A. Vacunación contra tipos oncogénicos.
- B. Suero antiofídico polivalente.
- C. Cloración única del agua.
- D. Quimioprofilaxis antimalaria universal.
- E. Cinta adhesiva perianal.

### 10. En una prueba de tamizaje cervical, el hallazgo que hace pensar en infección por HPV es:

- A. Cuerpos de Negri.
- B. Células falciformes.
- C. Huevos mameleonados.
- D. Amastigotes en macrófagos.

- E. Koilocitosis.

### 11. ¿Cuál es la conformación estructural del genoma de los papilomavirus humanos?

- A. ADN lineal monocatenario
- B. ADN circular bicatenario
- C. ARN circular bicatenario
- D. ADN lineal bicatenario

### 12. ¿En qué capa específica de la piel se produce principalmente la replicación activa del VPH?

- A. Estrato córneo
- B. Hipodermis
- C. Estrato espinoso
- D. Dermis

### 13. En el diagnóstico citológico, ¿qué término describe a los queratinocitos infectados con cambios citopáticos como el citoplasma vacuolado?

- A. Células de Langerhans
- B. Células de Merkel
- C. Coilocitos
- D. Melanocitos

### 14. ¿Qué genotipos de VPH están más frecuentemente asociados con papilomas laríngicos y verrugas anogenitales benignas?

- A. VPH-6 y VPH-11
- B. VPH-1 y VPH-4
- C. VPH-31 y VPH-45
- D. VPH-16 y VPH-18

### 15. ¿Cuál es el método de elección para confirmar el genotipo específico de una infección por VPH?

- A. Inmunofluorescencia directa
- B. Citología (Papanicolaou)
- C. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- D. Cultivo vírico

### 16. ¿Qué porcentaje aproximado de las neoplasias cervicales a nivel mundial se asocian a la presencia de VPH?

- A. 30,0%
- B. 50,0%
- C. 70,0%
- D. 99,7%

### 17. En el contexto de la patogénesis del VPH, ¿cómo se define una neoplasia?

- A. Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales
- B. Infección lítica sin proliferación celular
- C. Paso previo a una alteración de la función celular
- D. Resolución espontánea de una verruga

### 18. ¿Cuál es la recomendación de frecuencia para el tamizaje con Papanicolaou (PAP) en una mujer con resultados previos negativos?

- A. Anual
- B. Una sola vez en la vida
- C. Cada 5 años
- D. Cada 6 meses

### 19. Sobre la vacuna contra el VPH, ¿cuál es una limitación fundamental mencionada en el material?

- A. No puede tratar ni curar una infección ya existente
- B. Es ineficaz si se administra antes de los 9 años
- C. Requiere una dosis única para protección de por vida
- D. Solo protege contra un único serotipo viral

### 20. ¿Qué factor de riesgo conductual se menciona como agravante para la progresión de la infección por VPH hacia el cáncer?

- A. Tabaquismo
- B. Dieta alta en grasas
- C. Consumo de alcohol
- D. Sedentarismo

### 21. ¿Cómo se conoce vulgarmente a las verrugas plantares causadas frecuentemente por el VPH?

- A. Melanoma
- B. Ojo de gallo
- C. Condiloma
- D. Pápula

### 22. ¿Qué tipos de VPH son responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo?

- A. VPH-1 y VPH-2
- B. VPH-16 y VPH-18

- C. VPH-6 y VPH-11
- D. VPH-31 y VPH-33

**23. En el desarrollo de la enfermedad por VPH, ¿qué ocurre durante la etapa de latencia?**

- A. El sistema inmunitario elimina completamente el genoma viral del organismo
- B. El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles
- C. El virus se replica masivamente destruyendo el estrato basal
- D. Las células infectadas se transforman inmediatamente en células cancerosas

**24. Además del contacto sexual, ¿qué otra vía de transmisión directa es común para las verrugas cutáneas?**

- A. Picadura de insectos
- B. Transmisión aérea (gotitas)
- C. Ingesta de alimentos contaminados
- D. Autoinoculación

**25. ¿Por qué los papilomas laríngeos representan un riesgo de muerte en la población pediátrica?**

- A. Posible obstrucción de las vías respiratorias
- B. Destrucción total de las cuerdas vocales por necrosis
- C. Inducción de fallo renal agudo
- D. Metástasis rápida hacia el cerebro

**26. ¿Cuál es la efectividad reportada de los preservativos para reducir el riesgo de contagio del VPH?**

- A. 30 al 60%
- B. 100%
- C. Menos del 5%
- D. 90 al 95%

**27. ¿Qué característica morfológica define microscópicamente a una verruga?**

- A. Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis
- B. Atrofia del estrato basal con pérdida de melanina
- C. Destrucción de los capsómeros de los queratinocitos
- D. Infiltrado masivo de neutrófilos en la dermis papilar

**28. ¿Cuál es el período de incubación (P.I.) típico para la aparición de verrugas comunes?**

- A. 10 a 15 años
- B. 24 a 48 horas
- C. Hasta 3 o 4 meses
- D. Exactamente una semana

**29. En la clasificación por localización, ¿cómo se agrupan los VPH?**

- A. Aeróbicos o anaeróbicos
- B. Cutáneos o mucosos
- C. Agudos o fulminantes
- D. Sistémicos o localizados

**30. ¿Qué tipos de cáncer son más frecuentes en hombres debido a la infección por VPH?**

- A. Cáncer de próstata y vejiga
- B. Cáncer de pene, ano y orofaringe
- C. Cáncer de testículo
- D. Cáncer de pulmón y estómago

**31. ¿Cuál es la principal razón por la que se recomienda extirpar las verrugas, a pesar de que pueden remitir espontáneamente?**

- A. Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación
- B. Porque siempre se transforman en tumores malignos si no se quitan
- C. Para permitir que la vacuna funcione después de la cirugía
- D. Para eliminar el reservorio de ARN viral de la sangre

**32. ¿Qué factor inmunológico explica que las verrugas desaparezcan por sí solas en muchos casos?**

- A. La interferencia del virus JC que compite por la célula
- B. El agotamiento natural de los capsómeros virales
- C. La falta de queratina en el estrato espinoso
- D. La respuesta inmunitaria del hospedador

**33. En el frotis de Papanicolaou, ¿qué significa el hallazgo de una Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) de grado 2?**

- A. Tejido completamente normal
- B. Displasia moderada
- C. Cáncer invasivo con metástasis
- D. Infección viral resuelta

- A. ARN negativo segmentado, con envoltura.
- B. ADN monocatenario circular, con envoltura.
- C. ARN bicatenario, cápside helicoidal.
- D. ADN bicatenario lineal, sin envoltura.
- E. ARN positivo, sin cápside.

**2. Los principales antígenos de adenovirus se relacionan con:**

- A. Hexonas, pentonas y fibras.
- B. HA, NA y proteína M2.
- C. E1, E2 y proteína NS1.
- D. Gp120, gp41 e integrasa.
- E. Esporozoito, merozoito y gametocito.

**3. La replicación del ADN adenoviral ocurre principalmente en:**

- A. Mitocondria.
- B. Citoplasma libre.
- C. Nucleo celular.
- D. Ribosoma bacteriano.
- E. Vacuola digestiva.

**4. Una infección por adenovirus puede comprometer respiratorio, digestivo, urinario y ojo. ¿Qué cuadro ocular es compatible?**

- A. Catarata congénita.
- B. Uveitis toxoplásmica obligatoria.
- C. Retinopatía hipertensiva.
- D. Glaucoma agudo.
- E. Conjuntivitis.

**5. Si se observan cuerpos de inclusión nuclear con acumulación de ADN y partículas defectuosas, el dato encaja con:**

- A. Trypanosoma.
- B. Adenovirus.
- C. Strongyloides.
- D. Fasciola.
- E. Echinococcus.

**6. A diferencia de varios virus envueltos, los adenovirus son relevantes en brotes porque:**

- A. Mueren rápidamente fuera del hospedador.
- B. Solo infectan por vía sexual.
- C. No se liberan nunca por lisis.
- D. Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.
- E. No se transmiten entre humanos.

**7. ¿Qué afirmación sobre oncogenicidad es la más fiel al material?**

- A. Todos causan cáncer cervical humano.
- B. Solo producen sarcoma de Kaposi.
- C. Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos.
- D. Son oncogénicos solo por mosquitos.
- E. Transforman eritrocitos maduros.

**8. La liberación del adenovirus desde la célula infectada se produce principalmente por:**

- A. Lisis celular.
- B. Gemación apical permanente.
- C. Exocitosis de oocistos.
- D. Salida por huevo embrionado.
- E. Fagocitosis inversa.

**9. Una infección latente por adenovirus puede persistir en:**

- A. Eritrocitos circulantes.
- B. Ganglios sensitivos exclusivamente.
- C. Macrófagos hepáticos obligados.
- D. Neumocitos sin núcleo.
- E. Células linfoides y adenoides.

**10. En una epidemia de faringoconjuntivitis con piscina y conjuntivitis, ¿qué dato apoya adenovirus?**

- A. Protozoo flagelado transmitido por vinchuca.
- B. Virus ADN sin envoltura resistente.
- C. Helminto con caracol intermediario.
- D. Virus ARN con transcriptasa inversa.
- E. Cestodo por pescado crudo.

**11. ¿En qué tipo de cultivo celular se identificaron originalmente los adenovirus, lo que dio lugar a su nombre?**

- A. Células de adenoides
- B. Linfocitos T CD4+
- C. Células epiteliales conjuntivales
- D. Enterocitos del intestino delgado

**12. ¿Cuál es la configuración estructural característica del genoma de los adenovirus?**

- A. ADN monocatenario lineal

## Adenovirus

**1. La descripción estructural más correcta para adenovirus es:**



- B. ADN bicatenario circular
- C. ARN monocatenario de sentido positivo
- D. ADN bicatenario lineal

**13. ¿En qué compartimento celular tiene lugar la replicación del ADN vírico de los adenovirus?**

- A. Citoplasma
- B. Ribosomas
- C. Retículo endoplásmico
- D. Núcleo

**14. ¿Qué componentes estructurales constituyen los principales antígenos de los adenovirus?**

- A. Polimerasa de ADN y helicasa
- B. Hexonas, pentonas y fibras
- C. Glucoproteínas de envoltura
- D. Proteína de matriz y nucleocápside

**15. ¿Cuál es la causa histológica de la formación de cuerpos de inclusión nuclear en células infectadas por adenovirus?**

- A. Fusión de membranas celulares para formar sincitios
- B. Aumento masivo del tamaño celular (citomegalia)
- C. Degradación del nucleolo por enzimas víricas
- D. Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces

**16. ¿Qué tipo de infección establecen los adenovirus en las células linfoides y adenoides?**

- A. Infección lítica
- B. Infección latente
- C. Infección transformadora
- D. Infección persistente productiva

**17. Respecto a la inmunidad contra los adenovirus, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- A. La inmunidad humoral es el único mecanismo para evitar la proliferación viral
- B. Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original
- C. La infección previa garantiza inmunidad permanente contra todas las enfermedades respiratorias virales
- D. Existe protección cruzada universal entre los 52 serotipos humanos

**18. ¿Qué característica de los adenovirus les permite transmitirse a través de piscinas con cloración inadecuada?**

- A. Presencia de una envoltura lipídica protectora
- B. Termolabilidad extrema que favorece el contagio en agua templada
- C. Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve
- D. Capacidad de replicación en ambientes acuáticos salinos

**19. ¿Cuáles son los serotipos de adenovirus más frecuentemente asociados con infecciones pediátricas de las vías respiratorias?**

- A. Tipos 1, 2, 5 y 6
- B. Tipos 40 y 41
- C. Tipos 8, 19 y 37
- D. Tipos 4, 7 y 21

**20. ¿Qué serotipos de adenovirus se propagan con mayor facilidad en entornos militares debido al hacinamiento y estilo de vida riguroso?**

- A. Tipos 1 y 2
- B. Tipos 11 y 21
- C. Tipos 40 y 41
- D. Tipos 4 y 7

**21. Un paciente presenta la tríada de faringitis, conjuntivitis y fiebre. ¿Qué cuadro clínico es el más probable?**

- A. Síndrome de tipo tos ferina
- B. Fiebre faringoconjuntival
- C. Enfermedad respiratoria aguda
- D. Queratoconjuntivitis epidémica

**22. ¿Cuál es la principal diferencia clínica entre la conjuntivitis y la queratoconjuntivitis por adenovirus?**

- A. La presencia de fiebre en la conjuntivitis
- B. La edad del paciente, afectando la queratoconjuntivitis solo a lactantes
- C. La vía de transmisión, que es solo fecal-oral en la conjuntivitis
- D. La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis

**23. ¿Qué serotipos de adenovirus se clasifican en el grupo F y son responsables de diarrea en lactantes?**

- A. Serotipos 3, 4 y 7
- B. Serotipos 40 y 41
- C. Serotipos 11 y 21
- D. Serotipos 1, 2 y 5

**24. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación clínica de los adenovirus en el aparato urinario?**

- A. Insuficiencia renal aguda obstructiva
- B. Cistitis hemorrágica aguda
- C. Sepsis urinaria por Gram negativos
- D. Glomerulonefritis post-infecciosa

**25. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo de la infección por adenovirus en el laboratorio?**

- A. Cultivo en agar sangre y chocolate
- B. PCR y análisis de sondas de ADN
- C. Observación microscópica de las secreciones
- D. Prueba de la tuberculina (PPD)

**26. En cuanto al tratamiento de las infecciones por adenovirus, ¿cuál es la recomendación actual?**

- A. No existe un tratamiento específico aprobado
- B. Uso de antibióticos de amplio espectro de forma profiláctica
- C. Terapia de reemplazo enzimático nuclear
- D. Administración inmediata de aciclovir oral

**27. ¿Qué medida de prevención es fundamental para controlar la propagación de adenovirus en instalaciones recreativas?**

- A. Cloración adecuada de las piscinas
- B. Vacunación universal de la población civil
- C. Uso de mascarillas N95 en todas las áreas
- D. Hervir el agua de las piscinas antes de cada uso

**28. ¿Para qué población está disponible la vacuna oral contra los tipos 4 y 7 de adenovirus?**

- A. Adultos mayores inmunodeprimidos
- B. Personal militar
- C. Lactantes y niños pequeños
- D. Pacientes con cáncer de colon

**29. ¿Cuál es un uso terapéutico moderno de los adenovirus mencionado en el material?**

- A. Desinfección de superficies hospitalarias
- B. Tratamiento antibiótico para la tuberculosis
- C. Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19
- D. Producción de insulina recombinante en el páncreas

**30. ¿En qué momento se inicia la transcripción genética tardía durante el ciclo de replicación de los adenovirus?**

- A. Antes de que se sintetice la polimerasa de ADN
- B. Inmediatamente después de la entrada del virus a la célula
- C. Cuando ha finalizado la replicación del ADN
- D. Simultáneamente con la lisis celular

**31. ¿Cómo se liberan los viriones de adenovirus de la célula infectada?**

- A. Exocitosis mediante vesículas de transporte
- B. Paso directo a través de poros nucleares
- C. Lisis celular
- D. Gemación a través de la membrana plasmática

## Parvovirus y Poxvirus

**1. Parvovirus B19 se distingue estructuralmente porque es:**

- A. ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.
- B. ARN segmentado negativo, envuelto.
- C. ADN bicatenario gigante, envuelto.
- D. ARN positivo helicoidal, sin cápside.
- E. ADN circular con transcriptasa inversa.

**2. El tropismo central del parvovirus B19 explica que destruya principalmente:**

- A. Neurona de ganglio dorsal.
- B. Hepatocito adulto.
- C. Células precursoras eritroides.
- D. Queratinocito cornificado.
- E. Enterocito ciliado.

**3. Un paciente con anemia hemolítica crónica desarrolla aplasia transitoria intensa. Qué virus debe considerarse?**

- A. Adenovirus ocular.
- B. Virus rubéola.
- C. VHH-8.
- D. Rinovirus.
- E. Parvovirus B19.

**4. En la evolución bifásica por B19, el exantema y la artralgia suelen ser:**

- A. Fase de máxima contagiosidad respiratoria.
- B. Mediados por respuesta inmunitaria.
- C. Debidos a larvas pulmonares.
- D. Secuela de infección por poxvirus.
- E. Resultado de huevos en bilis.

**5. Durante la primera fase de B19, la contagiosidad se relaciona con:**

- A. Quistes en heces formadas.
- B. Metacercarias en vegetales.
- C. Mordedura de murciélago.
- D. Viremia y secreciones respiratorias.
- E. Proglotides en heces.

**6. En embarazada, B19 preocupa porque puede provocar:**

- A. Condiloma acuminado fetal.
- B. Hidrofobia neonatal.
- C. Hidropesía fetal por anemia.
- D. Megacolon congénito.
- E. Quiste hidatídico pulmonar.

**7. Una diferencia importante de poxvirus frente a muchos virus ADN es que:**

- A. Replica en el citoplasma.
- B. No posee ningún genoma.
- C. Necesita eritrocitos maduros.
- D. Es siempre no envuelto.
- E. Solo se transmite por alimentos.

**8. Los poxvirus se reconocen como virus:**

- A. Pequeños, desnudos y de ARN positivo.
- B. Helicoidales en forma de bala.
- C. Segmentados con neuraminidasa.
- D. Flagelados con cinetoplasto.
- E. Grandes, complejos y de ADN bicatenario.

**9. La vacuna histórica que permitió controlar la viruela se relaciona con:**

- A. Rotavirus.
- B. Vaccinia.
- C. VEB.
- D. Toxoplasma.
- E. Schistosoma.

**10. Molluscum contagiosum se debe ubicar dentro del grupo de:**

- A. Parvovirus.
- B. Flavivirus.
- C. Cestodos.
- D. Poxvirus.
- E. Trematodos.

**11. ¿Cuál es la característica estructural distintiva que define a los parvovirus dentro de los virus de ADN?**

- A. Su replicación es exclusivamente citoplasmática.
- B. Presentan una cápside icosaédrica con envoltura lipídica.
- C. Poseen un genoma de ADN bicatenario circular.
- D. Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal.

**12. Durante el ciclo de replicación del parvovirus B19, ¿qué paso es indispensable para que ocurra la transcripción y replicación del genoma vírico?**

- A. La integración del genoma vírico en el ADN celular.
- B. La formación de un intermediario de ARN de polaridad negativa.
- C. La salida del núcleo hacia el citoplasma para el ensamblaje del virión.
- D. La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario.

**13. En la evolución bifásica de la infección por B19, ¿cuál es el evento fisiopatológico central de la primera fase (fase febril)?**

- A. La aparición del exantema en 'mejilla abofeteada' por inmunocomplejos.
- B. El desarrollo de poliartritis crónica en pacientes pediátricos.
- C. La producción masiva de anticuerpos IgG específicos.
- D. Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides.

**14. ¿Por qué un paciente con eritema infeccioso (quinta enfermedad) ya no se considera contagioso al momento de aparecer el exantema?**

- A. Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia.
- B. Porque el descenso de la hemoglobina impide la replicación viral.
- C. Porque el virus ha mutado a una forma no patógena.
- D. Porque el virus solo se transmite a través de las costras del exantema.

**15. En adultos infectados por parvovirus B19, ¿cuál es la manifestación clínica que predomina sobre el exantema cutáneo?**

- A. Crisis aplásica aguda de forma universal.
- B. Bronquiolitis grave y dificultad respiratoria.
- C. Formación de nódulos umbilicados en los genitales.
- D. Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses.

**16. ¿Cuál es la complicación más grave de la infección por parvovirus B19 en pacientes con anemia hemolítica crónica?**

- A. Desarrollo de malformaciones congénitas cardíacas.
- B. Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios.
- C. Insuficiencia hepática fulminante por viremia secundaria.
- D. Eritema infeccioso recidivante.

**17. ¿Qué riesgo enfrentan las mujeres embarazadas seronegativas ante una infección por parvovirus B19?**

- A. Ninguno, ya que el virus no atraviesa la placenta.
- B. Desarrollo inmediato de molusco contagioso gestacional.
- C. Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal).
- D. Transmisión de inmunidad pasiva al feto sin riesgos asociados.

**18. ¿Cuál es la principal diferencia epidemiológica entre el parvovirus B19 y el bocavirus?**

- A. El B19 afecta a animales domésticos y el bocavirus solo a humanos.
- B. El B19 tiene vacuna disponible y el bocavirus no.
- C. El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces.
- D. El B19 es un virus de ARN y el bocavirus es de ADN.

**19. Respecto a los poxvirus, ¿cuál es el sitio celular donde completan su ciclo de replicación, a diferencia de la mayoría de los virus de ADN?**

- A. En el citoplasma.
- B. En la membrana plasmática.
- C. En el nucleolo celular.
- D. En las mitocondrias.

**20. En la patogenia de la viruela humana, ¿qué evento sigue a la viremia secundaria?**

- A. La desaparición inmediata de los síntomas sistémicos.
- B. La erupción de pústulas características en la piel y mucosas.
- C. La inmunización automática contra el parvovirus B19.
- D. La formación de inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de Molluscum.

**21. ¿Cuál es el reservorio natural de la viruela del mono (Mpox) y cómo se clasifica su transmisión al ser humano?**

- A. Es un producto de laboratorio usado para vacunas.
- B. Su reservorio son las aves migratorias y es una infección vectorial.
- C. Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis.
- D. Es un virus exclusivo de humanos transmitido por el aire.

**22. ¿Cuál es la morfología característica de las lesiones producidas por el virus del Molusco Contagioso?**

- A. Exantema maculopapular difuso en 'encaje'.
- B. Vesículas transparentes que siguen el trayecto de un nervio.
- C. Pústulas hemorrágicas que dejan cicatrices profundas.
- D. Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central.

**23. En el diagnóstico de laboratorio del molusco contagioso, ¿qué hallazgo histopatológico es determinante?**

- A. Presencia de grandes inclusiones citoplásmicas eosinofílicas (cuerpos de Molluscum).
- B. Presencia de anticuerpos IgM contra el antígeno eritrocitario P.
- C. Aislamiento de linfocitos CD4 bajos en sangre periférica.
- D. Detección de ADN monocatenario mediante PCR.

**24. ¿Cómo se transmiten comúnmente las zoonosis por poxvirus como el Orf y la viruela bovina?**

- A. Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas).
- B. Por la picadura de garrapatas infectadas.
- C. A través del consumo de leche no pasteurizada.
- D. Por inhalación de polvo contaminado en establos.

**25. Un niño de 18 meses presenta bronquiolitis y síntomas de infección respiratoria grave. Se detecta un parvovirus en sus secreciones. ¿Cuál es el agente más probable?**

- A. Virus del Molusco Contagioso.
- B. Virus Orf.
- C. Bocavirus.
- D. Parvovirus B19.



**26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prevención del parvovirus humano es correcta según el material?**

- A. La vacunación sistemática en la infancia es el método principal.
- B. El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación.
- C. El uso de preservativos garantiza la eliminación del riesgo de contagio de B19.
- D. Las vacunas para perros y gatos protegen también a los humanos.

**27. ¿Qué factor puede exacerbar o provocar la recurrencia del exantema en la quinta enfermedad durante varias semanas?**

- A. El tratamiento con antibióticos de amplio espectro.
- B. La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico.
- C. El consumo de alimentos ácidos.
- D. La reinfección inmediata por el mismo serotipo del virus.

**28. En el contexto de la viruela del mono (Mpox), ¿cuándo se considera que una persona deja de ser infecciosa?**

- A. A los 5 días de iniciado el tratamiento con Cidofovir.
- B. Inmediatamente después de recibir la vacuna post-exposición.
- C. Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo.
- D. En cuanto desaparece la fiebre inicial.

**29. ¿Cuál es la causa del exantema y la artralgia en la segunda fase de la infección por parvovirus B19?**

- A. La toxicidad sistémica por la liberación de hemoglobina fetal.
- B. La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.
- C. Una sobreinfección bacteriana oportunista en la piel.
- D. La replicación viral directa en los sinoviocitos y queratinocitos.

**30. De acuerdo con la clasificación de los poxvirus, ¿cuál de ellos se asocia con el 'Nódulo del Milker'?**

- A. Virus Vaccinia.
- B. Virus de la estomatitis papulosa bovina.
- C. Seudoviruela bovina.
- D. Viruela de Tana.

**31. En el caso clínico presentado, ¿por qué la madre presentaba cansancio y dolor articular mientras la hija solo tenía el exantema facial?**

- A. Porque la madre padecía una enfermedad autoinmune no relacionada.
- B. Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños).
- C. Porque el virus B19 muta al pasar de niño a adulto.
- D. Porque la madre estaba en la fase infecciosa y la hija en la fase prodrómica.

**32. ¿Qué característica genómica comparten los virus de las familias Parvoviridae y Poxviridae según el material?**

- A. Ambos son virus con genoma de ADN monocatenario.
- B. Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN.
- C. Ambos requieren una enzima retrotranscriptasa para replicarse.
- D. Ambos poseen genomas de ADN de gran tamaño.

**33. ¿Cómo se pueden eliminar físicamente los nódulos del molusco contagioso para acelerar la curación?**

- A. Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo.
- B. Mediante la aplicación de ungüentos antibióticos potentes.
- C. Aspiración con aguja fina del contenido caseoso.
- D. Exposición prolongada a la luz ultravioleta.

**34. ¿Cuál es la tasa de mortalidad aproximada asociada a la Viruela Mayor?**

- A. Entre el 15% y el 40%.
- B. Exactamente el 50% debido a la respuesta inmunitaria.
- C. Menos del 1%.
- D. Casi del 100% en todos los casos.

**35. ¿Qué síntoma inicial e inespecífico caracteriza el 'periodo prodrómico' del parvovirus B19?**

- A. Anemia hemolítica súbita en pacientes sanos.
- B. Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.
- C. Descamación severa de las palmas de las manos.
- D. Cefalea intensa y lumbalgia de tipo pustuloso.

**36. ¿En qué región anatómica suele aparecer primero el exantema de la viruela antes de extenderse al resto del cuerpo?**

- A. En el área genital únicamente.
- B. Exclusivamente en las mejillas.
- C. En las plantas de los pies.
- D. En la cavidad bucal.

**37. En pacientes inmunodeprimidos, ¿qué curso suele tomar la infección por parvovirus B19?**

- A. Transformación maligna de los precursores eritroides (leucemia).
- B. Infección latente en las neuronas sensitivas.
- C. Resolución acelerada por hiperactividad inmune.
- D. Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia.

**38. ¿Qué característica del genoma de los parvovirus hace que su replicación sea dependiente de la fase S del ciclo celular de la célula huésped?**

- A. Su gran tamaño requiere mucha energía mitocondrial.
- B. La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división.
- C. La presencia de una envoltura que se disuelve con el huso mitótico.
- D. Su capacidad para inducir apoptosis en células en reposo.

## Picornavirus

**1. La descripción más correcta de los picornavirus es:**

- A. ARN negativo segmentado, cápside helicoidal y envoltura.
- B. ADN bicatenario lineal, fibras y pentonas.
- C. ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.
- D. ADN monocatenario, eritrotropo y envuelto.
- E. ARN bicatenario con transcriptasa inversa.

**2. Los enterovirus, aunque se transmiten por vía fecal-oral, normalmente:**

- A. Se destruyen siempre en el estómago.
- B. Requieren picadura de mosquito.
- C. Solo infectan el ojo.
- D. Tienen envoltura muy frágil.
- E. No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.

**3. Qué propiedad favorece la transmisión fecal-oral de enterovirus?**

- A. Labilidad extrema a pH neutro.
- B. Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.
- C. Necesidad de vector biológico.
- D. Latencia en ganglios sensitivos.
- E. Replicación solo nuclear.

**4. Los rinovirus se diferencian de los enterovirus porque:**

- A. Son virus ADN envueltos.
- B. Se transmiten por heces de felinos.
- C. Producen huevos en vías biliares.
- D. Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 °C.
- E. Tienen fase de trofozoito.

**5. El poliovirus puede producir parálisis porque afecta principalmente:**

- A. Linfocitos B de amígdala.
- B. Células precursoras eritroides.
- C. Neuronas motoras del asta anterior.
- D. Conductos biliares intrahepáticos.
- E. Queratinocitos del estrato córneo.

**6. Coxsackie A se vincula clásicamente con:**

- A. Herpangina y mano-pie-boca.
- B. Rabia paralítica.
- C. Sarcoma de Kaposi.
- D. Fasciolosis hepática.
- E. Neurocisticercosis.

**7. Coxsackie B debe recordarse por su relación con:**

- A. Verrugas plantares.
- B. Hidatidosis pulmonar.
- C. Paludismo terciario.
- D. Leishmaniasis visceral.
- E. Miocarditis y pleurodinia.

**8. En picornavirus, la replicación ocurre principalmente en:**

- A. Núcleo con inclusión grande.
- B. Citoplasma de la célula.
- C. Mitocondria exclusivamente.
- D. Eritrocito sin núcleo.
- E. Intestino del mosquito.

**9. Un cuadro de meningitis aseptica en verano por virus pequeño ARN positivo puede relacionarse con:**

- A. Poxvirus.
- B. Toxoplasma.
- C. Fasciola.
- D. Enterovirus.

E. Bothrops.

**10. La prevención de poliomieltis se basa principalmente en:**

- A. Vacunación.
- B. Suero antiofídico.
- C. Antibiótico betalactámico.
- D. Desparasitación canina única.
- E. Cocción de pescado.

**11. En términos de estabilidad ambiental, ¿qué diferencia fundamental existe entre los Rinovirus y los Enterovirus?**

- A. Los Enterovirus se inactivan rápidamente a temperatura ambiente, a diferencia de los Rinovirus.
- B. Los Rinovirus son lábiles al pH ácido, mientras que los Enterovirus son resistentes a un rango de pH de 3 a 9.
- C. Los Enterovirus requieren temperaturas de 33 grados C para replicarse, mientras que los Rinovirus prefieren los 37 grados C.
- D. Los Rinovirus son resistentes a los detergentes y solventes orgánicos, pero los Enterovirus no.

**12. ¿Por qué el nombre 'Enterovirus' se considera paradójico en relación con la patología que provocan habitualmente?**

- A. Porque normalmente no provocan enfermedades entéricas, a pesar de transmitirse por vía fecal-oral.
- B. Porque su replicación principal ocurre en los pulmones antes de migrar al tejido diana.
- C. Porque son los únicos virus que requieren de la bilis para activar su cápside infectante.
- D. Porque solo infectan el sistema nervioso central y nunca entran en contacto con el intestino.

**13. Durante la patogenia de una infección por Enterovirus, ¿qué evento precede inmediatamente a la aparición de los síntomas clínicos?**

- A. La viremia secundaria que distribuye el virus al tejido diana.
- B. La inhibición total de la replicación por anticuerpos humorales.
- C. La eliminación masiva del virus únicamente a través de las secreciones orales.
- D. La formación de lesiones vesiculares en la mucosa orofaríngea exclusivamente.

**14. ¿Qué porcentaje aproximado de las infecciones por Poliovirus resultan en una enfermedad asintomática?**

- A. 90%
- B. 10%
- C. 50%
- D. 1%

**15. ¿Cuál es el serotipo de Poliovirus responsable del 85% de los casos de poliomieltis paralítica?**

- A. Tipo 1
- B. Tipo 2
- C. Tipo 4
- D. Tipo 3

**16. La poliomieltis paralítica se caracteriza clínicamente por presentar:**

- A. Rigidez de nuca persistente que evoluciona a coma profundo en 24 horas.
- B. Debilidad muscular progresiva que siempre comienza en los músculos craneales.
- C. Parálisis espástica simétrica con pérdida total de la sensibilidad térmica.
- D. Parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial.

**17. En el contexto de las infecciones por Coxsackievirus, ¿cuál es la principal diferencia clínica entre los grupos A y B?**

- A. Solo el grupo B es capaz de causar meningitis aséptica en adultos.
- B. El grupo A se asocia frecuentemente con lesiones vesiculares, mientras que el grupo B causa miocarditis y pleurodinia.
- C. El grupo B produce únicamente infecciones respiratorias, mientras que el grupo A afecta al hígado.
- D. El grupo A es transmitido por mosquitos, a diferencia del grupo B que es fecal-oral.

**18. ¿Qué cuadro clínico se caracteriza por fiebre, faringitis y lesiones vesiculares en el paladar blando y la úvula?**

- A. Enfermedad de manos, pies y boca
- B. Meningitis aséptica
- C. Herpangina
- D. Pleurodinia

**19. La pleurodinia, también conocida como 'abrazo del diablo', es causada predominantemente por:**

- A. Poliovirus tipo 1

- B. Coxsackievirus grupo B
- C. Rinovirus humano
- D. Echovirus 11

**20. ¿Cuál es el agente causal más frecuentemente asociado con la meningitis vírica por Echovirus mencionada en el material?**

- A. Poliovirus tipo 2
- B. Coxsackie A16
- C. Echovirus 11
- D. Echovirus 7

**21. Para el diagnóstico de laboratorio de poliomieltis, ¿cuál es la muestra clínica donde el virus se detecta con mayor dificultad?**

- A. Faringe
- B. Heces
- C. Líquido cefalorraquídeo (LCR)
- D. Sangre

**22. En la actualidad, ¿por qué se prefiere el uso de la Vacuna de Poliomieltis Inactivada (VPI) sobre la Oral (VPO)?**

- A. Porque es más económica y fácil de administrar en campañas masivas.
- B. Porque genera una mayor producción de anticuerpos secretorios (IgA) en el intestino.
- C. Debido a su mejor perfil de seguridad al eliminar el riesgo de poliomieltis asociada a la vacuna.
- D. Porque induce una inmunidad de por vida con una sola dosis.

**23. ¿Cuál es uno de los inconvenientes significativos de la Vacuna de la Poliomieltis Oral (VPO) mencionado en el material?**

- A. Incapacidad absoluta para generar inmunidad de grupo.
- B. Es el único tipo de vacuna que se inactiva por la luz solar.
- C. Necesidad estricta de jeringuillas y agujas esterilizadas para su uso.
- D. Riesgo de diseminación del virus atenuado a personas próximas no vacunadas.

**24. ¿Qué factor ambiental favorece la replicación de los Rinovirus en el cuerpo humano?**

- A. La alta acidez del tracto gastrointestinal.
- B. La presencia de enzimas proteolíticas en el páncreas.
- C. La temperatura de 33 grados C de las vías respiratorias superiores.
- D. Un ambiente con baja humedad y alta concentración de CO<sub>2</sub>.

**25. ¿Cuál es la medida de prevención más eficaz recomendada para evitar la propagación de los Rinovirus?**

- A. Inhalación de aire seco y frío para reducir la carga viral.
- B. Uso de antibióticos profilácticos durante el invierno.
- C. Lavado de manos frecuente y desinfección de objetos contaminados.
- D. Administración de la vacuna anual polivalente.

**26. El periodo de incubación general mencionado para los Enterovirus varía entre:**

- A. 24 y 48 horas.
- B. Exactamente 14 días en todos los casos.
- C. 3 y 6 meses.
- D. 1 y 35 días.

**27. ¿Qué determina la extensión de la parálisis en un paciente con poliomieltis paralítica?**

- A. La localización y el número de neuronas motoras destruidas por el virus.
- B. La cantidad de virus eliminada a través de las heces.
- C. La presencia de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo.
- D. La velocidad de la viremia primaria inicial.

**28. ¿Cuál es el tiempo de recuperación promedio mencionado para los casos de poliomieltis que no resultan en muerte?**

- A. 6 meses a 2 años.
- B. 30 días exactos.
- C. 1 a 2 semanas.
- D. Más de 10 años.

**29. En neonatos, las infecciones por Coxsackievirus grupo B son especialmente graves debido a que pueden provocar:**

- A. Sordera permanente por destrucción del nervio auditivo.
- B. Fiebre e insuficiencia cardíaca.
- C. Diabetes insulín dependiente de inicio súbito.
- D. Ceguera por conjuntivitis hemorrágica.

**30. ¿Cuál es la función principal de la técnica de RT-PCR en el diagnóstico de meningitis por Enterovirus?**

- A. Sustituir por completo a la vacunación como medida de salud pública.
- B. Distinguir rápidamente una meningitis por Enterovirus de una meningitis bacteriana.
- C. Determinar la resistencia del virus al cloro en aguas residuales.

D. Cuantificar la cantidad de bilis presente en el estómago del paciente.

**31. ¿Verdadero o Falso? Los Enterovirus son conocidos por causar frecuentemente diarreas profusas en niños pequeños.**

- A. Verdadero
- B. Falso

**32. ¿Qué género de la familia Picornaviridae incluye al virus de la Hepatitis A?**

- A. Hepatovirus
- B. Enterovirus
- C. Aphthovirus
- D. Cardiovirus

**33. Sobre la replicación viral de los Picornavirus, se puede afirmar que:**

- A. El virus se replica íntegramente en el citoplasma de la célula huésped.
- B. Utilizan el núcleo celular para la síntesis de sus proteínas de cápside.
- C. Requieren integrar su genoma en el ADN celular mediante una retrotranscriptasa.
- D. La replicación ocurre exclusivamente dentro de las mitocondrias para obtener energía.

**34. La enfermedad de manos, pies y boca se asocia específicamente con el serotipo:**

- A. Coxsackie A16
- B. Poliovirus tipo 1
- C. Coxsackie B5
- D. Echovirus 11

## Orthomixovirus y Reovirus

**1. La estructura de influenza A y B incluye:**

- A. ADN circular sin envoltura.
- B. Un solo ADN monocatenario.
- C. ARN positivo no segmentado.
- D. Capsidom desnuda con espículas ausentes.
- E. Ocho segmentos de ARN y envoltura.

**2. El cambio antigenico menor por mutacion en influenza A y B se denomina:**

- A. Salto antigenico.
- B. Deriva antigenica.
- C. Latencia ganglionar.
- D. Excistacion.
- E. Autoinfección.

**3. El cambio mayor por reorganizacion de segmentos ocurre sobre todo en:**

- A. Influenza C.
- B. Rinovirus.
- C. Parvovirus B19.
- D. Influenza A.
- E. VHH-6.

**4. Qué glicoproteinas son los antigenos principales de influenza?**

- A. Gp120 y gp41.
- B. E1 y E2 del HPV.
- C. Hemaglutinina y neuraminidasa.
- D. Hexona y pentona.
- E. VP1 y VP2 de parvovirus.

**5. La neuraminidasa facilita principalmente:**

- A. Liberacion de nuevos viriones.
- B. Entrada por retrotranscripcion.
- C. Conversion de quiste a trofozoito.
- D. Penetracion larvaria cutanea.
- E. Produccion de huevos operculados.

**6. El genoma segmentado de influenza facilita pandemias porque permite:**

- A. Fijacion irreversible de un solo subtipo.
- B. Ausencia de variabilidad genetica.
- C. Transformacion en bacteria.
- D. Multiplicacion sin células.
- E. Reorganizacion entre cepas humanas y animales.

**7. Un diagnóstico molecular temprano de influenza se apoya mejor en:**

- A. Cinta adhesiva perianal.
- B. RT-PCR de muestra respiratoria.
- C. Gota gruesa hepática.
- D. Biopsia de piel para huevos.

E. Hemocultivo micológico.

**8. Los reovirus/rotavirus se caracterizan por:**

- A. ADN monocatenario envuelto.
- B. ARN negativo con forma de bala.
- C. Protozoo flagelado con quiste.
- D. ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.
- E. Cestodo de varios metros.

**9. Rotavirus produce diarrea especialmente por:**

- A. Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.
- B. Invasion de vías biliares por adultos.
- C. Necrosis de neuronas del asta anterior.
- D. Quistes tisulares en musculo.
- E. Toxina de veneno crotalico.

**10. La prevencion especifica más importante frente a rotavirus grave en lactantes es:**

- A. Antiveneno equino.
- B. Vacuna HPV.
- C. Vacunacion oral.
- D. Coccion de pescado.
- E. Uso de preservativo exclusivo.

**11. ¿Cuál es la principal diferencia estructural en el genoma segmentado entre los virus de la gripe A y B comparados con el virus de la gripe C?**

- A. Los virus A y B poseen 7 segmentos de ARN, mientras que el C posee 8.
- B. El virus de la gripe C no posee genoma segmentado, a diferencia de A y B.
- C. Los virus A y B poseen 8 segmentos de ARN, mientras que el C posee 7.
- D. Los virus A y B poseen genoma bicatenario, mientras que el C es monocatenario.

**12. ¿Qué proceso es responsable de la aparición de pandemias de gripe y a qué tipo de virus afecta exclusivamente?**

- A. La reorganización genómica en el virus de la gripe B.
- B. El salto antigénico (reorganización) en el virus de la gripe A.
- C. La deriva antigénica (mutación) en los virus de la gripe A y B.
- D. La mutación puntual en la proteína M2 del virus de la gripe A.

**13. ¿En qué parte de la célula hospedadora ocurre la transcripción y replicación del genoma del virus de la gripe, a diferencia de la mayoría de los virus ARN?**

- A. Núcleo.
- B. Citoplasma.
- C. Aparato de Golgi.
- D. Retículo endoplásmico.

**14. ¿Cuál es la función principal de la Hemaglutinina (HA) en el ciclo de infección del virus de la gripe?**

- A. Escindir el ácido siálico para permitir la liberación de los viriones.
- B. Formar un canal de protones para la pérdida de la envoltura.
- C. Actuar como la polimerasa principal para la síntesis de ARNm.
- D. Unirse a receptores de ácido siálico y facilitar la fusión de membranas.

**15. En el contexto de la patogenia de la gripe, ¿qué moléculas son responsables de los síntomas sistémicos pseudogripales como fiebre, mialgias y cefalea?**

- A. La destrucción directa de las células alveolares.
- B. La viremia persistente en sangre periférica.
- C. La presencia de anticuerpos IgG en la mucosa.
- D. Respuestas de interferón y citocinas.

**16. ¿Cuál es la recomendación principal respecto a la vacuna de la gripe en pacientes con alergia grave al huevo?**

- A. Deben recibir únicamente la vacuna de virus vivos atenuados.
- B. La alergia al huevo no tiene relación con la vacunación antigripal.
- C. No deben recibir la vacuna convencional, aunque existen alternativas sin proteínas de huevo.
- D. Pueden vacunarse sin restricciones si son mayores de 50 años.

**17. ¿Cuál es la característica estructural distintiva de la familia Reoviridae, como Rotavirus?**

- A. ARN monocatenario segmentado con envoltura derivativa.
- B. ARN monocatenario positivo con envoltura lipídica.
- C. ARN bicatenario segmentado y carencia de envoltura.
- D. ADN bicatenario circular con cápside pleomorfa.

**18. ¿Qué cambio estructural debe sufrir el Rotavirus en el tubo digestivo para volverse infeccioso?**

- A. Fusión inmediata con la membrana plasmática del estómago.
- B. Adquisición de una envoltura lipídica a partir de los enterocitos.

- C. Proteólisis de la cápside externa para formar una partícula subviral intermedia.
- D. Pérdida total de la cápside interna antes de la penetración.

**19. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal por el cual el Rotavirus causa diarrea líquida?**

- A. Invasión de la mucosa colónica con producción de moco y sangre.
- B. Inducción de una respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis fecal.
- C. Atrofia y aplanamiento de las microvellosidades del intestino delgado.
- D. Bloqueo irreversible de los receptores de HA en el epitelio respiratorio.

**20. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar una infección por Rotavirus debido a su sensibilidad?**

- A. Observación directa de corpúsculos de Negri.
- B. Cultivo en agar sangre a 37 grados C.
- C. PCR.
- D. Hemaglutinación indirecta de suero pareado.

**21. ¿Qué complicación neurológica se asocia con parálisis y debilidad muscular tras una infección por gripe?**

- A. Encefalitis espongiiforme.
- B. Meningitis bacteriana secundaria.
- C. Síndrome de Guillain-Barré.
- D. Síndrome de Reye.

**22. ¿Por qué el virus de la gripe B no causa pandemias globales como el virus de la gripe A?**

- A. Porque es destruido rápidamente por el pH gástrico.
- B. Porque carece de Hemaglutinina en su superficie.
- C. Porque su genoma no está segmentado.
- D. Porque no experimenta saltos antigénicos por no infectar animales comúnmente.

**23. ¿Cuál es el periodo de incubación habitual para el virus de la gripe?**

- A. 7 a 14 días.
- B. 2 a 4 semanas.
- C. Menos de 12 horas.
- D. 1 a 4 días.

**24. ¿Qué característica del virus de la gripe A permite la clasificación de cepas como H3N2?**

- A. El número de segmentos de ARN en el núcleo.
- B. El tipo de polimerasa PB1 que utiliza el virión.
- C. Las variantes de las glucoproteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa.
- D. La ciudad donde se aisló el virus por primera vez.

**25. En la replicación del virus de la gripe, ¿cómo abandona la nueva partícula vírica la célula hospedadora?**

- A. Por lisis celular explosiva.
- B. Mediante exocitosis a través de vacuolas del aparato de Golgi.
- C. Por gemación a través de la membrana plasmática.
- D. A través de puentes intercelulares o nanotubos.

**26. ¿Cuál es la función de la proteína M1 en la estructura del virión de la gripe?**

- A. Degrada el moco respiratorio para alcanzar el epitelio.
- B. Es la encargada de la transcripción del ARN viral.
- C. Actúa como un canal iónico para acidificar el virión.
- D. Reviste el interior de la envoltura y favorece el ensamblaje.

**27. ¿Qué grupo de edad es el más afectado sintómicamente por las infecciones de Rotavirus?**

- A. Recién nacidos en sus primeras 24 horas de vida.
- B. Ancianos mayores de 65 años.
- C. Adolescentes y adultos jóvenes.
- D. Lactantes y niños pequeños.

**28. ¿Cómo se transmite principalmente el Rotavirus en guarderías y entornos preescolares?**

- A. Gotitas de moco de Pflügge.
- B. Vía fecal-oral.
- C. Picadura de mosquitos Aedes aegypti.
- D. Contacto directo con sangre infectada.

**29. En el virus de la gripe, ¿qué evento ocurre cada 2 a 3 años causando brotes locales y se debe a mutaciones puntuales?**

- A. Reorganización triple.
- B. Inhibición por interferón.
- C. Salto antigénico.
- D. Deriva antigénica.

**30. ¿Cuál es la función de la proteína vírica NSP4 en la infección por Rotavirus?**

- A. Inhibe la síntesis de proteínas celulares en el núcleo.
- B. Es la proteína de la cápside que se une al ácido siálico.
- C. Facilita la gemación del virus a través de la membrana.
- D. Actúa como una enterotoxina que induce la secreción de calcio y cloruro.

**31. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el virus de la gripe D es correcto según el material proporcionado?**

- A. Infecta al ganado vacuno, pero no se sabe si causa enfermedad en humanos.
- B. Posee 11 segmentos de ARN bicatenario.
- C. Es el único Orthomyxovirus que no posee envoltura.
- D. Es el responsable de la mayoría de las epidemias estacionales en niños.

**32. ¿Qué efecto tiene el virus de la gripe sobre el epitelio respiratorio que facilita infecciones bacterianas secundarias?**

- A. Cierre de los bronquiolos por inflamación fibrótica.
- B. Aumento excesivo de la producción de moco protector.
- C. Inducción de una respuesta de anticuerpos IgA excesiva.
- D. Pérdida de la función ciliar y descamación de células epiteliales.

**33. En la nomenclatura de una cepa de gripe como A/Bangkok/1/79 (H3N2), ¿qué representa el número '1'?**

- A. El número de orden del aislamiento local.
- B. La cantidad de segmentos de ARN defectuosos.
- C. El nivel de virulencia en una escala del 1 al 10.
- D. El mes en que se produjo el brote.

## Paramixovirus

**1. La estructura general de Paramixovirus corresponde a:**

- A. ADN lineal desnudo con fibras.
- B. ARN negativo, nucleocápside helicoidal y envoltura.
- C. ARN positivo desnudo pequeño.
- D. ADN monocatenario eritrotropo.
- E. ARN bicatenario de cápside triple.

**2. Un ECP típico de paramixovirus es la formación de:**

- A. Huevos con mamelones regulares.
- B. Cuerpos de inclusión nuclear exclusivos.
- C. Larvas filariformes en piel.
- D. Células gigantes multinucleadas por fusión.
- E. Quistes hidatídicos.

**3. El virus del sarampión se recuerda porque:**

- A. Tiene reservorio principal en gatos.
- B. Se transmite por pescado crudo.
- C. Tiene un solo tipo y el humano es su único hospedero.
- D. Requiere caracol Lymnaea.
- E. Es un cestodo intestinal.

**4. ¿Qué dato clínico orienta a sarampión clásico?**

- A. Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.
- B. Hidrofobia luego de mordedura.
- C. Úlceras genitales recurrentes.
- D. Diarrea grasa sin fiebre.
- E. Dolor en hipocondrio con huevos biliares.

**5. Parainfluenza es importante en pediatría por su relación con:**

- A. Sarcoma de Kaposi.
- B. Anemia megaloblastica.
- C. Cisticercosis.
- D. Fasciolosis.
- E. Crup o laringotraqueobronquitis.

**6. El virus de la parotiditis se asocia de forma clásica con:**

- A. Verrugas plantares y condilomas.
- B. Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.
- C. Bronquiolitis por sincitios en lactantes.
- D. Hidatidosis hepática.
- E. Anemia por B12.

**7. El virus respiratorio sincitial causa mayor preocupación en:**

- A. Adultos con quiste biliar.
- B. Pescadores con anemia B12.
- C. Pacientes con mordedura de serpiente.
- D. Lactantes con bronquiolitis.
- E. Embarazadas con HPV cutáneo.

**8. La proteína F de varios paramixovirus se relaciona con:**

- A. Fusión de membranas y sincitios.
- B. Retrotranscripción del ARN.
- C. Liberación por neuraminidasa.

- D. Formación de oocistos.
- E. Penetración de cercarias.

**9. La vacuna de sarampión se administra dentro de:**

- A. Vacuna antirrábica posexposición.
- B. Vacuna antirotavirus oral.
- C. Triple viral o SRP/MMR.
- D. Vacuna antihepatitis B exclusiva.
- E. Antiveneno polivalente.

**10. Metapneumovirus humano se considera dentro del abordaje de:**

- A. Teniasis por carne de cerdo.
- B. Protozoarios urogenitales.
- C. Accidentes ofídicos.
- D. Trematodos hepáticos.
- E. Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.

**11. ¿Cuál es la característica estructural del genoma de los Paramixovirus?**

- A. Virión con ADN bicatenario circular y nucleocápside icosaédrica.
- B. Virión con ARN bicatenario segmentado sin envoltura.
- C. Virión con ARN de cadena positiva, segmentado y desnudo.
- D. Virión grande con ARN(-) monocatenario en una nucleocápside helicoidal y posee envoltura.

**12. Durante el proceso de replicación de los Paramixovirus, ¿en qué compartimento celular ocurre la multiplicación viral?**

- A. En el núcleo de la célula.
- B. En la cara externa del retículo endoplásmico rugoso exclusivamente.
- C. En el espacio intermembranoso de la mitocondria.
- D. En el citoplasma celular.

**13. ¿A qué componente de la superficie celular se unen inicialmente las proteínas de adhesión HN, H o G de los Paramixovirus?**

- A. Ácido siálico de los glucolípidos de la superficie celular.
- B. Colesterol de las balsas lipídicas.
- C. Proteínas de transporte de sodio.
- D. Fosfolípidos neutros de la bicapa lipídica.

**14. El efecto citopático característico de los Paramixovirus, consistente en células gigantes multinucleadas, se denomina:**

- A. Coilocitosis.
- B. Sincitios.
- C. Lisis por apoptosis.
- D. Cuerpos de Negri.

**15. En relación al Virus del Sarampión, ¿cuál afirmación sobre su transmisión es correcta?**

- A. Se requiere contacto directo con fluidos gastrointestinales.
- B. Solo se transmite durante la fase de exantema activo.
- C. Las gotitas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire hasta 2 horas.
- D. Se transmite principalmente por picaduras de mosquitos infectados.

**16. ¿Qué hallazgo clínico es considerado patognomónico para el diagnóstico precoz del sarampión antes del exantema generalizado?**

- A. Manchas de Koplik.
- B. Adenopatías cervicales dolorosas crónicas.
- C. Fiebre reumática aguda.
- D. Presencia de vesículas umbilicadas en el tronco.

**17. ¿Cuál es la causa fisiopatológica de la aparición del exantema típico maculopapuloso en el sarampión?**

- A. Producción excesiva de histamina por mastocitos pulmonares.
- B. La respuesta de los linfocitos T frente a las células endoteliales infectadas.
- C. Depósito de complejos inmunes circulantes en la dermis.
- D. Lisis directa de los melanocitos por el virus.

**18. ¿Cuál es la complicación más grave del sarampión que representa aproximadamente el 60% de las muertes asociadas?**

- A. Panencefalitis esclerosante subaguda.
- B. Diarrea severa con deshidratación.
- C. Neumonía.
- D. Encefalitis aguda postinfecciosa.

**19. En el diagnóstico citológico del sarampión, ¿qué característica celular se observa típicamente en muestras teñidas con Giemsa?**

- A. Linfocitos atípicos de Downey.
- B. Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos.
- C. Células con núcleos en anillo de sello.

- D. Células en 'ojo de búho'.

**20. La vacuna SPR para prevenir el sarampión protege contra:**

- A. Sarampión, Pertussis y Rubéola.
- B. Sarampión, Parainfluenza y Rinovirus.
- C. Sífilis, Polio y Rubéola.
- D. Sarampión, Paperas y Rubéola.

**21. ¿Cuál es la principal diferencia patogénica entre el Virus de la Parainfluenza y el Virus del Sarampión?**

- A. Parainfluenza causa una infección sistémica grave con viremia.
- B. Sarampión solo afecta las vías respiratorias superiores.
- C. Parainfluenza no causa viremia ni produce enfermedades sistémicas.
- D. Parainfluenza tiene un solo serotipo, mientras que el sarampión tiene cuatro.

**22. Los tipos 1 y 2 del Virus de la Parainfluenza son causas principales de qué síndrome clínico en niños?**

- A. Meningitis linfocítica.
- B. Laringotraqueobronquitis (Crup).
- C. Faringoamigdalitis purulenta.
- D. Bronquiolitis obliterante crónica.

**23. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para las infecciones por Virus de la Parainfluenza?**

- A. Tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico.
- B. Vacunación de emergencia tras la exposición.
- C. Inhalación de vapores fríos o calientes.
- D. Administración inmediata de ribavirina intravenosa.

**24. Además de las glándulas parótidas, ¿qué otros órganos se ven frecuentemente afectados por el Virus de la Parotiditis?**

- A. Testículos, ovarios, páncreas y sistema nervioso central.
- B. Ventrículos cardíacos y válvulas.
- C. Solo las glándulas lagrimales.
- D. Hígado y bazo exclusivamente.

**25. ¿Cuál es una consecuencia potencial de la orquitis causada por el virus de la parotiditis en varones post-púberes?**

- A. Cáncer de próstata a corto plazo.
- B. Esterilidad o infertilidad por atrofia testicular.
- C. Aumento excesivo de la producción de testosterona.
- D. Desarrollo de hernias inguinales.

**26. ¿Por qué se asocia el virus de la parotiditis con la aparición de diabetes juvenil en algunos pacientes?**

- A. Porque el virus consume todas las reservas de glucosa del cuerpo.
- B. Como efecto secundario de la vacuna SPR.
- C. Por una reacción cruzada con la glándula tiroidea únicamente.
- D. Debido a la infección y daño directo de las células del páncreas.

**27. ¿Cuál es la duración de la inmunidad tras una infección natural por el Virus de la Parotiditis?**

- A. Breve, requiriendo reinfecciones cada año.
- B. Dura toda la vida.
- C. Solo protege contra la orquitis, no contra la parotiditis.
- D. Aproximadamente 5 años solamente.

**28. ¿Cuál es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en lactantes y niños pequeños?**

- A. Metapneumovirus humano.
- B. Bordetella pertussis.
- C. Virus Respiratorio Sincitial (VRS).
- D. Virus de la Influenza A.

**29. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica la dificultad respiratoria severa en lactantes con infección por VRS?**

- A. Parálisis de los músculos intercostales.
- B. Espasmo laríngeo reflejo permanente.
- C. Destrucción total de los capilares alveolares.
- D. Obstrucción por tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico.

**30. En cuanto a la epidemiología del Virus Respiratorio Sincitial, ¿cuándo suelen producirse los brotes epidémicos?**

- A. Principalmente durante el verano.
- B. Cada 10 años, coincidiendo con sequías.
- C. Casi siempre en invierno, todos los años.
- D. Únicamente en climas tropicales húmedos sin variación estacional.

**31. ¿Qué técnica de diagnóstico se está convirtiendo en el método de elección para identificar rápidamente virus como Parainfluenza y Metapneumovirus?**

- A. Observación directa por microscopía electrónica.
- B. Prueba de la tuberculina.
- C. RT-PCR.



D. Hemocultivos en medios enriquecidos.

**32. Respecto al Metapneumovirus humano, ¿en qué grupos puede provocar afecciones respiratorias más graves?**

- A. No causa enfermedad grave en ningún grupo.
- B. Exclusivamente en pacientes con enfermedades renales crónicas.
- C. Niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos.
- D. Solo en adultos jóvenes sanos.

**33. ¿Cuál es la función principal de la proteína de matriz M en el virión de los Paramixovirus?**

- A. Actuar como receptor para el ácido siálico.
- B. Transcribir el ARN genómico en ARNm.
- C. Inducir la formación de anticuerpos neutralizantes.
- D. Facilitar el ensamblaje y revestir la cara interna de la envoltura.

**34. ¿Qué característica epidemiológica comparte el virus del sarampión con el virus de la parotiditis y el de la parainfluenza?**

- A. El ser humano es su único hospedador.
- B. Todos requieren ambientes desérticos para su propagación.
- C. Todos se transmiten por vectores artrópodos.
- D. Poseen más de 20 serotipos diferentes cada uno.

**35. En una infección por sarampión, ¿en qué momento se inicia el período de contagio en relación a los síntomas?**

- A. Exactamente 14 días después de que desaparece la fiebre.
- B. Solo cuando las costras se caen.
- C. Antes y después de la aparición de los síntomas.
- D. Solo durante la presencia de las manchas de Koplik.

**36. Si un paciente presenta fiebre, tos, rinorrea y conjuntivitis seguida de un exantema que inicia en la cabeza y baja al tronco, ¿qué diagnóstico se debería sospechar prioritariamente?**

- A. Infección bacteriana por estreptococo.
- B. Parotiditis aguda bilateral.
- C. Sarampión.
- D. Gripe estacional común.

## Rhabdovirus

**1. La morfología clásica del virus de la rabia es:**

- A. Capsídem icosaédrica desnuda pequeña.
- B. Bacilo grampositivo esporulado.
- C. Huevo operculado grande.
- D. Virión envuelto en forma de bala.
- E. Gusano plano segmentado.

**2. El genoma del virus rabico es:**

- A. ADN circular bicatenario.
- B. ARN positivo segmentado.
- C. ARN monocatenario negativo.
- D. ADN monocatenario lineal.
- E. ARN bicatenario con cápside triple.

**3. Una exposición humana típica a rabia ocurre por:**

- A. Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.
- B. Ingestión de pescado crudo.
- C. Picadura de Anopheles hembra.
- D. Contacto con heces de gato con ooquistes.
- E. Consumo de berro con metacercarias.

**4. Qué factor acorta o agrava el periodo de incubación de rabia?**

- A. Lesión lejana en pie sin inoculo.
- B. Vacunación previa completa.
- C. Baja concentración viral.
- D. Piel intacta sin contacto.
- E. Herida cercana al cerebro.

**5. Después de replicarse en el sitio de inoculación, el virus rabico progresa hacia el SNC por:**

- A. Huevos en vía biliar.
- B. Transporte neural retrogrado.
- C. Fecalismo intestinal.
- D. Viremia masiva por eritrocitos.
- E. Larvas por circulación portal.

**6. El tiempo de observación del perro o gato agresor se relaciona con el periodo de transmisibilidad y suele ser:**

- A. 24 horas.
- B. 3 meses.
- C. 2 años.
- D. 10 días.
- E. 18 días.

**7. El cuadro neurológico clásico de rabia puede incluir:**

- A. Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma.
- B. Diarrea grasa crónica.
- C. Exantema en mejilla abofeteada.
- D. Condilomas genitales.
- E. Anemia megaloblastica por pescado.

**8. La conducta inicial más correcta ante mordedura sospechosa es:**

- A. Cerrar la herida sin limpieza.
- B. Aplicar torniquete por 24 horas.
- C. Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.
- D. Esperar fiebre antes de actuar.
- E. Dar solo analgésico y alta.

**9. El diagnóstico postmortem clásico de rabia puede apoyarse en:**

- A. Huevos mameonados en heces.
- B. Quistes de Giardia en duodeno.
- C. Proglotides gravidas.
- D. Amastigotes en sangre periférica.
- E. Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.

**10. Filovirus, incluidos Ebola y Marburg, se diferencian por ser:**

- A. ADN pequeños desnudos eritrotropos.
- B. ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.
- C. Protozoos con flebotomo vector.
- D. Cestodos por carne bovina.
- E. Trematodos con caracol Lymnaea.

**11. ¿Cuál es la característica estructural que define la forma del virión de la familia Rhabdoviridae?**

- A. Cápside filamentosa de gran longitud sin envoltura.
- B. Morfología en forma de bala con envoltura lipídica.
- C. Forma pleomórfica con genoma de ADN bicatenario.
- D. Estructura icosaédrica desnuda con espículas de glucoproteína.

**12. ¿En qué compartimento celular tiene lugar la replicación del virus de la rabia?**

- A. Citoplasma de la célula hospedadora.
- B. Asociado exclusivamente a la membrana citoplasmática.
- C. Dentro de las mitocondrias para aprovechar el ATP.
- D. Núcleo celular para la transcripción genómica.

**13. Durante la fase de incubación, ¿dónde se replica principalmente el virus antes de invadir el sistema nervioso central?**

- A. En los ganglios linfáticos regionales.
- B. En el tejido muscular del sitio de inoculación.
- C. Directamente en la sangre.
- D. En las glándulas salivales del humano infectado.

**14. ¿Cuál es la duración típica del periodo de incubación en humanos según el material proporcionado?**

- A. De 2 a 10 días máximo.
- B. De 1 a 5 años invariablemente.
- C. Exactamente 10 días en todos los casos.
- D. De 60 a 365 días.

**15. ¿Qué factor determina que el periodo de incubación sea más corto en una persona infectada?**

- A. La proximidad de la herida al cerebro.
- B. La administración inmediata de antibióticos.
- C. El tipo de grupo sanguíneo del huésped.
- D. El sexo de la persona afectada.

**16. Respecto a la inmunidad frente a la infección natural por rabia, ¿cuál es la situación de la respuesta celular?**

- A. Es nula durante el transcurso de la infección.
- B. Es la principal defensa que elimina al virus del músculo.
- C. Solo se activa en la fase de coma.
- D. Se activa rápidamente tras la mordedura del animal.

**17. ¿Por qué la inmunidad humoral no suele salvar al paciente una vez aparecen los síntomas?**

- A. Porque los anticuerpos no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está establecido.
- B. Porque los anticuerpos no pueden entrar al SNC.
- C. Porque el virus destruye los linfocitos B del suero.
- D. Porque el virus cambia sus antígenos de superficie constantemente.

**18. ¿Cuál es el reservorio principal de la rabia salvaje mencionado como de mayor importancia actual en humanos?**

- A. Perros callejeros sin vacunar.
- B. Ratones y otros pequeños roedores domésticos.
- C. Murciélago hematófago (Desmodus rotundus).
- D. Aves de rapiña infectadas.



**19. ¿A qué se debe el síntoma característico de la hidrofobia en los pacientes con rabia?**

- A. A que el agua destruye la envoltura del virus en la garganta.
- B. A una mutación del virus que lo hace hidrofóbico.
- C. A la pérdida total del sentido de la sed.
- D. Al dolor intenso que sienten al intentar tragar agua.

**20. ¿Qué son los Corpúsculos de Negri y en qué porcentaje de pacientes aparecen?**

- A. Células gigantes multinucleadas; aparecen en el 100% de los infectados.
- B. Agregados de nucleocápsides víricas; aparecen en el 70%-90% de los casos.
- C. Cristales de sales de calcio; aparecen en el 15% de los pacientes.
- D. Vacuolas de grasa en el citoplasma; aparecen solo en perros.

**21. ¿Cuál es el método de elección para la detección del genoma del virus de la rabia por su rapidez y sensibilidad?**

- A. Cultivo en huevos embrionados.
- B. Tinción de Gram en líquido cefalorraquídeo.
- C. RT-PCR.
- D. Prueba de aglutinación en látex.

**22. ¿Cuál es la primera medida recomendada inmediatamente después de la mordedura de un animal sospechoso?**

- A. Suturar la herida lo más rápido posible.
- B. Aplicar un torniquete por encima de la lesión.
- C. Administrar analgésicos potentes y esperar síntomas.
- D. Lavar profundamente la herida con agua y jabón.

**23. ¿En qué consiste la profilaxis post-exposición completa para una persona no vacunada previamente?**

- A. Dosis única de suero fisiológico y antibióticos.
- B. Vacuna de virus muertos combinada con inmunoglobulina antirrábica humana.
- C. Aislamiento en cuarto oscuro durante 40 días sin medicación.
- D. Inyección de virus vivos atenuados directamente en la herida.

**24. ¿Cuál es el tiempo recomendado para observar a un perro o gato que ha mordido a una persona antes de descartar riesgo de transmisión?**

- A. 10 días.
- B. 6 meses.
- C. 24 horas.
- D. 45 días.

**25. En la fase neurológica, ¿qué otros síntomas fobígenos se presentan además de la hidrofobia?**

- A. Fobia al contacto con metales.
- B. Miedo intenso a la oscuridad.
- C. Fobias al viento y a movimientos bruscos.
- D. Rechazo absoluto a los alimentos sólidos únicamente.

**26. ¿Cuál de las siguientes es una vía de transmisión menos frecuente pero posible para la rabia humana?**

- A. Contacto estrecho piel con piel sin heridas.
- B. Picadura de mosquitos que previamente picaron a un animal rabioso.
- C. Trasplante de tejidos infectados, como la córnea.
- D. Consumo de carne de perro cocida.

**27. En la estructura del Rhabdovirus, ¿dónde se localizan las espículas de glucoproteína?**

- A. Insertadas en la envoltura lipídica externa.
- B. En el interior del núcleo helicoidal.
- C. Libres en el citoplasma de la célula sin formar parte del virión.
- D. Constituyendo la matriz proteica.

**28. ¿Qué tipo de parálisis se menciona como causa final de muerte en la progresión de la rabia?**

- A. Parálisis intestinal con necrosis gástrica.
- B. Parálisis que origina insuficiencia respiratoria.
- C. Parálisis de los músculos de la visión.
- D. Parálisis de los miembros inferiores únicamente.

**29. Ante una mordedura, ¿en qué caso se podría evitar iniciar la profilaxis post-exposición de inmediato?**

- A. Si se analiza al animal y se demuestra que no presenta la infección.
- B. Si la mordedura fue en el pie y no sangró mucho.
- C. Si el paciente tiene un sistema inmune muy fuerte.
- D. Si el perro es de raza pequeña o cachorro.

**30. ¿Cuál es la recomendación de la OMS respecto al uso de suero antirrábico local?**

- A. Beber el suero mezclado con jugos cítricos.

- B. Gotear o infiltrar suero antirrábico alrededor de la herida.
- C. Inyectarlo por vía intravenosa en el brazo opuesto.
- D. No utilizarlo nunca para evitar alergias cutáneas.

## Togavirus y Flavivirus

**1. Alfavirus y flavivirus comparten como rasgo estructural:**

- A. ADN bicatenario sin envoltura.
- B. ARN negativo en forma de bala.
- C. ARN monocatenario positivo con envoltura.
- D. ADN monocatenario eritrotropo.
- E. Genoma circular con transcriptasa inversa.

**2. La replicación de alfavirus ocurre principalmente en:**

- A. Citoplasma.
- B. Nucleo.
- C. Eritrocito maduro.
- D. Conducto biliar.
- E. Ganglio sensorial.

**3. En arbovirus, el termino vector biologico se aplica con mayor frecuencia a:**

- A. Caracol Lymnaea.
- B. Perro domestico.
- C. Pescado de agua dulce.
- D. Gato definitivo.
- E. Mosquito hembra hematofago.

**4. Dengue grave tras una segunda infección por serotipo distinto se explica mejor por:**

- A. Latencia en ganglios dorsales.
- B. Potenciación dependiente de anticuerpos.
- C. Autoinfección intestinal.
- D. Toxina neurotrópica salival.
- E. Destrucción de vitamina B12.

**5. En dengue temprano, una combinación diagnóstica útil es:**

- A. Cinta adhesiva y coproparasitológico.
- B. Gota gruesa para larvas.
- C. Cultivo de bilis para huevos.
- D. NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.
- E. Biopsia de músculo para quistes.

**6. Chikungunya se reconoce clínicamente por:**

- A. Fiebre con artralgias intensas y persistentes.
- B. Hidrofobia y espasmos faríngeos.
- C. Diarrea grasa por malabsorción.
- D. Parálisis flácida por asta anterior.
- E. Hematuria por huevos vesicales.

**7. Zika tiene especial importancia en gestación por su relación con:**

- A. Eritema infeccioso por B19.
- B. Sarcoma de Kaposi neonatal.
- C. Síndrome congénito y microcefalia.
- D. Hidatidosis pulmonar fetal.
- E. Aplasia medular por HPV.

**8. La fiebre amarilla se previene de forma específica con:**

- A. Vacuna antirrábica únicamente.
- B. Antibiótico macrolido.
- C. Antihelmíntico para perros.
- D. Cocción de pescado.
- E. Vacuna viva atenuada y control vectorial.

**9. El virus de la rubéola pertenece al género:**

- A. Flavivirus.
- B. Rubivirus.
- C. Lentivirus.
- D. Enterovirus.
- E. Rhabdovirus.

**10. La rubéola congénita se previene principalmente mediante:**

- A. Tratamiento con antiveneno.
- B. Hervir pescado de río.
- C. Desecación de quistes.
- D. Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.
- E. Observación de animales 10 días.

**11. En el contexto de la epidemiología de los arbovirus, ¿qué papel desempeña el ser humano en la mayoría de los ciclos de transmisión?**

- A. Vector invertebrado

- B. Hospedador terminal
- C. Reservorio primario
- D. Hospedador natural asintomático

**12. ¿Cuál es la complicación clínica más característica que diferencia a la fiebre amarilla de otros flavivirus?**

- A. Microcefalia congénita
- B. Ictericia con coloración amarilla de piel y ojos
- C. Artralgia severa
- D. Exantema maculopapular

**13. Sobre el tratamiento de las infecciones por alfavirus y flavivirus, ¿cuál es la recomendación estándar?**

- A. Antibioticoterapia de amplio espectro
- B. Tratamiento de soporte con líquidos y paracetamol
- C. Uso de aspirina para controlar la fiebre alta
- D. Administración de aciclovir intravenoso

**14. ¿Qué hallazgo en el diagnóstico de laboratorio confirma una infección activa por un arbovirus?**

- A. Leucocitosis con neutrofilia
- B. Presencia de IgG persistente
- C. Visualización del virus por microscopía óptica
- D. Determinación de anticuerpos IgM

**15. El virus de la rubéola se diferencia de otros togavirus principalmente por:**

- A. Tener un genoma de ADN bicatenario
- B. No poseer envoltura lipídica
- C. Presentar múltiples serotipos
- D. Su modo de transmisión respiratoria

**16. ¿Qué condición favorece la infección por flavivirus a través de receptores Fc?**

- A. Deficiencia de vitamina D
- B. Presencia de anticuerpos no neutralizantes
- C. Vacunación previa contra fiebre amarilla
- D. Uso previo de antibióticos

**17. ¿Cuál es el vector principal asociado a la transmisión urbana del virus chikungunya y del dengue?**

- A. Anopheles gambiae
- B. Aedes aegypti
- C. Culex quinquefasciatus
- D. Aedes albopictus

**18. ¿Cuál de estos síntomas es un signo de alarma en la fiebre amarilla que indica progresión a etapa grave?**

- A. Cefalea frontal
- B. Dolor de espalda leve
- C. Erupciones cutáneas pruriginosas
- D. Disfunción renal y hemorragias

**19. En el diagnóstico diferencial de chikungunya, ¿qué característica clínica es más frecuente en dengue según la tabla comparativa?**

- A. Linfopenia severa
- B. Fiebre muy alta
- C. Trombocitopenia
- D. Artralgias intensas

**20. ¿Cuál es el periodo de incubación típico de la fiebre amarilla?**

- A. 12 a 24 horas
- B. 21 días
- C. 1 a 2 semanas
- D. 3 a 6 días

**21. Respecto a la transmisión vertical del chikungunya, ¿cuándo es más probable que la madre infecte al recién nacido?**

- A. Durante el primer trimestre únicamente
- B. A través de la lactancia materna exclusiva
- C. Solo si el parto se realiza por cesárea
- D. Si presenta fiebre justo al momento del parto o días antes

**22. La naturaleza de la enfermedad provocada por arbovirus está determinada por tres factores principales. ¿Cuál NO es uno de ellos?**

- A. Tropismo celular específico de cada virus
- B. Respuesta individual a la infección
- C. Grupo sanguíneo del hospedador
- D. Concentración del virus infectante

**23. ¿Cuál es la característica principal de la cápside de los alfavirus y flavivirus?**

- A. Pleomórfica

- B. Helicoidal
- C. Icosaédrica
- D. Biconvexa

**24. En el vector invertebrado, la infección por arbovirus se caracteriza por ser:**

- A. Latente en el sistema nervioso
- B. Transitoria de pocas horas
- C. Lítica
- D. Persistente

**25. ¿Qué técnica diagnóstica es preferible para detectar la presencia del virus en sangre durante la fase de fiebre alta?**

- A. Prueba de la tuberculina
- B. Aglutinación con látex para IgG
- C. Cultivo en agar sangre
- D. RT-PCR

**26. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es causada por un alfavirus y se caracteriza por una fase crónica con dolores articulares persistentes?**

- A. Zika
- B. Fiebre del Nilo Occidental
- C. Chikungunya
- D. Rubéola

**27. En la patogenia de los arbovirus, ¿en qué órganos se produce la viremia secundaria?**

- A. Pulmones y tráquea
- B. Intestino delgado y colon
- C. Médula ósea únicamente
- D. Hígado, bazo y ganglios linfáticos

**28. ¿Cuál es la principal medida de prevención para evitar la diseminación de cualquier arbovirus en ausencia de vacunas?**

- A. Hervir el agua de consumo
- B. Eliminación de vectores y sus zonas de reproducción
- C. Tratamiento preventivo con paracetamol
- D. Uso de mascarillas N95 en lugares públicos

**29. Según el material, ¿qué síntoma dermatológico es común en la rubéola?**

- A. Exantema, uno de los cinco clásicos de la infancia
- B. Escamas blanquecinas en cuero cabelludo
- C. Vesículas con costras tipo varicela
- D. Nódulos subcutáneos dolorosos

**30. ¿Cuál es el hospedador natural y reservorio frecuente para virus como dengue y fiebre amarilla en ciclos selváticos?**

- A. Roedores pequeños
- B. Aves migratorias
- C. Cerdos
- D. Monos

## Retrovirus

**1. La característica que define a los retrovirus es la presencia de:**

- A. Transcriptasa inversa.
- B. Neuraminidasa.
- C. Hemaglutinina.
- D. Cuerpo de Negri.
- E. Disco succionario.

**2. El genoma de VIH se describe mejor como:**

- A. ADN bicatenario lineal sin envoltura.
- B. ARN negativo segmentado.
- C. ADN monocatenario sin envoltura.
- D. ARN bicatenario de cápside triple.
- E. ARN monocatenario positivo con envoltura.

**3. La integrasa del VIH permite:**

- A. Unir virus a ácido sialico.
- B. Incorporar el ADN proviral al genoma celular.
- C. Liberar viriones por neuraminidasa.
- D. Formar quistes resistentes.
- E. Producir huevos embrionados.

**4. Las células diana principales del VIH expresan:**

- A. Antígeno P eritrocitario.
- B. Receptor de bilis.
- C. Quitina externa.
- D. CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.
- E. Botrios del escolex.

**5. La disminución progresiva de CD4 explica principalmente:**

- A. Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.
- B. Anemia por consumo de B12.
- C. Obstrucción intestinal por adultos.
- D. Fiebre por esquizogonia eritrocitaria.
- E. Dermatitis por pediculosis.

**6. Una prueba inicial moderna de tamizaje de VIH suele detectar:**

- A. Huevos en heces seriadas.
- B. Trofozoitos móviles en fresco.
- C. Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.
- D. Cercarias en agua.
- E. Veneno en sangre.

**7. La carga viral por PCR se usa principalmente para:**

- A. Identificar huevos operculados.
- B. Clasificar mordeduras ofídicas.
- C. Medir vitamina B12 por cestodos.
- D. Detectar larvas en cinta adhesiva.
- E. Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.

**8. La terapia antirretroviral combinada busca:**

- A. Eliminar solo bacterias anaerobias.
- B. Bloquear distintas etapas de la replicación viral.
- C. Neutralizar venenos de serpientes.
- D. Paralizar nematodos intestinales únicamente.
- E. Destruir ooquistes ambientales.

**9. HTLV-1 se asocia especialmente con:**

- A. Condiloma acuminado.
- B. Rabia paralítica.
- C. Fasciolosis biliar.
- D. Leucemia/linfoma de células T del adulto.
- E. Cisticercosis muscular.

**10. Una medida preventiva esencial para VIH es:**

- A. Evitar exclusivamente gatos.
- B. Cocinar vegetales acuáticos.
- C. Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.
- D. Observar perros por 10 días.
- E. No caminar descalzo.

**11. ¿Cuál es la característica morfológica distintiva de los retrovirus clasificados como Oncovirinae tipo B?**

- A. Nucleocápside excéntrica dentro del virión maduro
- B. Nucleocápside de forma cilíndrica
- C. Ausencia de envoltura lipídica externa
- D. Nucleocápside central y esférica

**12. En la estructura del VIH, ¿qué función específica cumple la enzima integrasa?**

- A. Insertar el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora
- B. Escindir poliproteínas precursoras
- C. Facilitar el anclaje inicial de gp120 al CD4
- D. Convertir el ARN monocatenario en ADN de doble cadena

**13. Se estima que parte de la población es resistente a la infección por VIH. ¿A qué se debe este fenómeno según el material?**

- A. Producción excesiva de linfocitos T CD8 citotóxicos
- B. Presencia de anticuerpos naturales hiper-eficientes
- C. Ausencia de correceptores como CCR5 o CXCR4 en sus linfocitos
- D. Mutación que impide la expresión de receptores CD4

**14. Durante la replicación del VIH, ¿qué ocurre inmediatamente después de que el ADN viral se inserta en el núcleo celular?**

- A. Se sintetiza ARN viral a partir del ADN mediante ARN polimerasa celular
- B. La retrotranscriptasa inicia la copia del ARN en ADN
- C. La proteasa comienza a digerir polipéptidos largos
- D. El virión se libera por gemación

**15. ¿Cuál es la principal diferencia clínica entre un paciente VIH positivo y uno con SIDA?**

- A. La capacidad de transmitir el virus
- B. El recuento de linfocitos T CD4 y la presencia de infecciones oportunistas
- C. La presencia de anticuerpos detectables por ELISA
- D. La necesidad de iniciar tratamiento antirretroviral

**16. De acuerdo con las categorías de los CDC, ¿qué parámetros definen la etapa 2 de la infección por VIH?**

- A. CD4 superior a 500 y porcentaje al menos 29%
- B. CD4 entre 200 y 499 y porcentaje entre 14% y 28%
- C. CD4 inferior a 200 o afección oportunista

- D. Síndrome tipo mononucleosis sin anticuerpos

**17. En un accidente laboral con material contaminado, ¿cuál es el tiempo ideal para iniciar la profilaxis post-exposición?**

- A. Solo después de confirmar el resultado de la fuente
- B. Dentro de las primeras 2 horas del suceso
- C. En un plazo máximo de 7 días
- D. Después del síndrome retroviral agudo

**18. ¿Qué tumor maligno causado por VHH-8 es característico en pacientes con SIDA?**

- A. Linfoma de Burkitt
- B. Linfoma de Hodgkin
- C. Carcinoma hepatocelular
- D. Sarcoma de Kaposi

**19. ¿Por qué ELISA se considera una prueba de tamizaje y no confirmatoria definitiva para VIH?**

- A. Porque requiere fase de SIDA para ser positivo
- B. Porque es una prueba genómica de ADN
- C. Porque posee alta sensibilidad pero especificidad limitada, pudiendo dar falsos positivos
- D. Porque solo detecta carga viral directa

**20. ¿Cuál es la justificación principal del uso de terapia antirretroviral combinada en lugar de un solo fármaco?**

- A. Reducir el periodo ventana a pocos días
- B. Disminuir el riesgo de resistencias y mutaciones virales
- C. Eliminar todos los efectos secundarios
- D. Eliminar completamente el virus de reservorios celulares

**21. En la cronología del VIH, ¿qué caracteriza a la fase crónica o periodo de latencia clínica?**

- A. Mayor viremia y aumento explosivo de carga viral
- B. Replicación viral persistente pero lenta, con descenso gradual de CD4
- C. Recuperación de CD4 por encima del nivel previo
- D. Detención completa de la replicación por anticuerpos

**22. ¿Qué ocurre con el riesgo de transmisión sexual y vertical cuando un paciente logra carga viral indetectable?**

- A. Aumenta por falsa seguridad y mutaciones
- B. Disminuye drásticamente hasta ser casi inexistente
- C. Solo se elimina el riesgo vertical, no el sexual
- D. Se mantiene igual porque el virus sigue en el ADN celular

**23. La glucoproteína gp120 tiene afinidad por CD4. ¿En qué células se encuentra principalmente este receptor?**

- A. Linfocitos T, macrófagos y células dendríticas
- B. Linfocitos B y células NK
- C. Neuronas motoras y células musculares
- D. Eritrocitos y plaquetas

**24. ¿Cuál es la función del proceso de gemación en el ciclo vital del VIH?**

- A. Acelerar la lisis celular por ruptura violenta
- B. Inyectar el ARN viral directamente en el citoplasma
- C. Permitir que el virión salga adquiriendo envoltura lipídica
- D. Fusionar dos células infectadas para formar sincitio

**25. ¿Qué efecto tiene la pérdida de linfocitos T CD4 sobre la respuesta de hipersensibilidad retardada?**

- A. Aumenta la sensibilidad ante alérgenos comunes
- B. No tiene efecto porque depende solo de anticuerpos
- C. Provoca pérdida o disminución severa de la respuesta
- D. La sustituye por inflamación aguda inespecífica

**26. ¿Cuál es la función de la enzima proteasa en el ciclo de vida del VIH?**

- A. Digerir polipéptidos largos para formar proteínas y enzimas funcionales
- B. Romper la membrana celular para facilitar entrada
- C. Degradar el ADN de la célula hospedadora
- D. Sintetizar ADN complementario a partir del ARN genómico

**27. Dentro de la patogenia, ¿qué significa que el VIH cause una infección lítica?**

- A. Que el virus se vuelve menos agresivo con el tiempo
- B. Que la replicación masiva termina destruyendo la célula infectada
- C. Que permanece dormido en el ADN sin producir partículas
- D. Que solo se transmite por líquidos infectados

**28. ¿Cuál es una complicación gastrointestinal común en pacientes con SIDA avanzado?**

- A. Obstrucción biliar por cálculos de colesterol
- B. Úlceras gástricas por estrés crónico
- C. Diarrea asociada a Salmonella, Shigella y Campylobacter

D. Aumento de motilidad por sistema simpático

**29. ¿Qué papel desempeñan los linfocitos T CD8 en la progresión del VIH?**

- A. Son las principales células infectadas y destruidas
- B. Controlan la progresión, pero requieren activación por CD4
- C. Producen anticuerpos detectados en Western Blot
- D. Aceleran la integración del ADN viral en neuronas

**30. En la epidemiología del VIH, ¿qué significa el término PVV?**

- A. Persona que vive con VIH
- B. Paciente con vacunación vigilada
- C. Población vulnerable al virus
- D. Portador de variantes virulentas

**31. ¿Cuál es la causa principal de la demencia relacionada con el SIDA según la patogenia descrita?**

- A. Infección de microglía y neuronas por VIH o infecciones oportunistas
- B. Efecto tóxico directo de antirretrovirales a largo plazo
- C. Desnutrición extrema por diarrea crónica
- D. Ruptura masiva de capilares cerebrales por sarcoma de Kaposi

## Generalidades, huéspedes y prevención

**1. En parasitología, el huésped definitivo se define mejor como aquel en el que el parásito:**

- A. Permanece siempre como quiste ambiental.
- B. Solo se transporta mecanicamente sin cambiar.
- C. Muere antes de completar el ciclo.
- D. No produce ningún dano.
- E. Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.

**2. El huésped intermediario se reconoce porque en él ocurre:**

- A. Únicamente diagnóstico serológico.
- B. Desarrollo larvario o reproducción asexual.
- C. La eliminación obligatoria de anticuerpos.
- D. El tratamiento farmacológico.
- E. La vacunación del humano.

**3. Un reservorio epidemiológico es importante porque:**

- A. Siempre elimina el parásito por tos.
- B. Impide toda zoonosis.
- C. Es sinónimo de vector mecánico.
- D. Mantiene el parásito disponible para transmisión.
- E. Solo existe en virus envueltos.

**4. La diferencia más adecuada entre vector biológico y mecánico es:**

- A. En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.
- B. El biológico nunca transmite enfermedad.
- C. El mecánico siempre inyecta saliva infectante.
- D. Ambos requieren reproducción sexual del parásito.
- E. Solo el mecánico tiene importancia médica.

**5. La prevención comunitaria de parasitosis intestinales se centra sobre todo en:**

- A. Aislamiento respiratorio estricto permanente.
- B. Antivirales de amplio espectro.
- C. Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.
- D. Vacuna antitetánica como única medida.
- E. Cierre de escuelas sin educación sanitaria.

**6. Una parasitosis zoonótica implica que:**

- A. Solo existe en cultivos celulares.
- B. No requiere ningún huésped.
- C. Siempre se transmite por transfusión.
- D. Nunca involucra reservorios.
- E. Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.

**7. Para parásitos intestinales con eliminación intermitente de formas diagnósticas, ¿qué estrategia mejora el rendimiento?**

- A. Radiografía simple única.
- B. Examen coproparasitológico seriado.
- C. Hemocultivo para anaerobios.
- D. Prueba de catalasa.
- E. Tinción de Gram de piel.

**8. Los protozoarios se diferencian de los helmintos porque generalmente son:**

- A. Pluricelulares segmentados.
- B. Artrópodos con exoesqueleto.
- C. Serpientes venenosas.

D. Unicelulares.

E. Hongos filamentosos.

**9. Una medida de APS contra parasitosis transmitidas por suelo debe priorizar:**

- A. Solo antitermicos.
- B. Vacuna SRP.
- C. Letrinas, calzado y lavado de manos.
- D. Antiveneno preventivo.
- E. Uso de lentes de sol.

**10. Si un parásito necesita más de un huésped para completar su ciclo, se trata de un ciclo:**

- A. Indirecto o heteroxeno.
- B. Directo o monoxeno.
- C. Aviral.
- D. Saprofita estricto.
- E. Exclusivamente mecánico.

## Paludismo

**1. La definición más completa de paludismo incluye infección por Plasmodium y transmisión habitual por:**

- A. Triatominos hematofagos.
- B. Hembras de Anopheles.
- C. Flebotomos.
- D. Caracoles Lymnaea.
- E. Pulgas de perro.

**2. El primer sitio de multiplicación del Plasmodium después de la inoculación vectorial es:**

- A. Vejiga.
- B. Ganglio sensorial.
- C. Intestino grueso.
- D. Hígado.
- E. Vía biliar.

**3. Los paroxismos febriles se relacionan principalmente con:**

- A. Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.
- B. Migración de larvas por pulmón.
- C. Liberación de huevos por proglotides.
- D. Invasión de queratinocitos.
- E. Mordedura local de serpiente.

**4. P. falciparum es especialmente temido porque puede producir:**

- A. Solo infección leve sin complicaciones.
- B. Quistes hepáticos calcificados.
- C. Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.
- D. Verrugas genitales.
- E. Parotiditis viral.

**5. La gota gruesa y el extendido fino sirven respectivamente para:**

- A. Medir anticuerpos y vacunar.
- B. Buscar huevos y larvas.
- C. Identificar veneno y necrosis.
- D. Detectar quistes y ooquistes felinos.
- E. Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.

**6. Una prueba rápida de malaria busca principalmente:**

- A. Anticuerpos antirrábicos.
- B. Antígenos parasitarios.
- C. Huevos operculados.
- D. Cuerpos de inclusión nuclear.
- E. Toxinas de serpiente.

**7. Las recaídas por hipnozoitos se asocian sobre todo con:**

- A. P. falciparum y P. malariae.
- B. T. cruzi y T. rangeli.
- C. Leishmania donovani y infantum.
- D. P. vivax y P. ovale.
- E. Giardia y Trichomonas.

**8. La transmisión no vectorial del paludismo puede ocurrir por:**

- A. Inhalación de polvo con huevos.
- B. Contacto con verrugas.
- C. Transplacentaria o transfusional.
- D. Mordedura de gato.
- E. Carne de pescado cruda.

**9. La certificación de Paraguay como país libre de malaria autóctona implica:**

- A. Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.

- B. Ausencia mundial de malaria.
- C. Eliminación de mosquitos de todo el país.
- D. Inutilidad de todo diagnóstico en viajeros.
- E. Erradicación de Plasmodium en Brasil.

**10. Una medida preventiva primaria contra paludismo es:**

- A. Evitar gatos durante embarazo.
- B. Cocinar carne de cerdo.
- C. Lavar heridas por mordedura.
- D. Observar perros por 10 días.
- E. Control vectorial y protección contra picaduras.

## Trypanosoma

**1. La enfermedad de Chagas se produce por:**

- A. Trypanosoma brucei gambiense.
- B. Trypanosoma rangeli exclusivamente.
- C. Leishmania infantum.
- D. Trypanosoma cruzi.
- E. Plasmodium falciparum.

**2. El mecanismo vectorial principal de Chagas ocurre cuando:**

- A. Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas.
- B. La vinchuca inyecta larvas por saliva siempre.
- C. El mosquito Anopheles deposita ooquistes.
- D. El caracol libera cercarias al agua.
- E. La pulga transmite proglotides.

**3. La forma intracelular tisular de T. cruzi es:**

- A. Ooquiste.
- B. Metacercaria.
- C. Amastigote.
- D. Plerocercarioide.
- E. Hipnozoito.

**4. En sangre periférica durante fase aguda de Chagas se puede buscar:**

- A. Huevos mamelonados.
- B. Quistes hidatídicos.
- C. Cercarias.
- D. Pentonas.
- E. Tripomastigotes.

**5. El signo de Romana se relaciona con:**

- A. Ulceración nasal mucocutánea.
- B. Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.
- C. Vesículas en dermatoma.
- D. Mordedura de serpiente coral.
- E. Diarrea por Giardia.

**6. En la fase crónica de Chagas, una complicación clásica es:**

- A. Bronquiolitis por sincitios.
- B. Condiloma acuminado.
- C. Anemia megaloblástica por pescado.
- D. Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.
- E. Hidrofobia.

**7. Otra manifestación digestiva crónica de Chagas es:**

- A. Colitis por huevos de Schistosoma.
- B. Ictericia por Fasciola.
- C. Megaesofago o megacolon.
- D. Enteritis por rotavirus.
- E. Apendicitis por Ascaris.

**8. Para diagnóstico crónico de Chagas se prefiere:**

- A. Serología con pruebas diferentes.
- B. Gota gruesa única.
- C. Cinta adhesiva perianal.
- D. Cultivo de garganta.
- E. Papanicolaou.

**9. Trypanosoma rangeli es importante porque:**

- A. Produce siempre cardiopatía mortal.
- B. Es transmitido por Anopheles.
- C. Genera quistes musculares.
- D. Causa sarcoma de Kaposi.
- E. Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.

**10. La tripanosomiasis africana se asocia con:**

- A. T. cruzi y vinchuca.
- B. T. brucei y mosca tsetse.

- C. Leishmania y flebotomo.
- D. Plasmodium y Anopheles.
- E. Toxoplasma y gato.

## Toxoplasma gondii

**1. El hospedador definitivo de Toxoplasma gondii es:**

- A. Felino.
- B. Humano.
- C. Mosquito.
- D. Caracol.
- E. Pez.

**2. La forma invasiva y proliferativa de la fase aguda se denomina:**

- A. Ooquiste esporulado.
- B. Bradyzoito tisular.
- C. Taquizoito.
- D. Metacercaria.
- E. Proglótide.

**3. Los quistes tisulares con bradizoitos se relacionan principalmente con:**

- A. Fase sexual en gato únicamente.
- B. Eliminación por orina humana.
- C. Picadura de flebotomo.
- D. Huevos en vías biliares.
- E. Fase crónica y transmisión por carne.

**4. Una vía frecuente de infección humana por T. gondii es:**

- A. Mordedura de perro rabioso.
- B. Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.
- C. Picadura de vinchuca.
- D. Cercarias en agua dulce.
- E. Pescado con plerocercarioide.

**5. La transmisión congénita ocurre cuando:**

- A. El padre tiene verrugas cutáneas.
- B. El recién nacido ingiere pescado crudo.
- C. Hay mordedura de serpiente en parto.
- D. La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.
- E. Existe contacto con piojos.

**6. La triada congénita clásica incluye:**

- A. Parotiditis, orquitis y meningitis.
- B. Tos, fiebre y bronquiolitis.
- C. Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.
- D. Diarrea, meteorismo y esteatorrea.
- E. Hematuria, fibrosis vesical y cáncer.

**7. En pacientes con VIH avanzado, la reactivación de toxoplasmosis suele causar:**

- A. Encefalitis con lesiones cerebrales.
- B. Condilomas anogenitales.
- C. Colitis por huevos.
- D. Crisis aplásica pura.
- E. Parálisis diafragmática por veneno.

**8. Para interpretar infección reciente en embarazada, es útil valorar:**

- A. Cinta adhesiva perianal.
- B. Gota gruesa y gota fina.
- C. Cultivo de caracol.
- D. Prueba de coagulasa.
- E. IgM, IgG y avididad de IgG.

**9. Una medida preventiva en gestantes seronegativas es:**

- A. Suspender toda vacunación SRP ya recibida.
- B. Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.
- C. Tomar antiveneno mensual.
- D. Consumir pescado crudo congelado.
- E. Caminar descalza para inmunizarse.

**10. El ooquiste de Toxoplasma eliminado por felinos se vuelve importante porque:**

- A. Se transforma en adulto en vía biliar.
- B. Penetra piel como larva filariforme.
- C. Forma cápside viral icosaédrica.
- D. Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.
- E. Produce vitamina B12.

## Leishmania



**1. La forma infectante para el humano en Leishmania transmitida por flebotomo es:**

- A. Amastigote intracélular.
- B. Ooquiste esporulado.
- C. Promastigote metacíclico.
- D. Cercaria acuática.
- E. Huevo embrionado.

**2. Dentro del humano, Leishmania se multiplica principalmente como:**

- A. Tripomastigote en eritrocitos.
- B. Merozoito en hepatocitos.
- C. Larva filariforme en piel.
- D. Procercoide en crustáceos.
- E. Amastigote en macrofagos.

**3. El vector más relacionado con leishmaniasis es:**

- A. Anopheles.
- B. Flebotomo.
- C. Triatmino.
- D. Caracol Lymnaea.
- E. Pulga.

**4. La leishmaniasis visceral se caracteriza mejor por:**

- A. Verrugas genitales y coilocitosis.
- B. Diarrea grasa sin invasión.
- C. Hidrofobia y encefalitis.
- D. Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.
- E. Prurito anal nocturno.

**5. En la leishmaniasis visceral americana, un reservorio doméstico clave es:**

- A. Gato como definitivo.
- B. Pez de agua dulce.
- C. Perro.
- D. Cerdo exclusivamente.
- E. Caracol.

**6. La forma mucocutánea es preocupante porque puede producir:**

- A. Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.
- B. Aplasia eritroide pura.
- C. Parálisis flácida poliomiélica.
- D. Quistes en cerebro por huevos.
- E. Bronquiolitis infantil.

**7. Un diagnóstico parasitológico directo de leishmaniasis busca:**

- A. Huevos mameonados en heces.
- B. Cercarias en piel.
- C. Ooquistes ácido-alcohol resistentes.
- D. Antígenos de influenza.
- E. Amastigotes en material de lesión o médula.

**8. La coinfección con VIH en leishmaniasis visceral se considera grave porque:**

- A. Impide toda transmisión vectorial.
- B. Aumenta mortalidad y dificulta manejo.
- C. Convierte al parásito en virus.
- D. Elimina necesidad de tratamiento.
- E. Produce inmunidad esterilizante.

**9. Una medida preventiva comunitaria correcta es:**

- A. Solo clorar agua sin otras medidas.
- B. Vacunar contra HPV.
- C. Observar perros mordedores 10 días.
- D. Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.
- E. Cocinar pescado de río.

**10. La leishmaniosis se considera enfermedad desatendida porque:**

- A. Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.
- B. Solo ocurre en países ricos.
- C. No requiere vector ni reservorio.
- D. Nunca causa daño clínico.
- E. Se erradica mundialmente.

## Protozoarios intestinales y urogenitales

**1. En amebas intestinales, la forma quística se caracteriza por ser:**

- A. Siempre móvil e invasiva.
- B. Exclusiva de sangre.
- C. Transmitida por flebotomo.
- D. Un estadio de helminto.
- E. Resistente e infecciosa.

**2. En Entamoeba histolytica, los trofozoitos se observan mejor en:**

- A. Heces formadas antiguas.
- B. Heces recientes.
- C. Sangre seca.
- D. Esputo estéril.
- E. Orina matinal.

**3. La presencia de trofozoitos con eritrocitos ingeridos orienta a:**

- A. Entamoeba coli comensal.
- B. Giardia no invasiva.
- C. Trichomonas vaginalis.
- D. Entamoeba histolytica invasiva.
- E. Cryptosporidium.

**4. Giardia lamblia produce malabsorción porque se localiza sobre todo en:**

- A. Colon sigmoide exclusivo.
- B. Vías biliares adultas.
- C. Duodeno y yeyuno proximal.
- D. Ganglios sensitivos.
- E. Médula ósea.

**5. Un cuadro de diarrea pálida, fetida, meteorismo y pérdida de peso sugiere:**

- A. Giardiasis.
- B. Rabia.
- C. Sarcoma de Kaposi.
- D. Parotiditis.
- E. Crotalismo.

**6. Trichomonas vaginalis se diferencia de muchos protozoos intestinales porque:**

- A. Forma huevos embrionados en suelo.
- B. Tiene reservorio felino definitivo.
- C. Necesita caracol intermediario.
- D. Es un virus de ARN.
- E. No tiene fase quística y se transmite sexualmente.

**7. Balantidium coli se asocia epidemiológicamente con:**

- A. Gatos y toxoplasmosis.
- B. Cerdos y cuadros disintéricos.
- C. Perros y hidatidosis.
- D. Mosquitos y dengue.
- E. Peces y B12 baja.

**8. Cryptosporidium causa especial gravedad en:**

- A. Adultos sanos con verrugas comunes.
- B. Pacientes con mordedura ofídica.
- C. Pescadores con anemia megaloblástica.
- D. Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.
- E. Gestantes vacunadas contra rubéola.

**9. El diagnóstico de giardiasis puede apoyarse en:**

- A. Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.
- B. Cuerpos de Negri en cerebro.
- C. Huevos en vía biliar.
- D. Serología de Chagas crónico.
- E. Prueba de neutralización de veneno.

**10. La prevención de protozoarios intestinales prioriza:**

- A. Solo repelente contra flebotomos.
- B. Vacuna SRP en adultos.
- C. Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.
- D. Cocinar carne de res.
- E. Antiveneno en puestos de salud.

## Nematodos intestinales

**1. La forma infectante de Ascaris lumbricoides para el humano es:**

- A. Larva filariforme penetrante.
- B. Huevo embrionado ingerido.
- C. Cisticerco en carne.
- D. Metacercaria en vegetal acuático.
- E. Plerocercario en pescado.

**2. El síndrome de Loeffler en ascariosis se relaciona con:**

- A. Adultos en vías biliares siempre.
- B. Huevos en vejiga.
- C. Cisticercos cerebrales.
- D. Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.
- E. Toxina neurotópica salival.



**3. La obstrucción intestinal por Ascaris se observa sobre todo cuando:**

- A. Solo hay un huevo no fecundado.
- B. El parásito esta en mosquito.
- C. Existe alta carga de vermes adultos.
- D. El paciente fue vacunado contra polio.
- E. La infección es por Trichomonas.

**4. Trichuris trichiura se asocia en infección intensa con:**

- A. Prolapso rectal y anemia.
- B. Hidrofobia.
- C. Condiloma acuminado.
- D. Fiebre amarilla.
- E. Quiste hidatídico.

**5. Enterobius vermicularis se diagnostica mejor mediante:**

- A. Gota gruesa.
- B. Biopsia hepática.
- C. Aspirado de médula ósea.
- D. PCR respiratoria.
- E. Cinta adhesiva perianal matinal.

**6. El prurito anal nocturno en un niño orienta principalmente a:**

- A. Fasciolosis.
- B. Oxiuriasis.
- C. Dengue.
- D. Rabia.
- E. Leishmaniasis visceral.

**7. Strongyloides stercoralis preocupa en inmunodeprimidos porque puede producir:**

- A. Cáncer cervical.
- B. Aplasia eritroide por B19.
- C. Mononucleosis.
- D. Autoinfección e hiperinfección.
- E. Zoster localizado.

**8. Uncinarias como Ancylostoma y Necator ingresan habitualmente por:**

- A. Penetración cutánea de larvas filariformes.
- B. Ingestión de carne bovina cruda.
- C. Picadura de triatomo.
- D. Oocistos de gato.
- E. Mordedura de serpiente.

**9. La anemia por uncinarias se debe principalmente a:**

- A. Déficit de B12 por pescado.
- B. Hemólisis por malaria grave.
- C. Pérdida crónica de sangre intestinal.
- D. Aplasia por parvovirus.
- E. Destrucción medular por VIH.

**10. Toxocara sp. en humanos se manifiesta como:**

- A. Teniasis intestinal adulta.
- B. Diarrea acuosa por coccidios.
- C. Verrugas por HPV.
- D. Parotiditis.
- E. Larva migrans visceral u ocular.

## Cestodos

**1. Diphylobothrium latum se adquiere por ingestión de:**

- A. Carne de cerdo con bradizoitos.
- B. Berro con metacercarias.
- C. Agua con cercarias.
- D. Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.
- E. Huevos en polvo domiciliario.

**2. Una complicación clásica de Diphylobothrium latum es:**

- A. Hidrofobia y encefalitis.
- B. Condilomas genitales.
- C. Déficit de vitamina B12 y anemia megaloblástica.
- D. Insuficiencia respiratoria por RSV.
- E. Crisis aplásica por B19.

**3. Taenia saginata se relaciona con:**

- A. Carne bovina con cisticercos.
- B. Carne porcina con huevos embrionados.
- C. Pescado con plerocercoides.
- D. Perro con quiste hidatídico adulto.
- E. Caracol con cercarias.

**4. La neurocisticercosis ocurre cuando el humano ingiere:**

- A. Cisticercos de Taenia saginata.
- B. Plerocercoides de pescado.
- C. Metacercarias de Fasciola.
- D. Ooquistes de Cryptosporidium.
- E. Huevos de Taenia solium.

**5. La teniasis intestinal por T. solium se adquiere por:**

- A. Ingestión de huevos de T. solium.
- B. Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.
- C. Picadura de flebotomo.
- D. Mordedura de perro.
- E. Agua con cercarias.

**6. Hymenolepis nana es particular porque:**

- A. Necesita siempre pescado y copépodo.
- B. Solo infecta perros.
- C. No produce huevos.
- D. Puede completar ciclo directo y autoinfectar.
- E. Es un trematodo hepático.

**7. Dipylidium caninum se transmite al humano, especialmente niños, por:**

- A. Ingestión accidental de pulgas infectadas.
- B. Picadura de Anopheles.
- C. Carne bovina mal cocida.
- D. Berro contaminado.
- E. Heces de gato con ooquistes.

**8. En Echinococcus granulosus, el humano actúa como:**

- A. Huesped definitivo principal.
- B. Vector biológico.
- C. Huesped intermediario accidental.
- D. Reservorio felino.
- E. Caracol intermediario.

**9. El perro en Echinococcus granulosus alberga principalmente:**

- A. Quistes hidatídicos hepáticos.
- B. Cisticercos musculares.
- C. Huevos operculados biliares.
- D. Larvas pulmonares de Ascaris.
- E. Adultos intestinales.

**10. El diagnóstico de hidatidosis se apoya más en:**

- A. Cinta adhesiva perianal.
- B. Imágenes y serología según localización.
- C. Gota gruesa.
- D. Papanicolaou.
- E. Cultivo viral.

## Trematodos

**1. Fasciola hepática utiliza como hospedador intermediario a:**

- A. Mosquitos Aedes.
- B. Pulgas de perro.
- C. Caracoles del género Lymnaea.
- D. Peces de agua dulce.
- E. Gatos domésticos.

**2. La forma infectante de Fasciola para el humano es:**

- A. Metacercaria en vegetación acuática.
- B. Cercaria que penetra piel.
- C. Huevo embrionado en suelo.
- D. Plerocercario en pescado.
- E. Cisticercos en cerdo.

**3. Los adultos de Fasciola hepática se localizan principalmente en:**

- A. Colon.
- B. Ganglios sensoriales.
- C. Médula ósea.
- D. Vejiga urinaria exclusivamente.
- E. Vías biliares.

**4. Los huevos de Fasciola son eliminados al exterior por:**

- A. Saliva.
- B. Heces.
- C. Orina siempre.
- D. Sudor.
- E. Semen.

**5. En la fase aguda de fasciolosis predomina:**

- A. Latencia neuronal.

- B. Bronquiolitis viral.
  - C. Autoinfección intestinal.
  - D. Migración hepática, dolor y eosinofilia.
  - E. Cisticercosis muscular.
- 6. Schistosoma se diferencia de Fasciola porque su cercaria:**
- A. Penetra activamente la piel.
  - B. Se ingiere en berros.
  - C. Esta en carne de cerdo.
  - D. Sale en proglotides.
  - E. Permanece como quiste tisular.

- 7. La patología principal de esquistosomiasis se debe sobre todo a:**
- A. Toxina preformada en alimentos.
  - B. Replicación en queratinocitos.
  - C. Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.
  - D. Destrucción de eritrocitos por B19.
  - E. Veneno neurotóxico.

- 8. Schistosoma mansoni se asocia principalmente con:**
- A. Hematuria terminal exclusiva.
  - B. Crisis aplásica.
  - C. Exantema súbito.
  - D. Condilomas.
  - E. Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.

- 9. Schistosoma haematobium se relaciona con:**
- A. Anemia por B12.
  - B. Hematuria y riesgo de cáncer vesical.
  - C. Quistes hepáticos grandes.
  - D. Meningitis aséptica viral.
  - E. Tos por rinovirus.

- 10. Los huevos de trematodos hepáticos clásicos como Fasciola suelen ser:**
- A. Mamelonados de Ascaris.
  - B. Con espina lateral siempre.
  - C. Segmentados en proglotides.
  - D. Grandes y operculados.
  - E. Ácido-alcohol resistentes.

## Artrópodos de importancia médica

- 1. Una característica general de los artrópodos es:**
- A. Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.
  - B. Endoesqueleto óseo y pulmones alveolares.
  - C. Capsidom icosaédrica y genoma ARN.
  - D. Pared celular de peptidoglicano.
  - E. Cuerpo plano sin apéndices.
- 2. Los insectos se diferencian de arácnidos porque suelen tener:**
- A. Cuatro pares de patas y cefalotorax.
  - B. Sin patas y cuerpo cilíndrico.
  - C. Botrios en escolex.
  - D. Ventosas oral y ventral siempre.
  - E. Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.
- 3. Un vector mecánico transmite agentes principalmente por:**
- A. Desarrollo obligatorio del parásito en su cuerpo.
  - B. Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.
  - C. Inoculación de veneno neurotóxico.
  - D. Producción de huevos dentro del humano.
  - E. Replicación viral en ganglio sensorial.
- 4. Los triatominos tienen importancia médica por transmitir:**
- A. Leishmania infantum.
  - B. Plasmodium vivax.
  - C. Dengue virus.
  - D. Trypanosoma cruzi.
  - E. Fasciola hepática.
- 5. Los flebotomos son relevantes porque transmiten:**
- A. Leishmania.
  - B. Rabia.
  - C. Poliovirus.
  - D. Taenia saginata.
  - E. Enterobius.
- 6. Mosquitos del género Aedes se asocian especialmente con:**
- A. Chagas y leishmaniasis visceral.
  - B. Hidatidosis y teniasis.
  - C. Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla urbana.

- D. Oxiuriasis y trichuriasis.
- E. Fasciolosis y esquistosomiasis.

- 7. La pediculosis se relaciona con infestación por:**
- A. Garrapatas.
  - B. Pulgas exclusivamente.
  - C. Flebotomos.
  - D. Cucarachas.
  - E. Piojos.

- 8. Las garrapatas son importantes porque pueden actuar como:**
- A. Hosped definitivo de Echinococcus.
  - B. Vectores biológicos de varios agentes.
  - C. Reservorio felino de Toxoplasma.
  - D. Caracol intermediario de Fasciola.
  - E. Adulto intestinal de Taenia.

- 9. La pulga participa en la transmisión de Dipylidium caninum cuando:**
- A. Pica e inocula cercarias.
  - B. Defeca tripomastigotes.
  - C. Libera ooquistes en arena.
  - D. Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.
  - E. Deposita huevos de Ascaris.

- 10. Una medida general contra vectores artrópodos en APS es:**
- A. Suspender agua potable.
  - B. Evitar toda vacunación.
  - C. Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.
  - D. Usar antibióticos semanales.
  - E. Capturar serpientes para estudio.

## Importancia médica de serpientes

- 1. En Sudamérica, la mayoría de accidentes ofídicos se atribuye a:**
- A. Micrurus.
  - B. Cobra.
  - C. Dispholidus.
  - D. Sistrurus exclusivamente.
  - E. Bothrops.
- 2. En Paraguay, Bothrops tiene relevancia sanitaria porque:**
- A. Es siempre no venenosa.
  - B. Incluye especies capaces de accidentes severos.
  - C. Solo causa lesiones leves locales.
  - D. Pertenecen a anfibios.
  - E. No existe en el país.
- 3. Un accidente bothrópico se caracteriza inicialmente por:**
- A. Parálisis sin lesión local ni coagulopatía.
  - B. Diarrea crónica y malabsorción.
  - C. Hidrofobia y fiebre.
  - D. Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.
  - E. Exantema y artralgia.
- 4. El veneno crotálico se asocia más con:**
- A. Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.
  - B. Verrugas cutáneas.
  - C. Diarrea acuosa por enterocito.
  - D. Quistes hepáticos.
  - E. Anemia megaloblástica.
- 5. Las serpientes coral del género Micrurus producen principalmente:**
- A. Cuadro biliar crónico.
  - B. Colitis disintérica.
  - C. Cuadro neurotóxico.
  - D. Bronquiolitis.
  - E. Mononucleosis.

- 6. La conducta prehospitalaria adecuada tras mordedura sospechosa incluye:**
- A. Torniquete apretado prolongado.
  - B. Cortes y succión de la herida.
  - C. Aplicar hielo directo por horas.
  - D. Dar alcohol para analgesia.
  - E. Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.

- 7. El tratamiento específico de un envenenamiento ofídico moderado o severo es:**
- A. Antiviral de amplio espectro.
  - B. Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad.

- C. Albendazol por 3 días.
- D. Vacuna SRP de urgencia.
- E. Antihistaminico como unica medida.

**8. Para decidir gravedad y seguimiento, que estudios son más pertinentes?**

- A. Papanicolau y colposcopia.
- B. Gota gruesa y gota fina exclusivamente.
- C. Coprocultivo de rutina.
- D. Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local.
- E. Serologia de VEB.

**9. Ante una mordedura, la identificacion de la serpiente debe:**

- A. Ser obligatoria antes de todo tratamiento.
- B. Realizarse capturando siempre el animal vivo.
- C. Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.
- D. Sustituir la evaluacion clinica.
- E. Evitar el uso de antiveneno.

**10. La importancia de la guía nacional de accidentes ofidicos se relaciona con:**

- A. Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.
- B. Eliminar todos los reptiles del país.
- C. Diagnosticar virosis respiratorias.
- D. Tratar parásitosis intestinales.
- E. Reemplazar vacunacion humana.

## Gabarito comentado

### Generalidades de Virología

1. Respuesta: C) Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: la regla general de virología básica: el genoma viral es de ADN o de ARN; no combina ambos como genoma propio. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Puede llevar ambos si posee envoltura lipídica.": una membrana lipídica externa con glucoproteínas; facilita entrada/salida, pero vuelve al virus más sensible a detergentes y desecación. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Puede llevar ambos durante la fase de eclipse.": fase inicial tras entrada viral en la que no se detectan viriones infecciosos completos; no significa que el virus tenga ADN y ARN simultáneamente. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."
- c) Correcta. "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "El ARN aparece solo en virus de cápside desnuda.": un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."
- e) No. Esa opción apunta a "El ADN aparece solo en virus con simetría helicoidal.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."

2. Respuesta: A) Capside desnuda proteica.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Capside desnuda proteica." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Capside desnuda proteica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Envoltura con glucoproteínas.": una membrana externa con espículas; ayuda a unión y fusión, pero no explica resistencia al ácido o detergentes. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."
- c) No. Aquí se está describiendo "Genoma segmentado.": un genoma dividido en segmentos. Es muy importante en influenza y rotavirus porque favorece reorganización genética, pero no explica por sí solo resistencia ambiental. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."
- d) No. Esa opción apunta a "Transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Simetría compleja.": una forma de organización del virión, como ocurre en algunos virus grandes; no define el tipo de ácido nucleico ni la resistencia ambiental. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."

3. Respuesta: E) Nucleocápside.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Nucleocápside." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: el conjunto formado por ácido nucleico viral más cápside proteica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Envoltura viral.": la membrana lipídica externa de algunos virus. Es distinta de la nucleocápside, porque no incluye el ácido nucleico con su cápside. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleocápside."
- b) No. Aquí se está describiendo "Peplómero viral.": una espícula o proyección de la envoltura viral, no el conjunto cápside-genoma. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleocápside."
- c) No. Esa opción apunta a "Cuerpo de inclusión.": acúmulo intracelular visible por replicación o productos virales; no es una estructura básica del virión. No

debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleocápside."

- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Viroplasma.": zona intracelular de ensamblaje o replicación viral, especialmente descrita en algunos virus, no la nucleocápside. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleocápside."
- e) Correcta. "Nucleocápside." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

4. Respuesta: B) PCR o RT-PCR.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "PCR o RT-PCR." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: una prueba molecular: PCR detecta ADN y RT-PCR detecta ARN después de convertirlo a ADN complementario. Se usa cuando se quiere demostrar directamente material genético del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Prueba de coagulasa.": una prueba enzimática usada sobre todo para identificar *Staphylococcus aureus*; pertenece a bacteriología, no al diagnóstico viral directo. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR o RT-PCR."
- b) Correcta. "PCR o RT-PCR." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Prueba de ureasa.": una prueba metabólica bacteriana, por ejemplo relacionada con bacterias ureasa positivas; no identifica virus por material genético. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR o RT-PCR."
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Coprocultivo bacteriano.": un cultivo de materia fecal para bacterias entéricas; no es la herramienta principal para un virus ni para protozoarios/helminthos si se busca la forma parasitaria. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR o RT-PCR."
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Tinción de Gram.": una coloración para bacterias que diferencia Gram positivas y Gram negativas; no detecta directamente genomas virales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR o RT-PCR."

5. Respuesta: D) Mayor sensibilidad a detergentes.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Mayor sensibilidad a detergentes." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: lo que ocurre en virus envueltos: los detergentes alteran la membrana lipídica y disminuyen la infectividad. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Mayor resistencia a bilis.": una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mayor sensibilidad a detergentes."
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Mayor tolerancia a desecación.": resistencia al ambiente seco. Se espera más en virus desnudos, no en virus envueltos, porque la envoltura lipídica se daña con facilidad. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mayor sensibilidad a detergentes."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Mayor estabilidad en aguas residuales.": un rasgo más compatible con virus desnudos resistentes o enterovirus; no es la consecuencia típica de tener envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mayor sensibilidad a detergentes."
- d) Correcta. "Mayor sensibilidad a detergentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo "Mayor resistencia a pH ácido.": una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mayor sensibilidad a detergentes."

6. Respuesta: A) Citolisis viral.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citolisis viral." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: destrucción de la célula infectada por replicación y liberación viral; es una forma directa de citopatogenia. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Citolisis viral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Latencia antigenica.": una forma imprecisa de hablar de persistencia sin replicación productiva; no equivale a destrucción celular por replicación. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citolisis viral."
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Tolerancia humoral.": un fenómeno

inmunológico donde la respuesta de anticuerpos no se activa adecuadamente; no describe daño celular por virus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citólisis viral."

d) No. Aquí se está describiendo "Recombinación bacteriana.": intercambio genético entre bacterias; no describe citopatogenia viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citólisis viral."

e) No. Esa opción apunta a "Antagonismo fúngico.": interacción o competencia entre hongos u otros microorganismos; no explica lesión viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citólisis viral."

7. Respuesta: C) Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: característica de virus envueltos: los solventes/detergentes dañan la envoltura y disminuyen infectividad. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Envoltura - resistencia extrema a ácido.": resistencia al pH ácido, típica de muchos virus desnudos y enterovirus, no de virus envueltos. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Capside desnuda - mayor fragilidad ambiental.": un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos."

c) Correcta. "Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esa opción apunta a "ARN - imposibilidad de variación genética.": una afirmación falsa para virus ARN: suelen variar con facilidad por mutación y otros mecanismos. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ADN - transmisión solo vectorial.": una restricción incorrecta: los virus pueden transmitirse por vía respiratoria, fecal-oral, sexual, vertical, zoonótica o vectorial según el caso. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos."

8. Respuesta: E) Es un parásito intracelular obligado.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Es un parásito intracelular obligado." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: organismo que necesita entrar en células para multiplicarse; en virología describe la dependencia absoluta del virus de la célula hospedadora. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Es una célula procariota atípica.": una bacteria o arquea, con metabolismo propio; los virus no son células. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es un parásito intracelular obligado."

b) No. Aquí se está describiendo "Es un hongo intracelular facultativo.": un concepto de micología. Sirve para hongos, pero no explica el agente o mecanismo evaluado en esta pregunta. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es un parásito intracelular obligado."

c) No. Esa opción apunta a "Es una bacteria sin pared celular.": como Mycoplasma; sigue siendo una bacteria con metabolismo, no un virus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es un parásito intracelular obligado."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Es un protozoo con metabolismo reducido.": un eucariota unicelular parásito; no corresponde a virus, que dependen de la maquinaria celular. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es un parásito intracelular obligado."

e) Correcta. "Es un parásito intracelular obligado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

9. Respuesta: B) Liberación del genoma viral.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Liberación del genoma viral." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: desnudamiento/uncoating: después de entrada, el genoma queda disponible para transcripción o replicación. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Formación de anticuerpos IgG.": respuesta inmune adaptativa posterior a la infección; no es un paso temprano de replicación viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación del genoma viral."

b) Correcta. "Liberación del genoma viral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eliminación renal del virión.": un destino de eliminación del organismo, no una etapa de replicación

viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación del genoma viral."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Producción de exotoxinas.": mecanismo clásico de bacterias toxigénicas; los virus no producen exotoxinas bacterianas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación del genoma viral."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Encapsulación por eosinófilos.": respuesta inflamatoria más relacionada con parásitos o alergia; no es un paso replicativo viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación del genoma viral."

10. Respuesta: D) Vías epidemiológicas de virus estudiados.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Vías epidemiológicas de virus estudiados." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: formas de transmisión de los virus del curso: respiratoria, fecal-oral, sexual, vectorial y zoonótica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Fases morfológicas de protozoarios.": formas como quiste y trofozoito en protozoarios; no resume vías epidemiológicas virales. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías epidemiológicas de virus estudiados."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Tipos de inmunidad bacteriana.": clasificación de defensa contra bacterias; no es la lista de vías de transmisión viral. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías epidemiológicas de virus estudiados."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Etapas de esporulación fungica.": proceso reproductivo o de resistencia de hongos; no se aplica a virus. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías epidemiológicas de virus estudiados."

d) Correcta. "Vías epidemiológicas de virus estudiados." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo "Clases de antibióticos betalactámicos.": grupo de antibióticos contra bacterias con pared celular; no clasifica vías de transmisión viral. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías epidemiológicas de virus estudiados."

11. Respuesta: A) Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico.

Respuesta correcta: A) Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico.

Los virus poseen un solo tipo de ácido nucleico como genoma: ADN o ARN. Esa regla permite clasificarlos y evita confundir material genómico con intermediarios de replicación.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Carecen de ácido nucleico y se replican mediante proteínas estructurales. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Pueden contener tanto ADN como ARN en una misma partícula.

representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. El genoma siempre es una cadena doble de ADN circular. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

12. Respuesta: A) Nanómetros (nm)

Respuesta correcta: A) Nanómetros (nm)

El tamaño de los viriones se expresa habitualmente en nanómetros porque son partículas submicroscópicas, menores que bacterias y células eucariotas.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Nanómetros (nm) coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Micrómetros (µm) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Milímetros (mm) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Angstroms (Å) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

13. Respuesta: D) El ácido nucleico asociado a la cápside proteica.

Respuesta correcta: D) El ácido nucleico asociado a la cápside proteica.

La nucleocápside es el conjunto formado por el ácido nucleico viral y la cápside proteica que lo rodea.

Análisis de las alternativas:

A) No. La envoltura lipídica y las glucoproteínas externas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. El conjunto de capsómeros antes de unirse al genoma. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. La membrana plasmática de la célula que rodea al virus. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. El ácido nucleico asociado a la cápside proteica. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

14. Respuesta: A) Núcleo

Respuesta correcta: A) Núcleo

La mayoría de los virus ADN replica su genoma en el núcleo, porque allí utiliza o imita mecanismos celulares de síntesis de ADN.



Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. Núcleo coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
B) No. Reticulo endoplásmico representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. Aparato de Golgi representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Citoplasma representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

15. Respuesta: C) Periodo de latencia

Respuesta correcta: C) Periodo de latencia

La latencia describe la permanencia del virus en reposo, sin replicación productiva ni síntomas evidentes, con posibilidad de reactivación posterior.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Infección lítica representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Periodo de eclipse representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) Correcta. Periodo de latencia coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
D) No. Fase prodrómica representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

16. Respuesta: D) La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada.

Respuesta correcta: D) La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada.

La infección transformadora implica persistencia o integración de material viral capaz de alterar el control del ciclo celular y favorecer proliferación descontrolada.

Análisis de las alternativas:

- A) No. La replicación viral continua a niveles muy bajos sin matar la célula. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. El fracaso total de la entrada del virus a la célula diana. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. La muerte rápida de la célula por lisis. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) Correcta. La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

17. Respuesta: C) Gemación

Respuesta correcta: C) Gemación

Los virus envueltos suelen salir por gemación, tomando parte de membranas celulares como envoltura.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Difusión simple representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Lisis celular representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) Correcta. Gemación coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
D) No. Endocitosis inversa representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

18. Respuesta: D) Orthomyxoviridae

Respuesta correcta: D) Orthomyxoviridae

Orthomyxoviridae incluye los virus influenza, que poseen genoma de ARN segmentado y causan la gripe.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Picornaviridae representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Coronaviridae representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. Retroviridae representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) Correcta. Orthomyxoviridae coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

19. Respuesta: C) RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa)

Respuesta correcta: C) RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa)

La RT-PCR es el método molecular estándar para detectar genomas de ARN viral porque primero convierte ARN en ADN complementario y luego lo amplifica.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Hibridación in situ (FISH) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Microscopía electrónica representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) Correcta. RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa) coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
D) No. PCR convencional representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

20. Respuesta: B) Adenovirus

Respuesta correcta: B) Adenovirus

Adenovirus es un virus ADN sin envoltura; por eso tiene cápside desnuda y buena resistencia ambiental.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Herpesvirus representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) Correcta. Adenovirus coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
C) No. Hepadnavirus representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Poxvirus representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

21. Respuesta: C) Pródromos

Respuesta correcta: C) Pródromos

Los pródromos son síntomas iniciales inespecíficos, como fiebre o malestar, que preceden a manifestaciones más características.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Recidiva representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Viremia representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) Correcta. Pródromos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
D) No. Resolución representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

## Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8

1. Respuesta: A) Latencia en ganglios sensoriales.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Latencia en ganglios sensoriales." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: persistencia del herpes simple en neuronas sensitivas; explica recurrencias en la misma región. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Latencia en ganglios sensoriales." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
b) No. El concepto de esta alternativa es "Mutación diaria de la cápside.": una formulación exagerada e inespecífica; las recurrencias de VHS se explican por latencia/reactivación, no por cambio diario de cápside. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales."  
c) No. Esta alternativa se refiere a "Eliminación completa del genoma.": lo contrario de latencia: si el genoma desapareciera totalmente, no habría recurrencias por el mismo virus. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales."  
d) No. Aquí se está describiendo "Replicación exclusiva en eritrocitos.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales."  
e) No. Esa opción apunta a "Resistencia por cápside desnuda.": un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales."

2. Respuesta: E) Piel o mucosa lesionada.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Piel o mucosa lesionada." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: puerta de entrada del VHS: el virus necesita mucosa o piel con microlesiones porque la piel intacta resiste más. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Eritrocito maduro intacto.": célula sin núcleo, importante en malaria o anemia, pero no es puerta de entrada del VHS. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada."  
b) No. Esta alternativa se refiere a "Hepatocito sin receptor.": célula hepática sin relación con la entrada típica del VHS por piel o mucosas lesionadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada."  
c) No. Aquí se está describiendo "Hueso cortical compacto.": tejido óseo, no una superficie epitelial de entrada para herpes simple. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada."  
d) No. Esa opción apunta a "Cartilago articular sano.": tejido conectivo articular; no corresponde al tropismo inicial del VHS. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada."  
e) Correcta. "Piel o mucosa lesionada." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

3. Respuesta: B) Replicación del ADN viral.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Replicación del ADN viral." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: función asociada a proteínas beta en herpes simple, dentro de la secuencia alfa-beta-gamma. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Ensamble tardío de cápside.": fase más relacionada con proteínas gamma, porque participan en formación/ensamblaje de partículas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replicación del ADN viral."  
b) Correcta. "Replicación del ADN viral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esa opción apunta a "Bloqueo de la fusión celular.": inhibiría un efecto citopático; no corresponde a la función beta de herpes, que se vincula a replicación del ADN. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replicación del ADN viral."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Formación de ooquistes.": proceso de parásitos como Toxoplasma en felinos; no existe en replicación de herpes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replicación del ADN viral."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Maduración en mosquito.": fase de ciclos vectoriales como malaria o arbovirus; no corresponde a VHS. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replicación del ADN viral."

4. Respuesta: D) Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zóster, ese dato encaja con el tema de virología: secuencia de varicela-zóster: infección primaria, latencia neuronal y zóster al reactivarse. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Infección intestinal, quiste y excitación.": secuencia propia de protozoarios intestinales con quistes; no explica varicela-zóster. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación."

b) No. Esa opción apunta a "Bacteriemia primaria, endospora y toxina.": terminología bacteriana; no describe la biología del VVZ. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Viremia nula, eliminación total y reinfección.": niega la latencia: si el virus se eliminara, el zóster no sería reactivación del mismo virus. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación."

d) Correcta. "Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Vectorización, esporozoito y merozoito.": vocabulario de malaria: esporozoito y merozoito pertenecen a Plasmodium, no a VVZ. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación."

5. Respuesta: A) Establecer infección persistente de por vida.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Establecer infección persistente de por vida." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zóster, ese dato encaja con el tema de virología: propiedad central de los herpesvirus: permanecen latentes y pueden reactivarse. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Establecer infección persistente de por vida." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vivir libremente fuera de células.": sería vida extracelular independiente; los herpesvirus son intracelulares obligados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Establecer infección persistente de por vida."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Formar huevos en heces humanas.": característica de helmintos, no de herpesvirus. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Establecer infección persistente de por vida."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Replicarse solo en citoplasma sin núcleo.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Establecer infección persistente de por vida."

e) No. Aquí se está describiendo "Tener ARN segmentado negativo.": un genoma dividido en segmentos, importante en influenza y rotavirus; permite reorganización si dos cepas infectan la misma célula. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Establecer infección persistente de por vida."

6. Respuesta: C) Pueden producir morbilidad significativa.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Pueden producir morbilidad significativa." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zóster, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Nunca reactivan en inmunidad normal.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del

enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pueden producir morbilidad significativa."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Son siempre benignos en todo hospedador.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pueden producir morbilidad significativa."

c) Correcta. "Pueden producir morbilidad significativa." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Aquí se está describiendo "No inducen infección latente.": niega una propiedad esencial de Herpesviridae: latencia con reactivación. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pueden producir morbilidad significativa."

e) No. Esa opción apunta a "Carecen de tropismo tisular.": incorrecto: herpesvirus tienen tropismos definidos, como neuronas sensitivas para latencia de VHS/VVZ. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pueden producir morbilidad significativa."

7. Respuesta: E) Células gigantes multinucleadas.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Células gigantes multinucleadas." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zóster, ese dato encaja con el tema de virología: efecto citopático por fusión celular; apoya herpesvirus o paramixovirus según el contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Huevos mamelonados.": huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células gigantes multinucleadas."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Larvas filariformes.": larvas infectantes de Strongyloides/uncinarias; no son efecto citopático viral. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células gigantes multinucleadas."

c) No. Aquí se está describiendo "Quistes con cuatro núcleos.": quistes de Entamoeba histolytica; no son células infectadas por herpes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células gigantes multinucleadas."

d) No. Esa opción apunta a "Eritrocitos parasitados en anillo.": forma eritrocitaria de Plasmodium; no corresponde a herpesvirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células gigantes multinucleadas."

e) Correcta. "Células gigantes multinucleadas." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

8. Respuesta: B) Neurona de ganglio sensorial.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Neurona de ganglio sensorial." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zóster, ese dato encaja con el tema de virología: sitio clásico de latencia de VHS y VVZ; por eso puede reactivarse. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Macrófagos esplénicos.": células fagocíticas del bazo; no son el sitio clásico de latencia de VHS. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial."

b) Correcta. "Neurona de ganglio sensorial." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esa opción apunta a "Hepatocito periportal.": célula hepática; importante en malaria u otros agentes, no en latencia de VHS. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eritroblasto medular.": precursor eritroide de médula ósea; clave para parvovirus B19, no para herpes simple. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Queratinocito cornificado.": célula epitelial superficial queratinizada; HPV infecta queratinocitos, pero la latencia de VHS es neuronal. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial."

9. Respuesta: D) Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zóster, ese dato encaja con el tema de virología: comparación correcta de VHS-1 y VHS-2: comparten estructura y biología, pero se asocian a patrones clínicos distintos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "No comparten ADN ni antígenos.": componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero

difieren en patrones clínicos frecuentes."

b) No. Esa opción apunta a "Ambos son virus ARN envueltos.": falso para VHS-1/VHS-2: son virus ADN envueltos que replican en el núcleo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Solo VHS-2 puede permanecer latente.": falso: tanto VHS-1 como VHS-2 pueden establecer latencia. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes."

d) Correcta. "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Solo VHS-1 se replica en núcleo.": falso: ambos tipos de herpes simple son virus ADN que replican en el núcleo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes."

10. Respuesta: C) PCR para ADN viral.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "PCR para ADN viral." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: una prueba molecular directa para buscar ADN viral en la muestra clínica; en LCR es muy útil ante encefalitis por herpes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Hemocultivo anaerobio.": un cultivo de sangre para bacterias anaerobias; no sirve como prueba directa de encefalitis herpética. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral."

c) Correcta. "PCR para ADN viral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Gota gruesa de malaria.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral."

e) No. Aquí se está describiendo "Busqueda de huevos operculados.": huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral."

11. Respuesta: E) Virus Epstein-Barr.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Virus Epstein-Barr." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: herpesvirus transmitido por saliva, con tropismo por linfocitos B y relación con mononucleosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Citomegalovirus.": herpesvirus que puede causar mononucleosis heterófila negativa y enfermedad congénita o en inmunodeprimidos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Virus herpes humano 8.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Adenovirus entérico.": virus ADN bicatenario lineal, sin envoltura, con resistencia ambiental y tropismo respiratorio, ocular, digestivo y urinario. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."

d) No. Aquí se está describiendo "Parvovirus B19.": virus pequeño ADN monocatenario, tropismo por precursores eritroides; causa eritema infeccioso y crisis aplásica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."

e) Correcta. "Virus Epstein-Barr." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

12. Respuesta: B) Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: base de la mononucleosis por VEB: los linfocitos T reaccionan contra B infectados. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Lisis de eritrocitos por toxina preformada.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."

b) Correcta. "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "Migración larvaria hacia pulmon.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."

d) No. Esa opción apunta a "Destrucción directa de hepatocitos por ooquistes.": célula hepática donde Plasmodium se multiplica primero tras inoculación por mosquito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Replicación viral exclusiva en neutrófilos.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."

13. Respuesta: D) Linfocito B.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Linfocito B." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: célula diana y reservorio de latencia del VEB; al activarse la respuesta T aparecen linfocitos atípicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Eritrocito maduro.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Linfocito B."

b) No. Aquí se está describiendo "Neurona motora.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Linfocito B."

c) No. Esa opción apunta a "Miocito esquelético.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Linfocito B."

d) Correcta. "Linfocito B." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Célula parietal gástrica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Linfocito B."

14. Respuesta: A) Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Neoplasias y leucoplasia vellosa oral." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Neoplasias y leucoplasia vellosa oral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "Tos ferina y bronquiolitis neonatal.": enfermedad bacteriana por Bordetella pertussis; no se explica por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neoplasias y leucoplasia vellosa oral."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Larva migrans ocular por nematodo.": cuadro por Toxocara, un nematodo, no por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neoplasias y leucoplasia vellosa oral."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Hidatidosis hepática multivesicular.": infección por Echinococcus con quistes, no enfermedad por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neoplasias y leucoplasia vellosa oral."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Anemia por uncinarias.": anemia por pérdida crónica de sangre intestinal causada por hookworms, no por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neoplasias y leucoplasia vellosa oral."

15. Respuesta: C) Exantema subito.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Exantema subito." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: roseola infantil, clásicamente asociada a VHH-6 y también VHH-7. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Rabia furiosa.": rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema subito.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Condiloma acuminado.": verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema subito.".
- c) Correcta. "Exantema subito." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Fiebre amarilla urbana.": flavivirus prevenible con vacuna específica. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema subito.".
- e) No. Aquí se está describiendo "Parálisis flácida poliomiélica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema subito.".

16. Respuesta: E) Sarcoma de Kaposi.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Sarcoma de Kaposi." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eritema infeccioso.": cuadro clásico de parvovirus B19, no de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Sarcoma de Kaposi.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Panencefalitis esclerosante.": complicación tardía de sarampión, no asociación principal de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Sarcoma de Kaposi.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Gastroenteritis por rotavirus.": diarrea viral infantil por Reovirus, no enfermedad por VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Sarcoma de Kaposi.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Quiste hidatídico.": lesión por Echinococcus granulosus; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Sarcoma de Kaposi.".
- e) Correcta. "Sarcoma de Kaposi." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

17. Respuesta: B) Infección materna y daño fetal compatible.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Infección materna y daño fetal compatible." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Ingestión de pescado crudo con B12 baja.": vía de Diphyllbothrium latum, no de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección materna y daño fetal compatible.".
- b) Correcta. "Infección materna y daño fetal compatible." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Mordedura de perro con hidrofobia.": vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección materna y daño fetal compatible.".
- d) No. Esa opción apunta a "Prurito anal nocturno familiar.": dato de Enterobius vermicularis, no de CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección materna y daño fetal compatible.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Piodermitis por estreptococo.": infección bacteriana cutánea, no cuadro congénito por CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección materna y daño fetal compatible.".

18. Respuesta: D) Inclusiones intranucleares en ojo de buho.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Inclusiones intranucleares en ojo de buho." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: inclusiones intranucleares grandes típicas de citomegalovirus; ayudan a recordar el efecto citopático de CMV. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Huevos con espinas laterales.": característica de huevos de Schistosoma mansoni, no de Fasciola. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Trofozoitos con eritrocitos ingeridos.": células

sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho.".

c) No. Esa opción apunta a "Capsides desnudas en forma de bala.": morfología clásica del virus rábico. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho.".

d) Correcta. "Inclusiones intranucleares en ojo de buho." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Larvas en cinta adhesiva.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho.".

19. Respuesta: C) Citomegalovirus.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citomegalovirus." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: herpesvirus que puede causar mononucleosis heterófila negativa y enfermedad congénita o en inmunodeprimidos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Rabdovirus.": familia del virus de la rabia; no explica mononucleosis heterófila negativa por CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus.".
- b) No. Esa opción apunta a "Dengue primario.": arbovirus por Flavivirus; no causa mononucleosis heterófila negativa típica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus.".
- c) Correcta. "Citomegalovirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Fasciola hepática.": trematodo hepático adquirido por metacercarias; no produce mononucleosis viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus.".
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Taenia saginata.": cestodo de carne bovina; no produce mononucleosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus.".

20. Respuesta: A) VEB - saliva - linfocito B.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "VEB - saliva - linfocito B." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: célula diana y reservorio de latencia del VEB; al activarse la respuesta T aparecen linfocitos atípicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "VEB - saliva - linfocito B." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "CMV - mosquito - hepatocito exclusivo.": relación incorrecta: CMV no se transmite por mosquito ni es exclusivo de hepatocitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B.".
- c) No. El concepto de esta alternativa es "VHH-8 - agua - enterocito.": relación incorrecta: VHH-8 no se transmite por agua ni tiene como blanco principal el enterocito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "VHH-6 - carne cruda - músculo.": relación incorrecta: VHH-6/VHH-7 se asocian a exantema súbito, no a carne cruda/músculo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B.".
- e) No. Aquí se está describiendo "VEB - garrapata - eritrocito.": relación incorrecta: VEB se transmite por saliva y se relaciona con linfocito B, no con garrapatas/eritrocitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B.".

21. Respuesta: D) Linfocitos B

Respuesta correcta: D) Linfocitos B

El VEB permanece latente sobre todo en linfocitos B, lo que explica persistencia y reactivaciones asociadas a inmunidad celular.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Células epiteliales de la bucofaringe representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) No. Monocitos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) No. Linfocitos T protectores representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) Correcta. Linfocitos B coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

22. Respuesta: B) Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T

Respuesta correcta: B) Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T. La mononucleosis por VEB se debe en gran parte a una respuesta intensa de linfocitos T contra linfocitos B infectados.

Análisis de las alternativas:

- A) No. La lisis directa de todas las células epiteliales infectadas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo

preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Una respuesta inmunitaria ausente o ineficaz representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. La producción exclusiva de anticuerpos heterófilos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

23. Respuesta: C) Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado

Respuesta correcta: C) Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado

Las células de Downey son linfocitos T reactivos atípicos, con citoplasma abundante basófilo y núcleo ovalado, típicos de mononucleosis.

Análisis de las alternativas:

A) No. Células epiteliales con aspecto vellosa en la cavidad bucal representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Cuerpos de inclusión basófilos en forma de 'ojo de búho' representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Linfocitos B monoclonales con mandíbula deformada representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

24. Respuesta: A) Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa

Respuesta correcta: A) Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa  
La tríada clásica de mononucleosis incluye linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa, frecuentemente con fiebre y fatiga.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Fiebre súbita, convulsiones y exantema generalizado representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Microcefalia, ictericia y calcificación intracerebral representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Fatiga crónica, cefalea y diarrea persistente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

25. Respuesta: A) Leucoplasia vellosa oral

Respuesta correcta: A) Leucoplasia vellosa oral

La leucoplasia vellosa oral es una manifestación oportunista asociada a VEB en inmunodeprimidos, especialmente en SIDA.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Leucoplasia vellosa oral coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Linfoma de Burkitt representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Retinitis por VEB representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Carcinoma nasofaríngeo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

26. Respuesta: A) Saliva

Respuesta correcta: A) Saliva

La saliva es una vía importante de transmisión del CMV en el material, especialmente por contacto estrecho y secreciones corporales.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Saliva coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Aerosoles respiratorios representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Semen representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Lágrimas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

27. Respuesta: B) Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho'

Respuesta correcta: B) Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho'

El CMV produce citomegalia e inclusiones intranucleares características en "ojo de búho".

Análisis de las alternativas:

A) No. Células epiteliales con inclusiones intracitoplasmáticas filamentosas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho' coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Presencia de linfocitos de Downey representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Linfocitos B policlonales en proliferación representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

28. Respuesta: B) Citomegalovirus (CMV)

Respuesta correcta: B) Citomegalovirus (CMV)

El CMV es una causa viral importante y frecuente de anomalías congénitas cuando hay infección materno-fetal.

Análisis de las alternativas:

A) No. Virus de la Malaria representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Citomegalovirus (CMV) coincide con el dato central del enunciado y

con la clase correspondiente.

C) No. Virus Herpes Humano 6 (VHH-6) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Virus de Epstein-Barr (VEB) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

29. Respuesta: B) Monocitos y linfocitos

Respuesta correcta: B) Monocitos y linfocitos

El CMV puede permanecer latente en monocitos y linfocitos, además de reactivarse en inmunodepresión.

Análisis de las alternativas:

A) No. Células epiteliales y endoteliales representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Monocitos y linfocitos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Linfocitos B únicamente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Neuronas sensoriales representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

30. Respuesta: A) Neumonía y hepatitis

Respuesta correcta: A) Neumonía y hepatitis

En prematuros, la transfusión con CMV puede causar infección grave, destacando neumonía y hepatitis.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Neumonía y hepatitis coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Convulsiones febriles representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Pérdida auditiva bilateral representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Sarcoma de Kaposi representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

31. Respuesta: C) VHH-6B y VHH-7

Respuesta correcta: C) VHH-6B y VHH-7

La roséola o exantema súbito se asocia clásicamente a VHH-6B y también a VHH-7.

Análisis de las alternativas:

A) No. VHS-1 y VHS-2 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. VHH-8 únicamente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. VHH-6B y VHH-7 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. VEB y CMV representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

32. Respuesta: D) Convulsiones febriles

Respuesta correcta: D) Convulsiones febriles

En lactantes, VHH-6 puede asociarse a fiebre alta y convulsiones febriles, por eso ese dato merece atención.

Análisis de las alternativas:

A) No. Linfoma africano representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Ruptura del bazo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Ceguera por retinitis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Convulsiones febriles coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

33. Respuesta: D) Llagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito

Respuesta correcta: D) Llagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito

El exantema de la roséola suele ser rosado, poco elevado y no pruriginoso, después de la fiebre.

Análisis de las alternativas:

A) No. Vesículas dolorosas en dermatomas específicos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Exudado blanquecino en la faringe con fatiga extrema representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Pápulas umbilicadas que pican intensamente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Llagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

34. Respuesta: C) Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños

Respuesta correcta: C) Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños

El contacto temprano con VEB tiende a producir infección más benigna o subclínica que la primoinfección en adolescentes.

Análisis de las alternativas:

A) No. Aislamiento total de los niños para evitar la infección latente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Vacunación obligatoria antes de los 2 años representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Administración de ganciclovir profiláctico en guarderías representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.



35. Respuesta: D) Sondas de ADN y PCR

Respuesta correcta: D) Sondas de ADN y PCR

PCR o sondas de ADN se reservan para situaciones graves o especiales, cuando se necesita demostrar directamente el material viral.

Análisis de las alternativas:

A) No. Aislamiento viral en cultivo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Prueba de anticuerpos heterófilos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Citología de linfocitos atípicos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Sondas de ADN y PCR coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

36. Respuesta: B) Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis

Respuesta correcta: B) Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis

VEB puede asociarse a complicaciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis.

Análisis de las alternativas:

A) No. Retraso mental profundo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Sordera unilateral representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Convulsiones febriles representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

37. Respuesta: A) Niños en África con malaria

Respuesta correcta: A) Niños en África con malaria

El linfoma de Burkitt endémico se asocia a niños de África y se relaciona con la coexistencia de malaria como factor coadyuvante.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Niños en África con malaria coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Pacientes con SIDA en Europa representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Neonatos en América con CMV representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Adultos en Asia con carcinoma nasofaríngeo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

38. Respuesta: C) Cuadro crónico

Respuesta correcta: C) Cuadro crónico

Cuando los síntomas de mononucleosis se prolongan más de cuatro semanas, el cuadro se clasifica como crónico según el material.

Análisis de las alternativas:

A) No. Enfermedad linfoproliferativa mortal representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Recidiva latente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Cuadro crónico coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Infección lítica aguda representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

39. Respuesta: C) La infección primaria es extremadamente grave para el feto

Respuesta correcta: C) La infección primaria es extremadamente grave para el feto

La infección primaria por CMV durante el embarazo tiene mayor riesgo fetal que una recidiva, porque no existe inmunidad previa protectora.

Análisis de las alternativas:

A) No. Ambas tienen el mismo riesgo de malformaciones representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Solo la recidiva se transmite por vía ascendente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. La infección primaria es extremadamente grave para el feto coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. La recidiva siempre causa microcefalia representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

40. Respuesta: D) Secreciones bucales (saliva y aerosoles)

Respuesta correcta: D) Secreciones bucales (saliva y aerosoles)

VHH-6 y VHH-7 se transmiten principalmente por secreciones bucales, saliva y aerosoles.

Análisis de las alternativas:

A) No. Leche materna únicamente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Sangre y derivados representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Orina y lágrimas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Secreciones bucales (saliva y aerosoles) coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

41. Respuesta: D) Pacientes con SIDA

Respuesta correcta: D) Pacientes con SIDA

En pacientes con SIDA, CMV puede causar enfermedad gastrointestinal como esofagitis y colitis.

Análisis de las alternativas:

A) No. Ancianos con mononucleosis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Mujeres embarazadas seropositivas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Niños sanos en edad escolar representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Pacientes con SIDA coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

42. Respuesta: A) La mayoría de los adultos

Respuesta correcta: A) La mayoría de los adultos

La mayoría de adultos puede tener VHH-6 en saliva, lo que facilita transmisión por secreciones orales.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. La mayoría de los adultos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Solo aquellos que trabajan en hospitales representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Menos del 10% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Únicamente adultos con SIDA representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

43. Respuesta: B) La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos

Respuesta correcta: B) La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos

La mononucleosis por CMV suele ser negativa para anticuerpos heterófilos, a diferencia de la mononucleosis clásica por VEB.

Análisis de las alternativas:

A) No. El CMV no causa fiebre ni fatiga representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. El VEB no produce linfocitosis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Solo el VEB se transmite por la saliva representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

44. Respuesta: B) Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal

Respuesta correcta: B) Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal

Sin inmunidad celular, VEB puede inducir proliferación policlonal de linfocitos B potencialmente mortal.

Análisis de las alternativas:

A) No. Desarrollan inmunidad natural permanente sin síntomas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. El virus no puede infectarlos al no haber linfocitos T representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Sufren únicamente de faringitis leve recurrente representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

45. Respuesta: A) Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos

Respuesta correcta: A) Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos

Evitar compartir vasos, cepillos y objetos personales disminuye el contacto con saliva infectante y reduce transmisión de VEB.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Uso de mascarillas N95 en lugares públicos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Tratamiento profiláctico con aciclovir a toda la población representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Vacunarse anualmente durante la adolescencia representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

## Papilomavirus

1. Respuesta: B) ADN circular bicatenario sin envoltura.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ADN circular bicatenario sin envoltura." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: la estructura de papilomavirus: ADN circular de doble cadena y cápside sin envoltura. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ARN segmentado con envoltura.": descripción de influenza, no de HPV. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN circular bicatenario sin envoltura."

b) Correcta. "ADN circular bicatenario sin envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esta alternativa se refiere a "ARN negativo helicoidal con envoltura.": rasgo de virus como rabia o paramixovirus, no de HPV. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer

"ADN circular bicatenario sin envoltura."

d) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario envuelto.": combinación que no corresponde a HPV; parvovirus tiene ADN monocatenario pero no envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN circular bicatenario sin envoltura."

e) No. Esa opción apunta a "ARN bicatenario con doble cápside.": rasgo de rotavirus/reovirus, no de HPV. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN circular bicatenario sin envoltura."

2. Respuesta: D) Papilomavirus humano.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Papilomavirus humano." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus ADN circular sin envoltura que infecta queratinocitos y produce verrugas/condilomas; algunos tipos son oncogénicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Rotavirus.": virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Papilomavirus humano."
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Rabdovirus.": familia del virus de la rabia; no explica mononucleosis heterófila negativa por CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Papilomavirus humano."
- c) No. Aquí se está describiendo "Citomegalovirus.": herpesvirus que puede causar mononucleosis heterófila negativa y enfermedad congénita o en inmunodeprimidos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Papilomavirus humano."
- d) Correcta. "Papilomavirus humano." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Plasmodium.": protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito Anopheles hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Papilomavirus humano."

3. Respuesta: A) Queratinocito infectado.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Queratinocito infectado." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Queratinocito infectado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo "Neurona de ganglio dorsal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Queratinocito infectado."
- c) No. Esa opción apunta a "Linfocito B de memoria.": sitio de latencia del VEB, no de HPV. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Queratinocito infectado."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eritroblasto medular.": precursor eritroide de médula ósea; clave para parvovirus B19, no para herpes simple. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Queratinocito infectado."
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Hepatocito periportal.": célula hepática; importante en malaria u otros agentes, no en latencia de VHS. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Queratinocito infectado."

4. Respuesta: C) HPV 16/18 - cáncer cervical.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "HPV 16/18 - cáncer cervical." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: tipo cutáneo relacionado con verrugas plantares, no con sarcoma de Kaposi. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "HPV 6/11 - alto riesgo cervical.": tipos de bajo riesgo relacionados con condilomas acuminados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV 16/18 - cáncer cervical."
- b) No. Esa opción apunta a "HPV 1 - sarcoma de Kaposi.": tipo cutáneo relacionado con verrugas plantares, no con sarcoma de Kaposi. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV 16/18 - cáncer cervical."
- c) Correcta. "HPV 16/18 - cáncer cervical." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "HPV 2 - encefalitis necrosante.": tipo cutáneo de verrugas comunes, no de encefalitis necrosante. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV 16/18 - cáncer cervical."
- e) No. Esta alternativa se refiere a "HPV 5 - paludismo grave.": tipo vinculado a epidermodisplasia verruciforme y lesiones cutáneas; no causa paludismo grave.

No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV 16/18 - cáncer cervical."

5. Respuesta: E) Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: proteínas reguladoras del ciclo celular inactivadas por E6/E7 de HPV de alto riesgo. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Producción de neurotoxina salival.": mecanismo de venenos o toxinas, no oncogénesis de HPV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales."
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Destrucción de eritrocitos por merozoitos.": mecanismo de malaria, no transformación celular por HPV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Bloqueo de canales de sodio bacterianos.": mecanismo farmacológico antibacteriano, no oncogénesis viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales."
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Formación de huevos en vía biliar.": proceso de Fasciola u otros helmintos, no HPV. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales."
- e) Correcta. "Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

6. Respuesta: B) HPV mucoso de bajo riesgo.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "HPV mucoso de bajo riesgo." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Adenovirus urinario.": adenovirus puede afectar aparato urinario, pero no es causa típica de condiloma acuminado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV mucoso de bajo riesgo."
- b) Correcta. "HPV mucoso de bajo riesgo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Virus de la rabia.": rabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV mucoso de bajo riesgo."
- d) No. Aquí se está describiendo "Toxoplasma tisular.": protozoo con quistes tisulares; no produce condiloma genital. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV mucoso de bajo riesgo."
- e) No. Esa opción apunta a "Diphyllobothrium.": cestodo del pescado asociado a B12 baja, no a condiloma genital. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "HPV mucoso de bajo riesgo."

7. Respuesta: D) Contacto sexual directo.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Contacto sexual directo." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Inhalación en cuevas.": posible vía de rabia en murciélagos, no de HPV genital. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contacto sexual directo."
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Picadura de Anopheles.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contacto sexual directo."
- c) No. Aquí se está describiendo "Ingestión de berro acuático.": vía de Fasciola hepática, no de HPV. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contacto sexual directo."
- d) Correcta. "Contacto sexual directo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Mordedura de perro.": vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contacto sexual directo."

8. Respuesta: C) La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda,

sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "El virus destruye siempre todo el epitelio basal en horas.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune..".

b) No. Aquí se está describiendo "El virus no infecta células humanas.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune..".

c) Correcta. "La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "La replicación ocurre solo en eritrocitos circulantes.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune..".

e) No. El concepto de esta alternativa es "La cápside tiene envoltura muy fragil.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune..".

9. Respuesta: A) Vacunación contra tipos oncogénicos.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Vacunación contra tipos oncogénicos." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: prevención primaria de lesiones malignas por HPV, antes o independientemente del tamizaje. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Vacunación contra tipos oncogénicos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "Suero antiofídico polivalente.": tratamiento específico del envenenamiento por serpiente, indicado según tipo y gravedad. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación contra tipos oncogénicos..".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cloración única del agua.": medida de saneamiento hídrico; no previene lesiones malignas por HPV. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación contra tipos oncogénicos..".

d) No. El concepto de esta alternativa es "Quimioprofilaxis antimalarica universal.": prevención de malaria, no de HPV. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación contra tipos oncogénicos..".

e) No. Esta alternativa se refiere a "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación contra tipos oncogénicos..".

10. Respuesta: E) Koilocitosis.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor al agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Koilocitosis." porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un cambio citopático de HPV: células escamosas con halo perinuclear y alteración nuclear, típico en tamizaje cervical. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Cuerpos de Negri.": inclusiones citoplasmáticas neuronales clásicas de rabia, observadas sobre todo en diagnóstico postmortem. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Koilocitosis..".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Células falciformes.": alteración eritrocitaria, no hallazgo citológico por HPV. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Koilocitosis..".

c) No. El concepto de esta alternativa es "Huevos mamelonados.": huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Koilocitosis..".

d) No. Esta alternativa se refiere a "Amastigotes en macrófagos.": forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Koilocitosis..".

e) Correcta. "Koilocitosis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

11. Respuesta: B) ADN circular bicatenario

Respuesta correcta: B) ADN circular bicatenario

El VPH posee ADN circular bicatenario y no tiene envoltura, rasgo estructural central de los papilomavirus.

Análisis de las alternativas:

A) No. ADN lineal monocatenario representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. ADN circular bicatenario coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. ARN circular bicatenario representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. ADN lineal bicatenario representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

12. Respuesta: C) Estrato espinoso

Respuesta correcta: C) Estrato espinoso

La replicación activa del VPH ocurre al diferenciarse los queratinocitos, especialmente en el estrato espinoso.

Análisis de las alternativas:

A) No. Estrato córneo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Hipodermis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Estrato espinoso coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Dermis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

13. Respuesta: C) Coilocitos

Respuesta correcta: C) Coilocitos

Los coilocitos son queratinocitos infectados por VPH con halo perinuclear y cambios nucleares/citoplasmáticos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Células de Langerhans representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Células de Merkel representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Coilocitos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Melanocitos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

14. Respuesta: A) VPH-6 y VPH-11

Respuesta correcta: A) VPH-6 y VPH-11

Los VPH 6 y 11 son de bajo riesgo y se asocian frecuentemente a condilomas y papilomas laríngeos.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. VPH-6 y VPH-11 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. VPH-1 y VPH-4 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. VPH-31 y VPH-45 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. VPH-16 y VPH-18 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

15. Respuesta: C) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Respuesta correcta: C) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La PCR permite confirmar y tipificar el genotipo específico de VPH con mayor precisión que la citología sola.

Análisis de las alternativas:

A) No. Inmunofluorescencia directa representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Citología (Papanicolaou) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Cultivo vírico representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

16. Respuesta: D) 99,7%

Respuesta correcta: D) 99,7%

La gran mayoría de neoplasias cervicales se asocia a VPH, y el material destaca una cifra cercana a 99,7%.

Análisis de las alternativas:

A) No. 30,0% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. 50,0% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. 70,0% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. 99,7% coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

17. Respuesta: A) Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales

Respuesta correcta: A) Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales

Una neoplasia es crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales, no solo infección lítica o lesión benigna.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Infección lítica sin proliferación celular representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Paso previo a una alteración de la función celular representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Resolución espontánea de una verruga representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

18. Respuesta: C) Cada 5 años

Respuesta correcta: C) Cada 5 años

Con tamizajes previos negativos, el material permite un intervalo ampliado de control; no corresponde hacerlo semestral ni una sola vez en la vida.

Análisis de las alternativas:

A) No. Anual representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Una sola vez en la vida representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Cada 5 años coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Cada 6 meses representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

19. Respuesta: A) No puede tratar ni curar una infección ya existente

Respuesta correcta: A) No puede tratar ni curar una infección ya existente

La vacuna contra VPH previene infecciones futuras, pero no cura ni elimina una infección ya establecida.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. No puede tratar ni curar una infección ya existente coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Es ineficaz si se administra antes de los 9 años representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Requiere una dosis única para protección de por vida representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Solo protege contra un único serotipo viral representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

20. Respuesta: A) Tabaquismo

Respuesta correcta: A) Tabaquismo

El tabaquismo favorece persistencia/progresión de lesiones por VPH hacia cáncer.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Tabaquismo coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Dieta alta en grasas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Consumo de alcohol representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Sedentarismo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

21. Respuesta: B) Ojo de gallo

Respuesta correcta: B) Ojo de gallo

Las verrugas plantares por VPH se conocen vulgarmente como "ojo de gallo".

Análisis de las alternativas:

A) No. Melanoma representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Ojo de gallo coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Condiloma representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Pápula representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

22. Respuesta: B) VPH-16 y VPH-18

Respuesta correcta: B) VPH-16 y VPH-18

VPH 16 y 18 explican la mayor parte de cánceres de cuello uterino, alrededor del 70% mundial.

Análisis de las alternativas:

A) No. VPH-1 y VPH-2 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. VPH-16 y VPH-18 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. VPH-6 y VPH-11 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. VPH-31 y VPH-33 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

23. Respuesta: B) El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles

Respuesta correcta: B) El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles

En latencia, el VPH permanece en queratinocitos sin producir lesiones visibles.

Análisis de las alternativas:

A) No. El sistema inmunitario elimina completamente el genoma viral del organismo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. El virus se replica masivamente destruyendo el estrato basal representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Las células infectadas se transforman inmediatamente en células cancerosas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

24. Respuesta: D) Autoinoculación

Respuesta correcta: D) Autoinoculación

La autoinoculación por contacto directo permite llevar el virus desde una lesión cutánea a otra zona.

Análisis de las alternativas:

A) No. Picadura de insectos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Transmisión aérea (gotitas) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Ingesta de alimentos contaminados representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

cuestión.

D) Correcta. Autoinoculación coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

25. Respuesta: A) Posible obstrucción de las vías respiratorias

Respuesta correcta: A) Posible obstrucción de las vías respiratorias

Los papilomas laríngeos pueden obstruir la vía aérea, especialmente en niños.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Posible obstrucción de las vías respiratorias coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Destrucción total de las cuerdas vocales por necrosis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Inducción de fallo renal agudo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Metástasis rápida hacia el cerebro representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

26. Respuesta: A) 30 al 60%

Respuesta correcta: A) 30 al 60%

El preservativo reduce, pero no elimina completamente, el riesgo de VPH porque puede haber contacto con piel no cubierta.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. 30 al 60% coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. 100% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Menos del 5% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. 90 al 95% representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

27. Respuesta: A) Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis

Respuesta correcta: A) Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis

La verruga muestra hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis, reflejo de proliferación epidérmica inducida por VPH.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Atrofia del estrato basal con pérdida de melanina representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Destrucción de los capsómeros de los queratinocitos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Infiltrado masivo de neutrófilos en la dermis papilar representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

28. Respuesta: C) Hasta 3 o 4 meses

Respuesta correcta: C) Hasta 3 o 4 meses

El período de incubación de verrugas comunes puede llegar a 3 o 4 meses.

Análisis de las alternativas:

A) No. 10 a 15 años representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. 24 a 48 horas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Hasta 3 o 4 meses coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Exactamente una semana representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

29. Respuesta: B) Cutáneos o mucosos

Respuesta correcta: B) Cutáneos o mucosos

Los VPH se agrupan clínicamente como cutáneos o mucosos según la localización predominante.

Análisis de las alternativas:

A) No. Aeróbicos o anaeróbicos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Cutáneos o mucosos coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Agudos o fulminantes representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Sistémicos o localizados representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

30. Respuesta: B) Cáncer de pene, ano y orofaringe

Respuesta correcta: B) Cáncer de pene, ano y orofaringe

En hombres, VPH se asocia sobre todo a cáncer de pene, ano y orofaringe.

Análisis de las alternativas:

A) No. Cáncer de próstata y vejiga representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Cáncer de pene, ano y orofaringe coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Cáncer de testículo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Cáncer de pulmón y estómago representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

31. Respuesta: A) Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación

Respuesta correcta: A) Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación

Se pueden extirpar verrugas para aliviar dolor, mejorar estética y evitar autoinoculación.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Porque siempre se transforman en tumores malignos si no se quitan representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Para permitir que la vacuna funcione después de la cirugía representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Para eliminar el reservorio de ARN viral de la sangre representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

32. Respuesta: D) La respuesta inmunitaria del hospedador

Respuesta correcta: D) La respuesta inmunitaria del hospedador

Muchas verrugas remiten por la respuesta inmunitaria del hospedador contra células infectadas.

Análisis de las alternativas:

A) No. La interferencia del virus JC que compete por la célula representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. El agotamiento natural de los capsómeros virales representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. La falta de queratina en el estrato espinoso representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. La respuesta inmunitaria del hospedador coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

33. Respuesta: B) Displasia moderada

Respuesta correcta: B) Displasia moderada

CIN 2 corresponde a displasia moderada, una lesión intraepitelial cervical de grado intermedio.

Análisis de las alternativas:

A) No. Tejido completamente normal representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Displasia moderada coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Cáncer invasivo con metástasis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Infección viral resuelta representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

## Adenovirus

1. Respuesta: D) ADN bicatenario lineal, sin envoltura.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ADN bicatenario lineal, sin envoltura." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: la estructura de adenovirus: ADN lineal de doble cadena y cápside desnuda. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ARN negativo segmentado, con envoltura.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN bicatenario lineal, sin envoltura."

b) No. El concepto de esta alternativa es "ADN monocatenario circular, con envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN bicatenario lineal, sin envoltura."

c) No. Esta alternativa se refiere a "ARN bicatenario, cápside helicoidal.": ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN bicatenario lineal, sin envoltura."

d) Correcta. "ADN bicatenario lineal, sin envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esa opción apunta a "ARN positivo, sin cápside.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN bicatenario lineal, sin envoltura."

2. Respuesta: A) Hexonas, pentonas y fibras.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Hexonas, pentonas y fibras." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: componentes de la cápside de adenovirus; son antígenos importantes y ayudan a la unión/entrada. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Hexonas, pentonas y fibras." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esta alternativa se refiere a "HA, NA y proteína M2.": hemaglutinina y neuraminidasa: antígenos principales de influenza y base de su clasificación. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hexonas, pentonas y fibras."

c) No. Aquí se está describiendo "E1, E2 y proteína NS1.": glucoproteínas de alfavirus/ flavivirus; no equivalen a HA/NA de influenza ni a hexonas/pentonas de adenovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hexonas, pentonas y fibras."

d) No. Esa opción apunta a "Gp120, gp41 e integrasa.": enzima retroviral que inserta el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hexonas, pentonas y fibras."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Esporozoito, merozoito y gametocito.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hexonas, pentonas y fibras."

3. Respuesta: C) Nucleo celular.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Nucleo celular." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Mitocondria.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleo celular."

b) No. Aquí se está describiendo "Citoplasma libre.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleo celular."

c) Correcta. "Nucleo celular." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Ribosoma bacteriano.": un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleo celular."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Vacuola digestiva.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Nucleo celular."

4. Respuesta: E) Conjuntivitis.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Conjuntivitis." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: manifestación ocular compatible con adenovirus, especialmente en faringoconjuntivitis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Catarata congénita.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Conjuntivitis."

b) No. Esa opción apunta a "Uveitis toxoplásmica obligatoria.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de oocistos por heces. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Conjuntivitis."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Retinopatía hipertensiva.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Conjuntivitis."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Glaucoma agudo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Conjuntivitis."

e) Correcta. "Conjuntivitis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

5. Respuesta: B) Adenovirus.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Adenovirus." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus ADN bicatenario lineal, sin envoltura, con resistencia ambiental y tropismo respiratorio, ocular, digestivo y urinario. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Trypanosoma.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adenovirus."

b) Correcta. "Adenovirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.



c) No. El concepto de esta alternativa es "Strongyloides.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adenovirus."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Fasciola.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adenovirus."

e) No. Aquí se está describiendo "Echinococcus.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adenovirus."

6. Respuesta: D) Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Mueren rápidamente fuera del hospedador.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Solo infectan por vía sexual.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura."

c) No. Esta alternativa se refiere a "No se liberan nunca por lisis.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura."

d) Correcta. "Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esa opción apunta a "No se transmiten entre humanos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura."

7. Respuesta: C) Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Todos causan cáncer cervical humano.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Solo producen sarcoma de Kaposi.": neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos."

c) Correcta. "Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esa opción apunta a "Son oncogénicos solo por mosquitos.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Transforman eritrocitos maduros.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos."

8. Respuesta: A) Lisis celular.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Lisis celular." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: modo de

liberación de adenovirus, que permanece hasta romper la célula. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Lisis celular." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Aquí se está describiendo "Gemación apical permanente.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lisis celular."

c) No. Esa opción apunta a "Exocitosis de ooquistes.": formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lisis celular."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Salida por huevo embrionado.": forma infectante de algunos nematodos como Ascaris cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lisis celular."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Fagocitosis inversa.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lisis celular."

9. Respuesta: E) Celulas linfoides y adenoides.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Celulas linfoides y adenoides." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: sitio donde adenovirus puede mantener infección latente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Eritrocitos circulantes.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas linfoides y adenoides."

b) No. Esa opción apunta a "Ganglios sensitivos exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas linfoides y adenoides."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Macrófagos hepáticos obligados.": células donde Leishmania vive y se multiplica como amastigote. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas linfoides y adenoides."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Neumocitos sin núcleo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas linfoides y adenoides."

e) Correcta. "Celulas linfoides y adenoides." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

10. Respuesta: B) Virus ADN sin envoltura resistente. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Virus ADN sin envoltura resistente." porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Protozoo flagelado transmitido por vinchuca.": nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus ADN sin envoltura resistente."

b) Correcta. "Virus ADN sin envoltura resistente." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. El concepto de esta alternativa es "Helmineto con caracol intermediario.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus ADN sin envoltura resistente."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Virus ARN con transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus ADN sin envoltura resistente."

e) No. Aquí se está describiendo "Cestodo por pescado crudo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus ADN sin envoltura resistente."

11. Respuesta: A) Células de adenoides

Respuesta correcta: A) Células de adenoides

El nombre adenovirus proviene de su aislamiento inicial en tejido/cultivo de adenoides.

Análisis de las alternativas:



A) Correcta. Células de adenoides coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Linfocitos T CD4+ representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Células epiteliales conjuntivas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Enterocitos del intestino delgado representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

12. Respuesta: D) ADN bicatenario lineal

Respuesta correcta: D) ADN bicatenario lineal

Adenovirus posee ADN bicatenario lineal y cápside desnuda.

Análisis de las alternativas:

A) No. ADN monocatenario lineal representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. ADN bicatenario circular representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. ARN monocatenario de sentido positivo representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. ADN bicatenario lineal coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

13. Respuesta: D) Núcleo

Respuesta correcta: D) Núcleo

La replicación del ADN de adenovirus ocurre en el núcleo de la célula infectada.

Análisis de las alternativas:

A) No. Citoplasma representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Ribosomas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Retículo endoplásmico representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Núcleo coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

14. Respuesta: B) Hexonas, pentonas y fibras

Respuesta correcta: B) Hexonas, pentonas y fibras

Hexonas, pentonas y fibras son componentes antigénicos importantes de la cápside adenoviral.

Análisis de las alternativas:

A) No. Polimerasa de ADN y helicasa representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Hexonas, pentonas y fibras coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Glucoproteínas de envoltura representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Proteína de matriz y nucleocápside representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

15. Respuesta: D) Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces

Respuesta correcta: D) Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces

Los cuerpos de inclusión nuclear reflejan replicación y ensamblaje viral ineficaces o acumulativos dentro del núcleo.

Análisis de las alternativas:

A) No. Fusión de membranas celulares para formar sincitios representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Aumento masivo del tamaño celular (citomegalia) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Degradación del nucleolo por enzimas víricas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

16. Respuesta: B) Infección latente

Respuesta correcta: B) Infección latente

Adenovirus puede establecer infección latente en células linfoides y adenoides.

Análisis de las alternativas:

A) No. Infección lítica representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Infección latente coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Infección transformadora representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Infección persistente productiva representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

17. Respuesta: B) Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original

Respuesta correcta: B) Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original

La inmunidad por anticuerpos es específica de serotipo; no protege bien contra serotipos diferentes.

Análisis de las alternativas:

A) No. La inmunidad humoral es el único mecanismo para evitar la proliferación viral representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. La infección previa garantiza inmunidad permanente contra todas las enfermedades respiratorias virales representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Existe protección cruzada universal entre los 52 serotipos humanos

representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

18. Respuesta: C) Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve

Respuesta correcta: C) Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve  
Al carecer de envoltura, adenovirus resiste desecación, detergentes y cloración leve, favoreciendo brotes en piscinas mal cloradas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Presencia de una envoltura lipídica protectora representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Termolabilidad extrema que favorece el contagio en agua templada representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Capacidad de replicación en ambientes acuáticos salinos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

19. Respuesta: A) Tipos 1, 2, 5 y 6

Respuesta correcta: A) Tipos 1, 2, 5 y 6

Los tipos 1, 2, 5 y 6 se asocian frecuentemente a infecciones respiratorias pediátricas.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Tipos 1, 2, 5 y 6 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Tipos 40 y 41 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Tipos 8, 19 y 37 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Tipos 4, 7 y 21 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

20. Respuesta: D) Tipos 4 y 7

Respuesta correcta: D) Tipos 4 y 7

Los tipos 4 y 7 se propagan con facilidad en ambientes militares por hacinamiento y contacto estrecho.

Análisis de las alternativas:

A) No. Tipos 1 y 2 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Tipos 11 y 21 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Tipos 40 y 41 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Tipos 4 y 7 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

21. Respuesta: B) Fiebre faringoconjuntival

Respuesta correcta: B) Fiebre faringoconjuntival

Fiebre faringoconjuntival combina faringitis, conjuntivitis y fiebre, cuadro típico de adenovirus.

Análisis de las alternativas:

A) No. Síndrome de tipo tos ferina representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Fiebre faringoconjuntival coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Enfermedad respiratoria aguda representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Queratoconjuntivitis epidémica representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

22. Respuesta: D) La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis

Respuesta correcta: D) La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis

La queratoconjuntivitis se diferencia por dolor y compromiso corneal, no solo conjuntival.

Análisis de las alternativas:

A) No. La presencia de fiebre en la conjuntivitis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. La edad del paciente, afectando la queratoconjuntivitis solo a lactantes representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. La vía de transmisión, que es solo fecal-oral en la conjuntivitis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

23. Respuesta: B) Serotipos 40 y 41

Respuesta correcta: B) Serotipos 40 y 41

Los serotipos 40 y 41 del grupo F son típicos de diarrea en lactantes.

Análisis de las alternativas:

A) No. Serotipos 3, 4 y 7 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Serotipos 40 y 41 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Serotipos 11 y 21 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Serotipos 1, 2 y 5 representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

24. Respuesta: B) Cistitis hemorrágica aguda

Respuesta correcta: B) Cistitis hemorrágica aguda

Adenovirus puede causar cistitis hemorrágica aguda, especialmente en niños o inmunocomprometidos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Insuficiencia renal aguda obstructiva representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Cistitis hemorrágica aguda coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Sepsis urinaria por Gram negativos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Glomerulonefritis post-infecciosa representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

25. Respuesta: B) PCR y análisis de sondas de ADN

Respuesta correcta: B) PCR y análisis de sondas de ADN

PCR y sondas de ADN permiten diagnóstico definitivo al detectar material viral.

Análisis de las alternativas:

A) No. Cultivo en agar sangre y chocolate representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. PCR y análisis de sondas de ADN coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Observación macroscópica de las secreciones representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Prueba de la tuberculina (PPD) representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

26. Respuesta: A) No existe un tratamiento específico aprobado

Respuesta correcta: A) No existe un tratamiento específico aprobado

No existe tratamiento específico aprobado de uso general para adenovirus; el manejo suele ser de soporte.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. No existe un tratamiento específico aprobado coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Uso de antibióticos de amplio espectro de forma profiláctica representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Terapia de reemplazo enzimático nuclear representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Administración inmediata de aciclovir oral representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

27. Respuesta: A) Cloración adecuada de las piscinas

Respuesta correcta: A) Cloración adecuada de las piscinas

La cloración adecuada de piscinas disminuye transmisión en instalaciones recreativas.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Cloración adecuada de las piscinas coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Vacunación universal de la población civil representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Uso de mascarillas N95 en todas las áreas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Hervir el agua de las piscinas antes de cada uso representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

28. Respuesta: B) Personal militar

Respuesta correcta: B) Personal militar

La vacuna oral contra adenovirus 4 y 7 se utiliza principalmente en personal militar.

Análisis de las alternativas:

A) No. Adultos mayores inmunodeprimidos representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Personal militar coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Lactantes y niños pequeños representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Pacientes con cáncer de colon representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

29. Respuesta: C) Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19

Respuesta correcta: C) Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19

Adenovirus se emplea como vector en vacunas modernas, como plataformas para Ebola y Covid-19.

Análisis de las alternativas:

A) No. Desinfección de superficies hospitalarias representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Tratamiento antibiótico para la tuberculosis representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19 coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Producción de insulina recombinante en el páncreas representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

30. Respuesta: C) Cuando ha finalizado la replicación del ADN

Respuesta correcta: C) Cuando ha finalizado la replicación del ADN

La transcripción tardía inicia después de la replicación del ADN, cuando se producen proteínas estructurales.

Análisis de las alternativas:

A) No. Antes de que se sintetice la polimerasa de ADN representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Inmediatamente después de la entrada del virus a la célula representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Cuando ha finalizado la replicación del ADN coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Simultáneamente con la lisis celular representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

31. Respuesta: C) Lisis celular

Respuesta correcta: C) Lisis celular

Los adenovirus se liberan principalmente por lisis celular.

Análisis de las alternativas:

A) No. Exocitosis mediante vesículas de transporte representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Paso directo a través de poros nucleares representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Lisis celular coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Gemación a través de la membrana plasmática representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

## Parvovirus y Poxvirus

1. Respuesta: A) ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: la estructura de parvovirus B19: ADN de cadena simple lineal, muy pequeño y sin envoltura. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. El concepto de esta alternativa es "ARN segmentado negativo, envuelto.": un genoma dividido en segmentos, importante en influenza y rotavirus; permite reorganización si dos cepas infectan la misma célula. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura."

c) No. Esta alternativa se refiere a "ADN bicatenario gigante, envuelto.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura."

d) No. Aquí se está describiendo "ARN positivo helicoidal, sin cápside.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura."

e) No. Esa opción apunta a "ADN circular con transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura."

2. Respuesta: C) Celulas precursoras eritroides.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Celulas precursoras eritroides." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: células de médula ósea que producen la serie roja; B19 las destruye y puede frenar la eritropoyesis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Neurona de ganglio dorsal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas precursoras eritroides."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Hepatocito adulto.": célula hepática donde Plasmodium se multiplica primero tras inoculación por mosquito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas precursoras eritroides."

c) Correcta. "Celulas precursoras eritroides." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esa opción apunta a "Queratinocito cornificado.": célula epitelial superficial queratinizada; HPV infecta queratinocitos, pero la latencia de VHS es neuronal. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas precursoras eritroides."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Enterocito ciliado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas precursoras eritroides."

3. Respuesta: E) Parvovirus B19.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Parvovirus B19." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el

tema de virología: virus pequeño ADN monocatenario, tropismo por precursores eritroides; causa eritema infeccioso y crisis aplásica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Adenovirus ocular.": virus ADN bicatenario lineal, sin envoltura, con resistencia ambiental y tropismo respiratorio, ocular, digestivo y urinario. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parvovirus B19."
- b) No. Aquí se está describiendo "Virus rubéola.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parvovirus B19."
- c) No. Esa opción apunta a "VHH-8.": herpesvirus humano asociado a sarcoma de Kaposi y otros procesos linfoproliferativos. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parvovirus B19."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Rinovirus.": picornavirus lábil al pH ácido y adaptado a 33 grados C, típico de vías respiratorias superiores. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parvovirus B19."
- e) Correcta. "Parvovirus B19." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

4. Respuesta: B) Mediados por respuesta inmunitaria.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Mediados por respuesta inmunitaria." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Fase de máxima contagiosidad respiratoria.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mediados por respuesta inmunitaria."
- b) Correcta. "Mediados por respuesta inmunitaria." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Debidos a larvas pulmonares.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mediados por respuesta inmunitaria."
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Secuela de infección por poxvirus.": virus ADN grandes y complejos, con envoltura, que se replican en citoplasma. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mediados por respuesta inmunitaria."
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Resultado de huevos en bilis.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mediados por respuesta inmunitaria."

5. Respuesta: D) Viremia y secreciones respiratorias.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Viremia y secreciones respiratorias." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: vía por la que B19 se elimina en la fase inicial, febril e infecciosa. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Quistes en heces formadas.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Viremia y secreciones respiratorias."
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Metacercarias en vegetales.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Viremia y secreciones respiratorias."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Mordedura de murciélago.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Viremia y secreciones respiratorias."
- d) Correcta. "Viremia y secreciones respiratorias." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo "Proglotides en heces.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Viremia y secreciones respiratorias."

6. Respuesta: C) Hidropesía fetal por anemia.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Hidropesía fetal por anemia." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: complicación fetal por B19 por anemia severa e insuficiencia cardíaca fetal. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de

agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Condiloma acuminado fetal.": verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidropesía fetal por anemia."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Hidrofobia neonatal.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidropesía fetal por anemia."
- c) Correcta. "Hidropesía fetal por anemia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "Megacolon congenito.": manifestación digestiva crónica de Chagas por denervación intestinal. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidropesía fetal por anemia."
- e) No. Esa opción apunta a "Quiste hidatídico pulmonar.": lesión por Echinococcus granulosus; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidropesía fetal por anemia."

7. Respuesta: A) Replica en el citoplasma.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Replica en el citoplasma." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Replica en el citoplasma." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "No posee ningún genoma.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replica en el citoplasma."
- c) No. Aquí se está describiendo "Necesita eritrocitos maduros.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replica en el citoplasma."
- d) No. Esa opción apunta a "Es siempre no envuelto.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replica en el citoplasma."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Solo se transmite por alimentos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replica en el citoplasma."

8. Respuesta: E) Grandes, complejos y de ADN bicatenario.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Grandes, complejos y de ADN bicatenario." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Pequeños, desnudos y de ARN positivo.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes, complejos y de ADN bicatenario."
- b) No. Aquí se está describiendo "Helicoidales en forma de bala.": morfología clásica del virus rábico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes, complejos y de ADN bicatenario."
- c) No. Esa opción apunta a "Segmentados con neuraminidasa.": glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes, complejos y de ADN bicatenario."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Flagelados con cinetoplasto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes, complejos y de ADN bicatenario."
- e) Correcta. "Grandes, complejos y de ADN bicatenario." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

9. Respuesta: B) Vaccinia.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Vaccinia." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus usado históricamente en la vacunación que permitió controlar/erradicar la

viruela. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Rotavirus.": virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vaccinia".

b) Correcta. "Vaccinia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "VEB.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vaccinia".

d) No. El concepto de esta alternativa es "Toxoplasma.": protozoo apicomplejo; felinos son hospedadores definitivos y humanos se infectan por ooquistes o quistes tisulares. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vaccinia".

e) No. Esta alternativa se refiere a "Schistosoma.": trematodo sanguíneo cuyas cercarias penetran activamente la piel y cuyos huevos causan inflamación. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vaccinia".

10. Respuesta: D) Poxvirus.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Poxvirus." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus ADN grandes y complejos, con envoltura, que se replican en citoplasma. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Parvovirus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Poxvirus".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Flavivirus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Poxvirus".

c) No. El concepto de esta alternativa es "Cestodos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Poxvirus".

d) Correcta. "Poxvirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo "Trematodos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Poxvirus".

11. Respuesta: D) Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal.

Respuesta correcta: D) Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal.

Parvovirus son los virus ADN más pequeños y tienen ADN monocatenario lineal. Análisis de las alternativas:

A) No. Su replicación es exclusivamente citoplasmática. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Presentan una cápside icosaédrica con envoltura lipídica. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Poseen un genoma de ADN bicatenario circular. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

12. Respuesta: D) La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario.

Respuesta correcta: D) La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario.

Para replicarse, el parvovirus necesita formar una cadena complementaria y convertir su genoma en ADN bicatenario funcional.

Análisis de las alternativas:

A) No. La integración del genoma vírico en el ADN celular. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. La formación de un intermediario de ARN de polaridad negativa. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. La salida del núcleo hacia el citoplasma para el ensamblaje del virión. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

13. Respuesta: D) Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides.

Respuesta correcta: D) Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides.

La primera fase de B19 se caracteriza por viremia intensa y destrucción lítica de precursores eritroides.

Análisis de las alternativas:

A) No. La aparición del exantema en 'mejilla abofeteada' por inmunocomplejos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. El desarrollo de poliartritis crónica en pacientes pediátricos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. La producción masiva de anticuerpos IgG específicos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

14. Respuesta: A) Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia.

Respuesta correcta: A) Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia.

El exantema del eritema infeccioso aparece cuando la viremia ya disminuyó y predomina la respuesta inmunitaria.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

B) No. Porque el descenso de la hemoglobina impide la replicación viral. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Porque el virus ha mutado a una forma no patógena. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Porque el virus solo se transmite a través de las costras del exantema. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

15. Respuesta: D) Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses.

Respuesta correcta: D) Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses.

En adultos, B19 se manifiesta con frecuencia como artralgias o poliartritis prolongada más que como exantema típico infantil.

Análisis de las alternativas:

A) No. Crisis aplásica aguda de forma universal. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Bronquiolitis grave y dificultad respiratoria. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) No. Formación de nódulos umbilicados en los genitales. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) Correcta. Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

16. Respuesta: B) Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios.

Respuesta correcta: B) Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios.

En anemia hemolítica crónica, B19 puede causar crisis aplásica por agotamiento transitorio de precursores eritrocitarios.

Análisis de las alternativas:

A) No. Desarrollo de malformaciones congénitas cardíacas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Insuficiencia hepática fulminante por viremia secundaria. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Eritema infeccioso recidivante. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

17. Respuesta: C) Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal).

Respuesta correcta: C) Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal).

En embarazadas seronegativas, B19 puede causar anemia fetal grave, insuficiencia cardíaca e hidropesía fetal.

Análisis de las alternativas:

A) No. Ninguno, ya que el virus no atraviesa la placenta. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) No. Desarrollo inmediato de molusco contagioso gestacional. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

C) Correcta. Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal). coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

D) No. Transmisión de inmunidad pasiva al feto sin riesgos asociados. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

18. Respuesta: C) El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces.

Respuesta correcta: C) El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces.

El bocavirus se relaciona con enfermedad respiratoria y también puede transmitirse por heces, diferenciándose epidemiológicamente de B19.

Análisis de las alternativas:

- A) No. El B19 afecta a animales domésticos y el bocavirus solo a humanos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) No. El B19 tiene vacuna disponible y el bocavirus no. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) Correcta. El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- D) No. El B19 es un virus de ARN y el bocavirus es de ADN. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

19. Respuesta: A) En el citoplasma.

Respuesta correcta: A) En el citoplasma.

Los poxvirus replican en el citoplasma, a diferencia de la mayoría de virus ADN que replican en el núcleo.

Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. En el citoplasma. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- B) No. En la membrana plasmática. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) No. En el nucleolo celular. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) No. En las mitocondrias. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

20. Respuesta: B) La erupción de pústulas características en la piel y mucosas.

Respuesta correcta: B) La erupción de pústulas características en la piel y mucosas.

Tras la viremia secundaria de viruela aparecen pústulas características en piel y mucosas.

Análisis de las alternativas:

- A) No. La desaparición inmediata de los síntomas sistémicos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) Correcta. La erupción de pústulas características en la piel y mucosas. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- C) No. La inmunización automática contra el parvovirus B19. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) No. La formación de inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de Molluscum. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

21. Respuesta: C) Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis.

Respuesta correcta: C) Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis.

Mpox es una zoonosis con reservorio animal, incluyendo monos y ardillas en el material.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Es un producto de laboratorio usado para vacunas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) No. Su reservorio son las aves migratorias y es una infección vectorial. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) Correcta. Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- D) No. Es un virus exclusivo de humanos transmitido por el aire. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

22. Respuesta: D) Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central.

Respuesta correcta: D) Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central.

El molusco contagioso produce nódulos umbilicados con tapón caseoso central.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Exantema maculopapular difuso en 'encaje'. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) No. Vesículas transparentes que siguen el trayecto de un nervio. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) No. Pústulas hemorrágicas que dejan cicatrices profundas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) Correcta. Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

23. Respuesta: A) Presencia de grandes inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas (cuerpos de Molluscum).

Respuesta correcta: A) Presencia de grandes inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas (cuerpos de Molluscum).

Los cuerpos de Molluscum son inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas características del molusco contagioso.

Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. Presencia de grandes inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas (cuerpos de Molluscum). coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- B) No. Presencia de anticuerpos IgM contra el antígeno eritrocitario P. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) No. Aislamiento de linfocitos CD4 bajos en sangre periférica. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) No. Detección de ADN monocatenario mediante PCR. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

24. Respuesta: A) Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas).

Respuesta correcta: A) Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas).

Orf y viruela bovina se transmiten por contacto directo con lesiones de animales infectados.

Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas). coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- B) No. Por la picadura de garrapatas infectadas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) No. A través del consumo de leche no pasteurizada. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) No. Por inhalación de polvo contaminado en establos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

25. Respuesta: C) Bocavirus.

Respuesta correcta: C) Bocavirus.

El bocavirus es un parvovirus asociado a bronquiolitis e infección respiratoria en lactantes.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Virus del Molusco Contagioso. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) No. Virus Orf. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) Correcta. Bocavirus. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- D) No. Parvovirus B19. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

26. Respuesta: B) El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación.

Respuesta correcta: B) El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación.

Lavado de manos y tapabocas reducen la transmisión respiratoria de parvovirus humano.

Análisis de las alternativas:

- A) No. La vacunación sistemática en la infancia es el método principal. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) Correcta. El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- C) No. El uso de preservativos garantiza la eliminación del riesgo de contagio de B19. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) No. Las vacunas para perros y gatos protegen también a los humanos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

27. Respuesta: B) La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico.

Respuesta correcta: B) La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico.

Luz solar, calor o ejercicio pueden exacerbar o hacer reaparecer el exantema de quinta enfermedad.

Análisis de las alternativas:

- A) No. El tratamiento con antibióticos de amplio espectro. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) Correcta. La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- C) No. El consumo de alimentos ácidos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- D) No. La reinfección inmediata por el mismo serotipo del virus. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

28. Respuesta: C) Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo.

Respuesta correcta: C) Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo.

En Mpox, la persona deja de ser infecciosa cuando las costras caen y se forma piel nueva.

Análisis de las alternativas:

- A) No. A los 5 días de iniciado el tratamiento con Cidofovir. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- B) No. Inmediatamente después de recibir la vacuna post-exposición. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.
- C) Correcta. Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.
- D) No. En cuanto desaparece la fiebre inicial. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

29. Respuesta: B) La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.

Respuesta correcta: B) La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.

El exantema y artralgias de B19 se explican por respuesta inmunitaria y depósitos de complejos antígeno-anticuerpo.

Análisis de las alternativas:

- A) No. La toxicidad sistémica por la liberación de hemoglobina fetal. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
C) No. Una sobreinfección bacteriana oportunista en la piel. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. La replicación viral directa en los sinoviocitos y queratinocitos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

30. Respuesta: C) Seudoviruela bovina.

Respuesta correcta: C) Seudoviruela bovina.

El nódulo del Milker se asocia a pseudoviruela bovina, un parapoxvirus ocupacional.

Análisis de las alternativas:

A) No. Virus Vaccinia. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Virus de la estomatitis papulosa bovina. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) Correcta. Seudoviruela bovina. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
D) No. Viruela de Tana. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

31. Respuesta: B) Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños).

Respuesta correcta: B) Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños).  
B19 produce expresiones clínicas distintas según la edad: exantema en niños y artralgias/artritis en adultos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Porque la madre padecía una enfermedad autoinmune no relacionada. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) Correcta. Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños). coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
C) No. Porque el virus B19 muta al pasar de niño a adulto. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Porque la madre estaba en la fase infecciosa y la hija en la fase prodrómica. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

32. Respuesta: B) Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN. Respuesta correcta: B) Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN.

Parvoviridae y Poxviridae comparten ser virus cuyo material genético principal es ADN.

Análisis de las alternativas:

A) No. Ambos son virus con genoma de ADN monocatenario. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) Correcta. Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
C) No. Ambos requieren una enzima retrotranscriptasa para replicarse. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Ambos poseen genomas de ADN de gran tamaño. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

33. Respuesta: A) Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo. Respuesta correcta: A) Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo.

Los nódulos de molusco pueden eliminarse por curetaje, nitrógeno líquido o soluciones de yodo para acelerar curación.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
B) No. Mediante la aplicación de ungüentos antibióticos potentes. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. Aspiración con aguja fina del contenido caseoso. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Exposición prolongada a la luz ultravioleta. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

34. Respuesta: A) Entre el 15% y el 40%.

Respuesta correcta: A) Entre el 15% y el 40%.

La viruela mayor tuvo una mortalidad alta, aproximadamente entre 15% y 40%.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Entre el 15% y el 40%. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
B) No. Exactamente el 50% debido a la respuesta inmunitaria. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. Menos del 1%. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Casi del 100% en todos los casos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

35. Respuesta: B) Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.

Respuesta correcta: B) Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.

El período prodrómico de B19 incluye fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.

Análisis de las alternativas:

A) No. Anemia hemolítica súbita en pacientes sanos. representa otro concepto,

una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

B) Correcta. Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

C) No. Descamación severa de las palmas de las manos. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

D) No. Cefalea intensa y lumbalgia de tipo pustuloso. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

36. Respuesta: D) En la cavidad bucal.

Respuesta correcta: D) En la cavidad bucal.

En viruela, el exantema puede iniciar en la cavidad bucal antes de extenderse a piel.

Análisis de las alternativas:

A) No. En el área genital únicamente. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Exclusivamente en las mejillas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. En las plantas de los pies. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) Correcta. En la cavidad bucal. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

37. Respuesta: D) Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia.

Respuesta correcta: D) Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia.

En inmunodeprimidos, B19 puede hacerse crónico por incapacidad de aclarar la viremia.

Análisis de las alternativas:

A) No. Transformación maligna de los precursores eritroides (leucemia). representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) No. Infección latente en las neuronas sensitivas. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
C) No. Resolución acelerada por hiperactividad inmune. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) Correcta. Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.

38. Respuesta: B) La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división.

Respuesta correcta: B) La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división.

La dependencia de fase S se debe a que parvovirus requiere polimerasas celulares de ADN activas durante la división celular.

Análisis de las alternativas:

A) No. Su gran tamaño requiere mucha energía mitocondrial. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
B) Correcta. La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división. coincide con el dato central del enunciado y con la clase correspondiente.  
C) No. La presencia de una envoltura que se disuelve con el huso mitótico. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.  
D) No. Su capacidad para inducir apoptosis en células en reposo. representa otro concepto, una vía distinta o una afirmación que no explica el mecanismo preguntado en esta cuestión.

## Picornavirus

1. Respuesta: C) ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un genoma de ARN de sentido positivo, capaz de funcionar como ARNm al entrar en la célula. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ARN negativo segmentado, cápside helicoidal y envoltura.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura."  
b) No. El concepto de esta alternativa es "ADN bicatenario lineal, fibras y pentonas.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura."  
c) Correcta. "ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
d) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario, eritrotropo y envuelto.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura."  
e) No. Esa opción apunta a "ARN bicatenario con transcriptasa inversa.": ARN



de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura."

2. Respuesta: E) No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Se destruyen siempre en el estomago.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Requieren picadura de mosquito.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal."

c) No. Aquí se está describiendo "Solo infectan el ojo.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal."

d) No. Esa opción apunta a "Tienen envoltura muy fragil.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal."

e) Correcta. "No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

3. Respuesta: B) Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Labilidad extrema a pH neutro.": una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes."

b) Correcta. "Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esa opción apunta a "Necesidad de vector biológico.": artrópodo en el que el agente se desarrolla o multiplica antes de transmitirse. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Latencia en ganglios sensitivos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Replicación solo nuclear.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes."

4. Respuesta: D) Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Son virus ADN envueltos.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C."

b) No. Esa opción apunta a "Se transmiten por heces de felinos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Producen huevos en vías biliares.": localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C."

d) Correcta. "Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Tienen fase de trofozoito.": forma móvil y metabólicamente activa de protozoarios; se observa mejor en heces recientes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C."

5. Respuesta: C) Neuronas motoras del asta anterior.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Neuronas motoras del asta anterior." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Linfocitos B de amígdala.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neuronas motoras del asta anterior."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Células precursoras eritroides.": células de médula ósea que producen la serie roja; B19 las destruye y puede frenar la eritropoyesis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neuronas motoras del asta anterior."

c) Correcta. "Neuronas motoras del asta anterior." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Conductos biliares intrahepáticos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neuronas motoras del asta anterior."

e) No. Aquí se está describiendo "Queratinocitos del estrato corneo.": célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neuronas motoras del asta anterior."

6. Respuesta: A) Herpangina y mano-pie-boca.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Herpangina y mano-pie-boca." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Herpangina y mano-pie-boca." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. El concepto de esta alternativa es "Rabia paralítica.": rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herpangina y mano-pie-boca."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Sarcoma de Kaposi.": neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herpangina y mano-pie-boca."

d) No. Aquí se está describiendo "Fasciolosis hepática.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herpangina y mano-pie-boca."

e) No. Esa opción apunta a "Neurocisticercosis.": larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herpangina y mano-pie-boca."

7. Respuesta: E) Miocarditis y pleurodinia.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Miocarditis y pleurodinia." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Verrugas plantares.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Miocarditis y pleurodinia."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Hidatidosis pulmonar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el

enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Miocarditis y pleurodinia."

c) No. Aquí se está describiendo "Paludismo terciario.": malaria: infección por Plasmodium con fase hepática inicial y fase eritrocitaria clínica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Miocarditis y pleurodinia."

d) No. Esa opción apunta a "Leishmaniasis visceral.": protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Miocarditis y pleurodinia."

e) Correcta. "Miocarditis y pleurodinia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

8. Respuesta: B) Citoplasma de la célula.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citoplasma de la célula." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Núcleo con inclusión grande.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."

b) Correcta. "Citoplasma de la célula." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esa opción apunta a "Mitochondria exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eritrocito sin núcleo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Intestino del mosquito.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."

9. Respuesta: D) Enterovirus.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Enterovirus." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: picornavirus resistentes al ácido y transmisión fecal-oral; no siempre producen enfermedad entérica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Poxvirus.": virus ADN grandes y complejos, con envoltura, que se replican en citoplasma. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."

b) No. Esa opción apunta a "Toxoplasma.": protozoo apicomplejo; felinos son hospedadores definitivos y humanos se infectan por ooquistes o quistes tisulares. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Fasciola.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."

d) Correcta. "Enterovirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Bothrops.": género responsable de la mayoría de accidentes ofídicos en Sudamérica y de gran relevancia sanitaria en Paraguay. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."

10. Respuesta: A) Vacunación.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vacunación." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Vacunación." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Suero antiofídico.": tratamiento específico del envenenamiento por serpiente, indicado según tipo y gravedad. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Antibiótico betalactámico.": un

concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Desparasitación canina única.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación."

e) No. Aquí se está describiendo "Cocción de pescado.": prevención de cestodos del pescado, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación."

11. Respuesta: B) Los Rinovirus son lábiles al pH ácido, mientras que los Enterovirus son resistentes a un rango de pH de 3 a 9.

La respuesta correcta es B) Los Rinovirus son lábiles al pH ácido, mientras que los Enterovirus son resistentes a un rango de pH de 3 a 9.

Los rinovirus se adaptan mejor a vías respiratorias superiores y son sensibles al pH ácido; los enterovirus resisten ácido gástrico y por eso pueden transmitirse por vía fecal-oral.

Análisis de las alternativas:

A) No. Los Enterovirus se inactivan rápidamente a temperatura ambiente, a diferencia de los Rinovirus. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Los Rinovirus son lábiles al pH ácido, mientras que los Enterovirus son resistentes a un rango de pH de 3 a 9. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Los Enterovirus requieren temperaturas de 33 grados C para replicarse, mientras que los Rinovirus prefieren los 37 grados C. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Los Rinovirus son resistentes a los detergentes y solventes orgánicos, pero los Enterovirus no. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

12. Respuesta: A) Porque normalmente no provocan enfermedades entéricas, a pesar de transmitirse por vía fecal-oral.

La respuesta correcta es A) Porque normalmente no provocan enfermedades entéricas, a pesar de transmitirse por vía fecal-oral.

Aunque entran y se eliminan por el tubo digestivo, muchas manifestaciones importantes de enterovirus son neurológicas, musculares, cutáneas o sistémicas, no diarreas entéricas típicas.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Porque normalmente no provocan enfermedades entéricas, a pesar de transmitirse por vía fecal-oral. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Porque su replicación principal ocurre en los pulmones antes de migrar al tejido diana. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Porque son los únicos virus que requieren de la bilis para activar su cápside infectante. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Porque solo infectan el sistema nervioso central y nunca entran en contacto con el intestino. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

13. Respuesta: A) La viremia secundaria que distribuye el virus al tejido diana.

La respuesta correcta es A) La viremia secundaria que distribuye el virus al tejido diana.

Tras replicarse en tejido linfático, los enterovirus pueden producir viremia secundaria y alcanzar órganos diana; allí aparecen las manifestaciones clínicas.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. La viremia secundaria que distribuye el virus al tejido diana. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. La inhibición total de la replicación por anticuerpos humorales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. La eliminación masiva del virus únicamente a través de las secreciones orales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. La formación de lesiones vesiculares en la mucosa orofaríngea exclusivamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

14. Respuesta: A) 90%

La respuesta correcta es A) 90%

La mayoría de las infecciones por poliovirus son subclínicas o asintomáticas; la parálisis ocurre solo en una pequeña proporción.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. 90% responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. 10% puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. 50% puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. 1% puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

15. Respuesta: A) Tipo 1

La respuesta correcta es A) Tipo 1

El poliovirus tipo 1 es el serotipo más asociado a poliomieltis paralítica y brotes importantes.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Tipo 1 responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Tipo 2 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Tipo 4 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Tipo 3 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

16. Respuesta: D) Parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial.

La respuesta correcta es D) Parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial.

El poliovirus destruye neuronas motoras del asta anterior; por eso genera parálisis flácida, usualmente asimétrica, sin compromiso sensitivo primario.

Análisis de las alternativas:

A) No. Rigidez de nuca persistente que evoluciona a coma profundo en 24 horas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Debilidad muscular progresiva que siempre comienza en los músculos craneales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Parálisis espástica simétrica con pérdida total de la sensibilidad térmica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

17. Respuesta: B) El grupo A se asocia frecuentemente con lesiones vesiculares, mientras que el grupo B causa miocarditis y pleurodinia.

La respuesta correcta es B) El grupo A se asocia frecuentemente con lesiones vesiculares, mientras que el grupo B causa miocarditis y pleurodinia.

Coxsackie A se recuerda por herpangina y mano-pie-boca; Coxsackie B se relaciona más con miocarditis, pericarditis y pleurodinia.

Análisis de las alternativas:

A) No. Solo el grupo B es capaz de causar meningitis aséptica en adultos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. El grupo A se asocia frecuentemente con lesiones vesiculares, mientras que el grupo B causa miocarditis y pleurodinia. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. El grupo B produce únicamente infecciones respiratorias, mientras que el grupo A afecta al hígado. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. El grupo A es transmitido por mosquitos, a diferencia del grupo B que es fecal-oral. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

18. Respuesta: C) Herpangina

La respuesta correcta es C) Herpangina

La herpangina produce fiebre, odinofagia y vesículas o úlceras en la orofaringe posterior, especialmente paladar blando y úvula.

Análisis de las alternativas:

A) No. Enfermedad de manos, pies y boca puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Meningitis aséptica puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Herpangina responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Pleurodinia puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

19. Respuesta: B) Coxsackievirus grupo B

La respuesta correcta es B) Coxsackievirus grupo B

La pleurodinia epidémica se asocia clásicamente a Coxsackievirus B y causa dolor torácico muscular intenso.

Análisis de las alternativas:

A) No. Poliovirus tipo 1 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Coxsackievirus grupo B responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Rinovirus humano puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Echovirus 11 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

20. Respuesta: C) Echovirus 11

La respuesta correcta es C) Echovirus 11

Dentro de los echovirus, el material destaca Echovirus 11 como causa frecuente de meningitis vírica.

Análisis de las alternativas:

A) No. Poliovirus tipo 2 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Coxsackie A16 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Echovirus 11 responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Echovirus 7 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

21. Respuesta: C) Líquido cefalorraquídeo (LCR)

La respuesta correcta es C) Líquido cefalorraquídeo (LCR)

El poliovirus se detecta con mayor facilidad en heces y, al inicio, en faringe; en LCR la detección viral directa es más difícil.

Análisis de las alternativas:

A) No. Faringe puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Heces puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Líquido cefalorraquídeo (LCR) responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Sangre puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

22. Respuesta: C) Debido a su mejor perfil de seguridad al eliminar el riesgo de poliomieltis asociada a la vacuna.

La respuesta correcta es C) Debido a su mejor perfil de seguridad al eliminar el riesgo de poliomieltis asociada a la vacuna.

La VPI no contiene virus vivos capaces de revertir a neurovirulencia; por eso elimina el riesgo de poliomieltis asociada a vacuna.

Análisis de las alternativas:

A) No. Porque es más económica y fácil de administrar en campañas masivas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Porque genera una mayor producción de anticuerpos secretores (IgA) en el intestino. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Debido a su mejor perfil de seguridad al eliminar el riesgo de poliomieltis asociada a la vacuna. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Porque induce una inmunidad de por vida con una sola dosis. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

23. Respuesta: D) Riesgo de diseminación del virus atenuado a personas próximas no vacunadas.

La respuesta correcta es D) Riesgo de diseminación del virus atenuado a personas próximas no vacunadas.

La VPO contiene virus vivos atenuados; puede diseminarse a contactos y, raramente, asociarse a virus derivados de vacuna.

Análisis de las alternativas:

A) No. Incapacidad absoluta para generar inmunidad de grupo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Es el único tipo de vacuna que se inactiva por la luz solar. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Necesidad estricta de jeringuillas y agujas esterilizadas para su uso. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Riesgo de diseminación del virus atenuado a personas próximas no vacunadas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

24. Respuesta: C) La temperatura de 33 grados C de las vías respiratorias superiores.

La respuesta correcta es C) La temperatura de 33 grados C de las vías respiratorias superiores.

Los rinovirus crecen mejor a temperaturas cercanas a 33 grados C, propias de la mucosa nasal y vías respiratorias superiores.

Análisis de las alternativas:

A) No. La alta acidez del tracto gastrointestinal. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. La presencia de enzimas proteolíticas en el páncreas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. La temperatura de 33 grados C de las vías respiratorias superiores. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Un ambiente con baja humedad y alta concentración de CO<sub>2</sub>. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

25. Respuesta: C) Lavado de manos frecuente y desinfección de objetos contaminados.

La respuesta correcta es C) Lavado de manos frecuente y desinfección de

objetos contaminados.  
Los rinovirus se transmiten por contacto con secreciones y fómites; por eso higiene de manos y desinfección son medidas centrales.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Inhalación de aire seco y frío para reducir la carga viral. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Uso de antibióticos profilácticos durante el invierno. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Lavado de manos frecuente y desinfección de objetos contaminados. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Administración de la vacuna anual polivalente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

26. Respuesta: D) 1 y 35 días.

La respuesta correcta es D) 1 y 35 días.

El material presenta un rango amplio de incubación para enterovirus, aproximadamente de 1 a 35 días, según el virus y el cuadro.

Análisis de las alternativas:

- A) No. 24 y 48 horas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Exactamente 14 días en todos los casos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. 3 y 6 meses. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) Correcta. 1 y 35 días. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

27. Respuesta: A) La localización y el número de neuronas motoras destruidas por el virus.

La respuesta correcta es A) La localización y el número de neuronas motoras destruidas por el virus.

La parálisis depende de cuántas neuronas motoras fueron dañadas y de qué grupos musculares inervaban.

Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. La localización y el número de neuronas motoras destruidas por el virus. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
B) No. La cantidad de virus eliminada a través de las heces. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. La presencia de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. La velocidad de la viremia primaria inicial. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

28. Respuesta: A) 6 meses a 2 años.

La respuesta correcta es A) 6 meses a 2 años.

La recuperación neuromuscular de la poliomielitis parálisis puede ser lenta y extenderse de meses a años.

Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. 6 meses a 2 años. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
B) No. 30 días exactos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. 1 a 2 semanas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Más de 10 años. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

29. Respuesta: B) Fiebre e insuficiencia cardíaca.

La respuesta correcta es B) Fiebre e insuficiencia cardíaca.

En recién nacidos, Coxsackie B puede causar enfermedad sistémica grave con miocarditis, fiebre e insuficiencia cardíaca.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Sordera permanente por destrucción del nervio auditivo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) Correcta. Fiebre e insuficiencia cardíaca. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
C) No. Diabetes insulín dependiente de inicio súbito. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Ceguera por conjuntivitis hemorrágica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

30. Respuesta: B) Distinguir rápidamente una meningitis por Enterovirus de una meningitis bacteriana.

La respuesta correcta es B) Distinguir rápidamente una meningitis por Enterovirus de una meningitis bacteriana.

La RT-PCR permite detectar ARN viral en LCR y ayuda a diferenciar meningitis viral por enterovirus de meningitis bacteriana.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Sustituir por completo a la vacunación como medida de salud pública. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo,

estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Distinguir rápidamente una meningitis por Enterovirus de una meningitis bacteriana. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Determinar la resistencia del virus al cloro en aguas residuales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Cuantificar la cantidad de bilis presente en el estómago del paciente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

31. Respuesta: B) Falso

La respuesta correcta es B) Falso

A pesar de su nombre y transmisión fecal-oral, los enterovirus no se caracterizan principalmente por diarreas profusas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Verdadero puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Falso responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

32. Respuesta: A) Hepatovirus

La respuesta correcta es A) Hepatovirus

El virus de la hepatitis A pertenece al género Hepatovirus dentro de Picornaviridae.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Hepatovirus responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Enterovirus puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Aphthovirus puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Cardiovirus puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

33. Respuesta: A) El virus se replica íntegramente en el citoplasma de la célula huésped.

La respuesta correcta es A) El virus se replica íntegramente en el citoplasma de la célula huésped.

Los picornavirus son virus ARN positivo sin envoltura y realizan su replicación en el citoplasma.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. El virus se replica íntegramente en el citoplasma de la célula huésped. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Utilizan el núcleo celular para la síntesis de sus proteínas de cápside. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Requieren integrar su genoma en el ADN celular mediante una retrotranscriptasa. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. La replicación ocurre exclusivamente dentro de las mitocondrias para obtener energía. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

34. Respuesta: A) Coxsackie A16

La respuesta correcta es A) Coxsackie A16

La enfermedad mano-pie-boca se asocia de forma clásica a Coxsackie A16, aunque también pueden participar otros enterovirus.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Coxsackie A16 responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Poliovirus tipo 1 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Coxsackie B5 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Echovirus 11 puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

## Orthomixovirus y Reovirus

1. Respuesta: E) Ocho segmentos de ARN y envoltura.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Ocho segmentos de ARN y envoltura." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: rasgo estructural de influenza A y B. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ADN circular sin envoltura.": descripción compatible con papilomavirus/poliomavirus; no con influenza, que tiene ARN segmentado y envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ocho segmentos de ARN y envoltura."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Un solo ADN monocatenario.": descripción de parvovirus, no de influenza. No debe marcarse porque atribuye al

agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ocho segmentos de ARN y envoltura."

c) No. Esta alternativa se refiere a "ARN positivo no segmentado.": estructura de picornavirus, togavirus o flavivirus; no de influenza A/B, que tiene ARN negativo segmentado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ocho segmentos de ARN y envoltura."

d) No. Aquí se está describiendo "Capsidom desnuda con espículas ausentes.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ocho segmentos de ARN y envoltura."

e) Correcta. "Ocho segmentos de ARN y envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

2. Respuesta: B) Deriva antigénica.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Deriva antigénica." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: cambios menores por mutaciones acumuladas en influenza A/B. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Salto antigénico.": cambio mayor por reorganización de segmentos en influenza A; no es deriva antigénica menor. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deriva antigénica."

b) Correcta. "Deriva antigénica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "Latencia ganglionar.": persistencia en ganglios, típica de herpesvirus; no es variación antigénica de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deriva antigénica."

d) No. Esa opción apunta a "Excitación.": salida de un protozoo desde el quiste en el intestino; no es cambio antigénico viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deriva antigénica."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Autoinfección.": capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deriva antigénica."

3. Respuesta: D) Influenza A.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Influenza A." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: orthomyxovirus con ARN segmentado capaz de variación mayor por reorganización; puede generar pandemias. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Influenza C.": virus gripal que suele causar enfermedad leve y tiene 7 segmentos, no el principal responsable de saltos pandémicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Influenza A."

b) No. Aquí se está describiendo "Rinovirus.": picornavirus lábil al pH ácido y adaptado a 33 grados C, típico de vías respiratorias superiores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Influenza A."

c) No. Esa opción apunta a "Parvovirus B19.": virus pequeño ADN monocatenario, tropismo por precursores eritroides; causa eritema infeccioso y crisis aplásica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Influenza A."

d) Correcta. "Influenza A." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "VHH-6.": herpesvirus asociado a exantema súbito; no participa en reorganización de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Influenza A."

4. Respuesta: C) Hemaglutinina y neuraminidasa.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Hemaglutinina y neuraminidasa." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: glucoproteína de influenza que media unión a la célula y es antígeno principal. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Gp120 y gp41.": glucoproteína del VIH que participa en la unión a CD4 y correceptores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hemaglutinina y neuraminidasa."

b) No. Esa opción apunta a "E1 y E2 del HPV.": formulación incorrecta para HPV; E1/E2 son genes tempranos, no los antígenos HA/NA de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hemaglutinina y neuraminidasa."

c) Correcta. "Hemaglutinina y neuraminidasa." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. El concepto de esta alternativa es "Hexona y pentona.": antígenos de adenovirus, no de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta

correcta exige reconocer "Hemaglutinina y neuraminidasa."

e) No. Esta alternativa se refiere a "VP1 y VP2 de parvovirus.": proteínas de cápside de parvovirus, no glicoproteínas de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hemaglutinina y neuraminidasa."

5. Respuesta: A) Liberación de nuevos viriones.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Liberación de nuevos viriones." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: paso en el que NA ayuda a separar viriones de la célula; no es función de HA. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Liberación de nuevos viriones." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Entrada por retrotranscripción.": paso de retrovirus como VIH; no explica función de neuraminidasa. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación de nuevos viriones."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Conversión de quiste a trofozoito.": forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación de nuevos viriones."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Penetración larvaria cutánea.": mecanismo de helmintos como uncinarias o Schistosoma, no de influenza. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación de nuevos viriones."

e) No. Aquí se está describiendo "Producción de huevos operculados.": huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Liberación de nuevos viriones."

6. Respuesta: E) Reorganización entre cepas humanas y animales.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Reorganización entre cepas humanas y animales." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: intercambio de segmentos genómicos entre cepas; explica aparición de variantes pandémicas de influenza A. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Fijación irreversible de un solo subtipo.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reorganización entre cepas humanas y animales."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Ausencia de variabilidad genética.": lo contrario de influenza: su genoma segmentado favorece variación. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reorganización entre cepas humanas y animales."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Transformación en bacteria.": imposible: un virus no se convierte en bacteria. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reorganización entre cepas humanas y animales."

d) No. Aquí se está describiendo "Multiplicación sin células.": incorrecto: los virus necesitan células para replicarse. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reorganización entre cepas humanas y animales."

e) Correcta. "Reorganización entre cepas humanas y animales." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

7. Respuesta: B) RT-PCR de muestra respiratoria.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "RT-PCR de muestra respiratoria." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: método molecular apropiado para diagnosticar influenza en fase temprana. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "RT-PCR de muestra respiratoria."

b) Correcta. "RT-PCR de muestra respiratoria." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "Gota gruesa hepática.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "RT-PCR de muestra respiratoria."

d) No. Esa opción apunta a "Biopsia de piel para huevos.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige

reconocer "RT-PCR de muestra respiratoria."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Hemocultivo micológico.": cultivo de sangre para hongos; no diagnostica influenza. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "RT-PCR de muestra respiratoria."

8. Respuesta: D) ARN bicatenario segmentado y cápside resistente. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "ARN bicatenario segmentado y cápside resistente." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "ADN monocatenario envuelto.": combinación que no corresponde a HPV; parvovirus tiene ADN monocatenario pero no envoltura. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN bicatenario segmentado y cápside resistente."

b) No. Aquí se está describiendo "ARN negativo con forma de bala.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN bicatenario segmentado y cápside resistente."

c) No. Esa opción apunta a "Protozoo flagelado con quiste.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN bicatenario segmentado y cápside resistente."

d) Correcta. "ARN bicatenario segmentado y cápside resistente." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Cestodo de varios metros.": helminto plano como Diphyllobothrium/Taenia, no reovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN bicatenario segmentado y cápside resistente."

9. Respuesta: A) Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: mecanismo de diarrea por rotavirus: lesión intestinal y alteración absorbiva/secretora. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "Invasión de vías biliares por adultos.": localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Necrosis de neuronas del asta anterior.": mecanismo de poliovirus parálisis, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Quistes tisulares en músculo.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Toxina de veneno crotálico.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción."

10. Respuesta: C) Vacunación oral.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vacunación oral." porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: puede referirse a vacunas administradas por boca; en rotavirus se usa vacuna oral en lactantes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Antiveneno equino.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación oral."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vacuna HPV.": prevención contra papilomavirus, no contra rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación oral."

c) Correcta. "Vacunación oral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Cocción de pescado.": prevención de cestodos del pescado, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación oral."

e) No. Aquí se está describiendo "Uso de preservativo exclusivo.": barrera preventiva frente a transmisión sexual de VIH y otros agentes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación

oral."

11. Respuesta: C) Los virus A y B poseen 8 segmentos de ARN, mientras que el C posee 7.

La respuesta correcta es C) Los virus A y B poseen 8 segmentos de ARN, mientras que el C posee 7.

Influenza A y B tienen 8 segmentos de ARN monocatenario negativo; influenza C tiene 7 segmentos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Los virus A y B poseen 7 segmentos de ARN, mientras que el C posee 8. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. El virus de la gripe C no posee genoma segmentado, a diferencia de A y B. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Los virus A y B poseen 8 segmentos de ARN, mientras que el C posee 7. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Los virus A y B poseen genoma bicatenario, mientras que el C es monocatenario. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

12. Respuesta: B) El salto antigénico (reorganización) en el virus de la gripe A. La respuesta correcta es B) El salto antigénico (reorganización) en el virus de la gripe A.

Las pandemias se relacionan con cambios mayores por reasociación de segmentos entre cepas humanas y animales, fenómeno característico de influenza A.

Análisis de las alternativas:

A) No. La reorganización genómica en el virus de la gripe B. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. El salto antigénico (reorganización) en el virus de la gripe A. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. La deriva antigénica (mutación) en los virus de la gripe A y B. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. La mutación puntual en la proteína M2 del virus de la gripe A. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

13. Respuesta: A) Núcleo.

La respuesta correcta es A) Núcleo.

Los orthomixovirus son excepción entre virus ARN porque parte central de su transcripción y replicación ocurre en el núcleo.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Núcleo. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Citoplasma. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Aparato de Golgi. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Retículo endoplásmico. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

14. Respuesta: D) Unirse a receptores de ácido siálico y facilitar la fusión de membranas.

La respuesta correcta es D) Unirse a receptores de ácido siálico y facilitar la fusión de membranas.

La HA reconoce ácido siálico y media la unión y fusión; la neuraminidasa participa más en la liberación de viriones.

Análisis de las alternativas:

A) No. Escindir el ácido siálico para permitir la liberación de los viriones. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Formar un canal de protones para la pérdida de la envoltura. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Actuar como la polimerasa principal para la síntesis de ARNm. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Unirse a receptores de ácido siálico y facilitar la fusión de membranas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

15. Respuesta: D) Respuestas de interferón y citocinas.

La respuesta correcta es D) Respuestas de interferón y citocinas.

Fiebre, mialgias y malestar general se deben en gran parte a la respuesta inmune innata, especialmente interferones y citocinas.

Análisis de las alternativas:

A) No. La destrucción directa de las células alveolares. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. La viremia persistente en sangre periférica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. La presencia de anticuerpos IgG en la mucosa. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Respuestas de interferón y citocinas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

16. Respuesta: C) No deben recibir la vacuna convencional, aunque existen alternativas sin proteínas de huevo.

La respuesta correcta es C) No deben recibir la vacuna convencional, aunque



existen alternativas sin proteínas de huevo.

Algunas vacunas antigripales se producen en huevos embrionados y pueden contener trazas de proteínas de huevo; existen alternativas para alérgicos graves.

Análisis de las alternativas:

A) No. Deben recibir únicamente la vacuna de virus vivos atenuados. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. La alergia al huevo no tiene relación con la vacunación antigripal. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. No deben recibir la vacuna convencional, aunque existen alternativas sin proteínas de huevo. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Pueden vacunarse sin restricciones si son mayores de 50 años. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
17. Respuesta: C) ARN bicatenario segmentado y carencia de envoltura. La respuesta correcta es C) ARN bicatenario segmentado y carencia de envoltura.  
Reoviridae se caracteriza por ARN bicatenario segmentado y cápside resistente sin envoltura.

Análisis de las alternativas:

A) No. ARN monocatenario segmentado con envoltura derivativa. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. ARN monocatenario positivo con envoltura lipídica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. ARN bicatenario segmentado y carencia de envoltura. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. ADN bicatenario circular con cápside pleomorfa. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
18. Respuesta: C) Proteólisis de la cápside externa para formar una partícula subviral intermedia. La respuesta correcta es C) Proteólisis de la cápside externa para formar una partícula subviral intermedia.  
La proteólisis por enzimas intestinales, como tripsina, activa la partícula y facilita la entrada a enterocitos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Fusión inmediata con la membrana plasmática del estómago. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Adquisición de una envoltura lipídica a partir de los enterocitos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Proteólisis de la cápside externa para formar una partícula subviral intermedia. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Pérdida total de la cápside interna antes de la penetración. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
19. Respuesta: C) Atrofia y aplanamiento de las microvellosidades del intestino delgado. La respuesta correcta es C) Atrofia y aplanamiento de las microvellosidades del intestino delgado.  
Rotavirus lesiona enterocitos del intestino delgado, altera la absorción y favorece diarrea acuosa.

Análisis de las alternativas:

A) No. Invasión de la mucosa colónica con producción de moco y sangre. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Inducción de una respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis fecal. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Atrofia y aplanamiento de las microvellosidades del intestino delgado. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Bloqueo irreversible de los receptores de HA en el epitelio respiratorio. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
20. Respuesta: C) PCR. La respuesta correcta es C) PCR.  
La PCR detecta material genético viral con alta sensibilidad y permite confirmar la infección por rotavirus.

Análisis de las alternativas:

A) No. Observación directa de corpúsculos de Negri. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Cultivo en agar sangre a 37 grados C. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. PCR. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Hemaglutinación indirecta de suero pareado. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
21. Respuesta: C) Síndrome de Guillain-Barré. La respuesta correcta es C) Síndrome de Guillain-Barré.  
El síndrome de Guillain-Barré puede aparecer después de infecciones y cursa con debilidad o parálisis progresiva.

Análisis de las alternativas:

A) No. Encefalitis espongiforme. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Meningitis bacteriana secundaria. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Síndrome de Guillain-Barré. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Síndrome de Reye. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
22. Respuesta: D) Porque no experimenta saltos antigénicos por no infectar animales comúnmente. La respuesta correcta es D) Porque no experimenta saltos antigénicos por no infectar animales comúnmente.  
Influenza B tiene circulación principalmente humana y no participa del reassortamiento amplio humano-animal que genera pandemias en influenza A.

Análisis de las alternativas:

A) No. Porque es destruido rápidamente por el pH gástrico. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Porque carece de Hemaglutinina en su superficie. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Porque su genoma no está segmentado. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) Correcta. Porque no experimenta saltos antigénicos por no infectar animales comúnmente. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
23. Respuesta: D) 1 a 4 días. La respuesta correcta es D) 1 a 4 días.  
La gripe tiene incubación corta, habitualmente de 1 a 4 días.

Análisis de las alternativas:

A) No. 7 a 14 días. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. 2 a 4 semanas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Menos de 12 horas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) Correcta. 1 a 4 días. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
24. Respuesta: C) Las variantes de las glucoproteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa. La respuesta correcta es C) Las variantes de las glucoproteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa.  
La nomenclatura H y N corresponde a los subtipos de Hemaglutinina y Neuraminidasa.

Análisis de las alternativas:

A) No. El número de segmentos de ARN en el núcleo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. El tipo de polimerasa PB1 que utiliza el virión. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Las variantes de las glucoproteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. La ciudad donde se aisló el virus por primera vez. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
25. Respuesta: C) Por gemación a través de la membrana plasmática. La respuesta correcta es C) Por gemación a través de la membrana plasmática.  
Al ser envuelto, influenza sale principalmente por gemación desde la membrana plasmática.

Análisis de las alternativas:

A) No. Por lisis celular explosiva. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Mediante exocitosis a través de vacuolas del aparato de Golgi. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Por gemación a través de la membrana plasmática. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. A través de puentes intercelulares o nanotubos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
26. Respuesta: D) Reviste el interior de la envoltura y favorece el ensamblaje. La respuesta correcta es D) Reviste el interior de la envoltura y favorece el ensamblaje.  
M1 es proteína de matriz, ubicada bajo la envoltura, importante para estructura y ensamblaje del virión.

Análisis de las alternativas:

A) No. Degrada el moco respiratorio para alcanzar el epitelio. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Es la encargada de la transcripción del ARN viral. puede parecer

relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Actúa como un canal iónico para acidificar el virión. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Reviste el interior de la envoltura y favorece el ensamblaje. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

27. Respuesta: D) Lactantes y niños pequeños.

La respuesta correcta es D) Lactantes y niños pequeños.

Rotavirus es causa importante de gastroenteritis grave en lactantes y niños pequeños, especialmente cuando disminuye la protección materna.

Análisis de las alternativas:

A) No. Recién nacidos en sus primeras 24 horas de vida. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura,

diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Ancianos mayores de 65 años. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Adolescentes y adultos jóvenes. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Lactantes y niños pequeños. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

28. Respuesta: B) Vía fecal-oral.

La respuesta correcta es B) Vía fecal-oral.

Rotavirus se elimina en heces y se transmite por vía fecal-oral, con facilidad en guarderías.

Análisis de las alternativas:

A) No. Gotitas de moco de Pflügge. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Vía fecal-oral. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Picadura de mosquitos Aedes aegypti. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Contacto directo con sangre infectada. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

29. Respuesta: D) Deriva antigénica.

La respuesta correcta es D) Deriva antigénica.

La deriva antigénica son cambios menores por mutaciones puntuales; causan brotes y epidemias estacionales.

Análisis de las alternativas:

A) No. Reorganización triple. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Inhibición por interferón. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Salto antigénico. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Deriva antigénica. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

30. Respuesta: D) Actúa como una enterotoxina que induce la secreción de calcio y cloruro.

La respuesta correcta es D) Actúa como una enterotoxina que induce la secreción de calcio y cloruro.

NSP4 funciona como enterotoxina viral y contribuye a secreción intestinal y diarrea acuosa.

Análisis de las alternativas:

A) No. Inhibe la síntesis de proteínas celulares en el núcleo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Es la proteína de la cápside que se une al ácido siálico. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Facilita la gemación del virus a través de la membrana. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Actúa como una enterotoxina que induce la secreción de calcio y cloruro. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

31. Respuesta: A) Infecta al ganado vacuno, pero no se sabe si causa enfermedad en humanos.

La respuesta correcta es A) Infecta al ganado vacuno, pero no se sabe si causa enfermedad en humanos.

Influenza D se ha asociado especialmente al ganado bovino; su importancia en humanos es incierta.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Infecta al ganado vacuno, pero no se sabe si causa enfermedad en humanos. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Posee 11 segmentos de ARN bicatenario. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Es el único Orthomyxovirus que no posee envoltura. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Es el responsable de la mayoría de las epidemias estivales en niños. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

32. Respuesta: D) Pérdida de la función ciliar y descamación de células epiteliales.

La respuesta correcta es D) Pérdida de la función ciliar y descamación de células epiteliales.

Influenza daña el epitelio respiratorio, reduce el aclaramiento mucociliar y facilita sobreinfecciones bacterianas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Cierre de los bronquiolos por inflamación fibrótica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Aumento excesivo de la producción de moco protector. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Inducción de una respuesta de anticuerpos IgA excesiva. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Pérdida de la función ciliar y descamación de células epiteliales. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

33. Respuesta: A) El número de orden del aislamiento local.

La respuesta correcta es A) El número de orden del aislamiento local.

En la nomenclatura de influenza, ese número identifica el aislamiento local dentro de los aislamientos registrados.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. El número de orden del aislamiento local. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. La cantidad de segmentos de ARN defectuosos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. El nivel de virulencia en una escala del 1 al 10. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. El mes en que se produjo el brote. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

## Paramixovirus

1. Respuesta: B) ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura." porque, dentro de UNIDAD 7 -

Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ADN lineal desnudo con fibras.": descripción de adenovirus, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura."

b) Correcta. "ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esta alternativa se refiere a "ARN positivo desnudo pequeño.": descripción de picornavirus, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura."

d) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario eritrotropo.": descripción de parvovirus B19, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura."

e) No. Esa opción apunta a "ARN bicatenario de cápside triple.": ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura."

2. Respuesta: D) Celulas gigantes multinucleadas por fusion.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Celulas gigantes multinucleadas por fusion." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: efecto citopático por fusión celular; apoya herpesvirus o paramixovirus según el contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Huevos con mamelones regulares.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas gigantes multinucleadas por fusion."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Cuerpos de inclusion nuclear exclusivos.": hallazgo que orienta a virus con replicación nuclear como adenovirus/CMV, no al ECP típico de paramixovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas gigantes multinucleadas por fusion."

c) No. Aquí se está describiendo "Larvas filariformes en piel.": larvas infectantes de Strongyloides/uncinarias; no son efecto citopático viral. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas gigantes multinucleadas por fusion."

d) Correcta. "Celulas gigantes multinucleadas por fusion." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente. La respuesta correcta exige reconocer "Celulas gigantes multinucleadas por fusion."

por fusion."

d) Correcta. "Celulas gigantes multinucleadas por fusion." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Quistes hidatídicos.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Celulas gigantes multinucleadas por fusion."

3. Respuesta: C) Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Tiene reservorio principal en gatos.": fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero."

b) No. Aquí se está describiendo "Se transmite por pescado crudo.": vía de *Diphyllobothrium*, no de sarampión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero."

c) Correcta. "Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Requiere caracol *Lymnaea*.": ciclo de *Fasciola*, no de sarampión. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Es un cestodo intestinal.": clasificación de helmintos planos, no de virus del sarampión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero."

4. Respuesta: A) Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: exantema oral característico de sarampión, junto con fiebre, tos, coriza, conjuntivitis y exantema. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "Hidrofobia luego de mordedura.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Úlceras genitales recurrentes.": cuadro típico de VHS, no de sarampión clásico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Diarrea grasa sin fiebre.": cuadro de malabsorción como giardiasis, no sarampión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Dolor en hipocondrio con huevos biliares.": cuadro de fasciolosis, no sarampión. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik."

5. Respuesta: E) Crup o laringotraqueobronquitis.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Crup o laringotraqueobronquitis." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: manifestación típica de parainfluenza en niños. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Sarcoma de Kaposi.": neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Crup o laringotraqueobronquitis."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Anemia megaloblastica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Crup o laringotraqueobronquitis."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Cisticercosis.": larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Crup o laringotraqueobronquitis."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Fasciolosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe

marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Crup o laringotraqueobronquitis."

e) Correcta. "Crup o laringotraqueobronquitis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

6. Respuesta: B) Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: complicación clásica de parotiditis en varones pospuberales. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Verrugas plantares y condilomas.": cuadros por HPV, no por parainfluenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica."

b) Correcta. "Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esta alternativa se refiere a "Bronquiolititis por sincitios en lactantes.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica."

d) No. Aquí se está describiendo "Hidatidosis hepática.": infección por *Echinococcus* con quistes, no enfermedad por VEB. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica."

e) No. Esa opción apunta a "Anemia por B12.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica."

7. Respuesta: D) Lactantes con bronquiolititis.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Lactantes con bronquiolititis." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Adultos con quiste biliar.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lactantes con bronquiolititis."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Pescadores con anemia B12.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lactantes con bronquiolititis."

c) No. Aquí se está describiendo "Pacientes con mordedura de serpiente.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lactantes con bronquiolititis."

d) Correcta. "Lactantes con bronquiolititis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Embarazadas con HPV cutáneo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lactantes con bronquiolititis."

8. Respuesta: A) Fusion de membranas y sincitios.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Fusion de membranas y sincitios." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Fusion de membranas y sincitios." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Aquí se está describiendo "Retrotranscripción del ARN.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fusion de membranas y sincitios."

c) No. Esa opción apunta a "Liberacion por neuraminidasas.": glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fusion de membranas y sincitios."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Formacion de oocistos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el

enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fusión de membranas y sincitios."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Penetración de cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fusión de membranas y sincitios."

9. Respuesta: C) Triple viral o SRP/MMR.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Triple viral o SRP/MMR." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Vacuna antirrábica posexposición.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Triple viral o SRP/MMR."

b) No. Esa opción apunta a "Vacuna antirrotavirus oral.": virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Triple viral o SRP/MMR."

c) Correcta. "Triple viral o SRP/MMR." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. El concepto de esta alternativa es "Vacuna antihepatitis B exclusiva.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Triple viral o SRP/MMR."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Antiveneno polivalente.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Triple viral o SRP/MMR."

10. Respuesta: E) Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Infecciones respiratorias, sobre todo en niños." porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Teniasis por carne de cerdo.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infecciones respiratorias, sobre todo en niños."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Protozoarios urogenitales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infecciones respiratorias, sobre todo en niños."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Accidentes ofídicos.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infecciones respiratorias, sobre todo en niños."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Trematodos hepáticos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Infecciones respiratorias, sobre todo en niños."

e) Correcta. "Infecciones respiratorias, sobre todo en niños." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

11. Respuesta: D) Virión grande con ARN(-) monocatenario en una nucleocápside helicoidal y posee envoltura.

La respuesta correcta es D) Virión grande con ARN(-) monocatenario en una nucleocápside helicoidal y posee envoltura. Paramixovirus son virus envueltos con ARN monocatenario de sentido negativo y nucleocápside helicoidal.

Análisis de las alternativas:

A) No. Virión con ADN bicatenario circular y nucleocápside icosaédrica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Virión con ARN bicatenario segmentado sin envoltura. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Virión con ARN de cadena positiva, segmentado y desnudo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Virión grande con ARN(-) monocatenario en una nucleocápside helicoidal y posee envoltura. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

12. Respuesta: D) En el citoplasma celular.

La respuesta correcta es D) En el citoplasma celular.

A diferencia de influenza, los paramixovirus realizan su ciclo replicativo en el

citoplasma.

Análisis de las alternativas:

A) No. En el núcleo de la célula. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. En la cara externa del retículo endoplásmico rugoso exclusivamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. En el espacio intermembranoso de la mitocondria. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. En el citoplasma celular. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

13. Respuesta: A) Ácido siálico de los glucolípidos de la superficie celular.

La respuesta correcta es A) Ácido siálico de los glucolípidos de la superficie celular.

Las proteínas de adhesión de varios paramixovirus reconocen receptores de la superficie celular, como ácido siálico según el virus.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Ácido siálico de los glucolípidos de la superficie celular. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Colesterol de las balsas lipídicas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Proteínas de transporte de sodio. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Fosfolípidos neutros de la bicapa lipídica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

14. Respuesta: B) Sincitios.

La respuesta correcta es B) Sincitios.

La proteína F favorece fusión célula-célula y formación de sincitios multinucleados.

Análisis de las alternativas:

A) No. Coilocitosis. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Sincitios. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Lisis por apoptosis. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Cuerpos de Negri. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

15. Respuesta: C) Las gotitas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire hasta 2 horas.

La respuesta correcta es C) Las gotitas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire hasta 2 horas.

El sarampión es extremadamente contagioso por vía respiratoria; partículas infecciosas pueden permanecer suspendidas por un tiempo.

Análisis de las alternativas:

A) No. Se requiere contacto directo con fluidos gastrointestinales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Solo se transmite durante la fase de exantema activo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Las gotitas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire hasta 2 horas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Se transmite principalmente por picaduras de mosquitos infectados. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

16. Respuesta: A) Manchas de Koplik.

La respuesta correcta es A) Manchas de Koplik.

Las manchas de Koplik en mucosa oral son un dato clásico y muy sugestivo de sarampión antes del exantema.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Manchas de Koplik. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Adenopatías cervicales dolorosas crónicas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Fiebre reumática aguda. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Presencia de vesículas umbilicadas en el tronco. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

17. Respuesta: B) La respuesta de los linfocitos T frente a las células endoteliales infectadas.

La respuesta correcta es B) La respuesta de los linfocitos T frente a las células endoteliales infectadas.

El exantema del sarampión se relaciona con la respuesta inmune celular frente a células infectadas, no solo con daño directo viral.

Análisis de las alternativas:

A) No. Producción excesiva de histamina por mastocitos pulmonares. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. La respuesta de los linfocitos T frente a las células endoteliales infectadas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
C) No. Depósito de complejos inmunes circulantes en la dermis. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Lisis directa de los melanocitos por el virus. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

18. Respuesta: C) Neumonía.

La respuesta correcta es C) Neumonía.

La neumonía, viral o por sobreinfección bacteriana, es la causa principal de muerte por sarampión.

Análisis de las alternativas:

A) No. Panencefalitis esclerosante subaguda. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Diarrea severa con deshidratación. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Neumonía. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Encefalitis aguda postinfecciosa. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

19. Respuesta: B) Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos.

La respuesta correcta es B) Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos.

Paramixovirus producen sincitios; en sarampión pueden observarse células gigantes multinucleadas e inclusiones.

Análisis de las alternativas:

A) No. Linfocitos atípicos de Downey. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Células con núcleos en anillo de sello. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Células en 'ojo de bueño'. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

20. Respuesta: D) Sarampión, Paperas y Rubéola.

La respuesta correcta es D) Sarampión, Paperas y Rubéola.

SPR o triple viral protege contra sarampión, paperas/parotiditis y rubéola.

Análisis de las alternativas:

A) No. Sarampión, Pertussis y Rubéola. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Sarampión, Parainfluenza y Rinovirus. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Sífilis, Polio y Rubéola. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Sarampión, Paperas y Rubéola. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

21. Respuesta: C) Parainfluenza no causa viremia ni produce enfermedades sistémicas.

La respuesta correcta es C) Parainfluenza no causa viremia ni produce enfermedades sistémicas.

Parainfluenza suele permanecer localizada en vía respiratoria; sarampión es sistémico, con viremia y exantema.

Análisis de las alternativas:

A) No. Parainfluenza causa una infección sistémica grave con viremia. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Sarampión solo afecta las vías respiratorias superiores. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Parainfluenza no causa viremia ni produce enfermedades sistémicas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Parainfluenza tiene un solo serotipo, mientras que el sarampión tiene cuatro. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

22. Respuesta: B) Laringotraqueobronquitis (Crup).

La respuesta correcta es B) Laringotraqueobronquitis (Crup).

Parainfluenza 1 y 2 se asocian de forma clásica a crup o laringotraqueobronquitis.

Análisis de las alternativas:

A) No. Meningitis linfocítica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Laringotraqueobronquitis (Crup). responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Faringoamigdalitis purulenta. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Bronquiolitis obliterante crónica. puede parecer relacionada con

virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

23. Respuesta: C) Inhalación de vapores fríos o calientes.

La respuesta correcta es C) Inhalación de vapores fríos o calientes.

El manejo suele ser sintomático y de soporte; el material menciona vapores o medidas locales para aliviar síntomas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico. puede parecer

relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Vacunación de emergencia tras la exposición. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Inhalación de vapores fríos o calientes. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Administración inmediata de ribavirina intravenosa. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

24. Respuesta: A) Testículos, ovarios, páncreas y sistema nervioso central.

La respuesta correcta es A) Testículos, ovarios, páncreas y sistema nervioso central.

El virus de la parotiditis puede afectar gónadas, páncreas y SNC, además de las parótidas.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Testículos, ovarios, páncreas y sistema nervioso central. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Ventriculos cardíacos y válvulas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Solo las glándulas lagrimales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Hígado y bazo exclusivamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

25. Respuesta: B) Esterilidad o infertilidad por atrofia testicular.

La respuesta correcta es B) Esterilidad o infertilidad por atrofia testicular.

La orquitis postpuberal puede causar atrofia testicular y, en algunos casos, comprometer fertilidad.

Análisis de las alternativas:

A) No. Cáncer de próstata a corto plazo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Esterilidad o infertilidad por atrofia testicular. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Aumento excesivo de la producción de testosterona. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Desarrollo de hernias inguinales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

26. Respuesta: D) Debido a la infección y daño directo de las células del páncreas.

La respuesta correcta es D) Debido a la infección y daño directo de las células del páncreas.

La parotiditis puede afectar el páncreas; el daño pancreático se ha relacionado con alteraciones metabólicas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Porque el virus consume todas las reservas de glucosa del cuerpo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Como efecto secundario de la vacuna SPR. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Por una reacción cruzada con la glándula tiroides únicamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Debido a la infección y daño directo de las células del páncreas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

27. Respuesta: B) Dura toda la vida.

La respuesta correcta es B) Dura toda la vida.

La infección natural por parotiditis suele conferir inmunidad duradera.

Análisis de las alternativas:

A) No. Breve, requiriendo reinfecciones cada año. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Dura toda la vida. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Solo protege contra la orquitis, no contra la parotiditis. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Aproximadamente 5 años solamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

28. Respuesta: C) Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

La respuesta correcta es C) Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

El VRS es causa principal de bronquiolitis y enfermedad respiratoria grave en lactantes.

Análisis de las alternativas:

A) No. Metapneumovirus humano. puede parecer relacionada con virología,

pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Bordetella pertussis. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Virus Respiratorio Sincitial (VRS). responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Virus de la Influenza A. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

29. Respuesta: D) Obstrucción por tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico.

La respuesta correcta es D) Obstrucción por tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico.

El VRS lesiona bronquiolos y genera tapones de moco, fibrina y detritos que obstruyen vías aéreas pequeñas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Parálisis de los músculos intercostales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Espasmo laríngeo reflejo permanente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Destrucción total de los capilares alveolares. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) Correcta. Obstrucción por tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

30. Respuesta: C) Casi siempre en invierno, todos los años.  
La respuesta correcta es C) Casi siempre en invierno, todos los años.  
Los brotes de VRS son típicos en invierno y se repiten anualmente.

Análisis de las alternativas:

A) No. Principalmente durante el verano. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Cada 10 años, coincidiendo con sequías. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Casi siempre en invierno, todos los años. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Únicamente en climas tropicales húmedos sin variación estacional. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

31. Respuesta: C) RT-PCR.  
La respuesta correcta es C) RT-PCR.

La RT-PCR permite detectar genomas virales respiratorios con rapidez y sensibilidad.

Análisis de las alternativas:

A) No. Observación directa por microscopía electrónica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Prueba de la tuberculina. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. RT-PCR. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Hemocultivos en medios enriquecidos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

32. Respuesta: C) Niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos.  
La respuesta correcta es C) Niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos.  
El metapneumovirus puede ser más grave en extremos de edad e inmunodeprimidos.

Análisis de las alternativas:

A) No. No causa enfermedad grave en ningún grupo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Exclusivamente en pacientes con enfermedades renales crónicas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Solo en adultos jóvenes sanos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

33. Respuesta: D) Facilitar el ensamblaje y revestir la cara interna de la envoltura.

La respuesta correcta es D) Facilitar el ensamblaje y revestir la cara interna de la envoltura.

La proteína M organiza el ensamblaje y se ubica asociada a la cara interna de la envoltura viral.

Análisis de las alternativas:

A) No. Actuar como receptor para el ácido siálico. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Transcribir el ARN genómico en ARNm. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Inducir la formación de anticuerpos neutralizantes. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura,

diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) Correcta. Facilitar el ensamblaje y revestir la cara interna de la envoltura. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

34. Respuesta: A) El ser humano es su único hospedador.

La respuesta correcta es A) El ser humano es su único hospedador.

El material destaca estos paramixovirus humanos como agentes de transmisión interhumana, sin vector artrópodo.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. El ser humano es su único hospedador. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
B) No. Todos requieren ambientes desérticos para su propagación. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Todos se transmiten por vectores artrópodos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Poseen más de 20 serotipos diferentes cada uno. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

35. Respuesta: C) Antes y después de la aparición de los síntomas.

La respuesta correcta es C) Antes y después de la aparición de los síntomas.

El sarampión puede transmitirse desde antes del exantema y continuar durante el periodo sintomático.

Análisis de las alternativas:

A) No. Exactamente 14 días después de que desaparece la fiebre. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Solo cuando las costras se caen. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Antes y después de la aparición de los síntomas. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Solo durante la presencia de las manchas de Koplik. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

36. Respuesta: C) Sarampión.

La respuesta correcta es C) Sarampión.

La combinación de fiebre, tos, coriza, conjuntivitis y exantema cefalocaudal es típica de sarampión.

Análisis de las alternativas:

A) No. Infección bacteriana por estreptococo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) No. Parotiditis aguda bilateral. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Sarampión. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Gripe estacional común. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

## Rhabdovirus

1. Respuesta: D) Virión envuelto en forma de bala.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Virión envuelto en forma de bala." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: morfología clásica del virus rábico. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Capsidemia icosaédrica desnuda pequeña.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virión envuelto en forma de bala."  
b) No. El concepto de esta alternativa es "Bacilo grampositivo esporulado.": un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virión envuelto en forma de bala."  
c) No. Esta alternativa se refiere a "Huevo operculado grande.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virión envuelto en forma de bala."  
d) Correcta. "Virión envuelto en forma de bala." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
e) No. Esa opción apunta a "Gusano plano segmentado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virión envuelto en forma de bala."

2. Respuesta: C) ARN monocatenario negativo.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ARN monocatenario negativo." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma,



envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "ADN circular bicatenario.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario negativo."
- b) No. Esta alternativa se refiere a "ARN positivo segmentado.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario negativo."
- c) Correcta. "ARN monocatenario negativo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a "ADN monocatenario lineal.": la estructura de parvovirus B19: ADN de cadena simple lineal, muy pequeño y sin envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario negativo."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ARN bicatenario con cápside triple.": ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario negativo."

3. Respuesta: A) Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo "Ingestión de pescado crudo.": vía de Diphyllbothrium latum, no de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida."
- c) No. Esa opción apunta a "Picadura de Anopheles hembra.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Contacto con heces de gato con oquistes.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de oquistes por heces. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida."
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Consumo de berro con metacercarias.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida."

4. Respuesta: E) Herida cercana al cerebro.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Herida cercana al cerebro." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Lesión lejana en pie sin inoculo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro."
- b) No. Esa opción apunta a "Vacunación previa completa.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro."
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Baja concentración viral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro."
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Piel intacta sin contacto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro."
- e) Correcta. "Herida cercana al cerebro." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

5. Respuesta: B) Transporte neural retrogrado.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Transporte neural retrogrado." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Huevos en vía biliar.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transporte neural retrogrado."
- b) Correcta. "Transporte neural retrogrado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Fecalismo intestinal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transporte neural retrogrado."
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Viremia masiva por eritrocitos.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transporte neural retrogrado."
- e) No. Aquí se está describiendo "Larvas por circulación portal.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transporte neural retrogrado."

6. Respuesta: D) 10 días.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "10 días." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "24 horas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "10 días."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "3 meses.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "10 días."
- c) No. Esta alternativa se refiere a "2 años.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "10 días."
- d) Correcta. "10 días." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a "18 días.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "10 días."

7. Respuesta: A) Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Diarrea grasa crónica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma."
- c) No. Aquí se está describiendo "Exantema en mejilla abofeteada.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma."
- d) No. Esa opción apunta a "Condilomas genitales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Anemia megaloblástica por pescado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico

que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma."

8. Respuesta: C) Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo. La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Cerrar la herida sin limpieza.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo."

b) No. Aquí se está describiendo "Aplicar torniquete por 24 horas.": medida contraindicada porque puede empeorar isquemia y daño local. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo."

c) Correcta. "Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Esperar fiebre antes de actuar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Dar solo analgésico y alta.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo."

9. Respuesta: E) Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso. La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: inclusiones citoplasmáticas neuronales clásicas de rabia, observadas sobre todo en diagnóstico postmortem. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Huevos mamelonados en heces.": huevos típicos de Ascaris; no son hallazgos citológicos de herpes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso."

b) No. Esa opción apunta a "Quistes de Giardia en duodeno.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Proglótides gravidas.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Amastigotes en sangre periférica.": forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso."

e) Correcta. "Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

10. Respuesta: B) ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "ADN pequeños desnudos eritrotropos.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica."

b) Correcta. "ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. El concepto de esta alternativa es "Protozoos con flebotomo vector.":

insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Cestodos por carne bovina.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica."

e) No. Aquí se está describiendo "Trematodos con caracol Lymnaea.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica."

11. Respuesta: B) Morfología en forma de bala con envoltura lipídica.

La respuesta correcta es B) Morfología en forma de bala con envoltura lipídica. El virus de la rabia, Rhabdoviridae, es un virus envuelto con morfología clásica en forma de bala.

Análisis de las alternativas:

A) No. Cápside filamentosas de gran longitud sin envoltura. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Morfología en forma de bala con envoltura lipídica. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Forma pleomórfica con genoma de ADN bicatenario. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Estructura icosaédrica desnuda con espículas de glucoproteína. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

12. Respuesta: A) Citoplasma de la célula hospedadora.

La respuesta correcta es A) Citoplasma de la célula hospedadora.

El virus rábico es un virus ARN negativo que replica en el citoplasma.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Citoplasma de la célula hospedadora. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Asociado exclusivamente a la membrana citoplasmática. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Dentro de las mitocondrias para aprovechar el ATP. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Núcleo celular para la transcripción genómica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

13. Respuesta: B) En el tejido muscular del sitio de inoculación.

La respuesta correcta es B) En el tejido muscular del sitio de inoculación.

Tras la mordedura, el virus puede replicarse localmente en músculo antes de entrar a nervios periféricos y avanzar al SNC.

Análisis de las alternativas:

A) No. En los ganglios linfáticos regionales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. En el tejido muscular del sitio de inoculación. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Directamente en la sangre. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. En las glándulas salivales del humano infectado. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

14. Respuesta: D) De 60 a 365 días.

La respuesta correcta es D) De 60 a 365 días.

El periodo de incubación de rabia es variable y puede extenderse de semanas a meses; el material menciona 60 a 365 días.

Análisis de las alternativas:

A) No. De 2 a 10 días máximo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. De 1 a 5 años invariablemente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Exactamente 10 días en todos los casos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. De 60 a 365 días. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

15. Respuesta: A) La proximidad de la herida al cerebro.

La respuesta correcta es A) La proximidad de la herida al cerebro.

Cuanto más cerca está la mordedura del SNC y mayor es el inóculo, menor suele ser la incubación.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. La proximidad de la herida al cerebro. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. La administración inmediata de antibióticos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. El tipo de grupo sanguíneo del huésped. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro

clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. El sexo de la persona afectada, puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

16. Respuesta: A) Es nula durante el transcurso de la infección.

La respuesta correcta es A) Es nula durante el transcurso de la infección.

El material señala que la respuesta celular efectiva es prácticamente ausente durante el curso clínico, lo que contribuye a la gravedad.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Es nula durante el transcurso de la infección. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Es la principal defensa que elimina al virus del músculo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Solo se activa en la fase de coma. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Se activa rápidamente tras la mordedura del animal. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

17. Respuesta: A) Porque los anticuerpos no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está establecido.

La respuesta correcta es A) Porque los anticuerpos no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está establecido.

Cuando aparecen anticuerpos, el virus ya suele estar en el sistema nervioso y el cuadro clínico está avanzado.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Porque los anticuerpos no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está establecido. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. Porque los anticuerpos no pueden entrar al SNC. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Porque el virus destruye los linfocitos B del suero. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Porque el virus cambia sus antígenos de superficie constantemente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

18. Respuesta: C) Murciélago hematófago (Desmodus rotundus).

La respuesta correcta es C) Murciélago hematófago (Desmodus rotundus).

El material destaca al murciélago hematófago como reservorio relevante de rabia silvestre.

Análisis de las alternativas:

A) No. Perros callejeros sin vacunar. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Ratones y otros pequeños roedores domésticos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Murciélago hematófago (Desmodus rotundus). responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Aves de rapiña infectadas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

19. Respuesta: D) Al dolor intenso que sienten al intentar tragar agua.

La respuesta correcta es D) Al dolor intenso que sienten al intentar tragar agua.

La hidrofobia se relaciona con espasmos dolorosos al intentar deglutir, no con miedo psicológico simple al agua.

Análisis de las alternativas:

A) No. A que el agua destruye la envoltura del virus en la garganta. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. A una mutación del virus que lo hace hidrofóbico. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. A la pérdida total del sentido de la sed. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Al dolor intenso que sienten al intentar tragar agua. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

20. Respuesta: B) Agregados de nucleocápsides víricas; aparecen en el 70%-90% de los casos.

La respuesta correcta es B) Agregados de nucleocápsides víricas; aparecen en el 70%-90% de los casos.

Los corpúsculos de Negri son inclusiones citoplasmáticas neuronales asociadas a nucleocápsides del virus rábico.

Análisis de las alternativas:

A) No. Células gigantes multinucleadas; aparecen en el 100% de los infectados. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Agregados de nucleocápsides víricas; aparecen en el 70%-90% de los casos. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Cristales de sales de calcio; aparecen en el 15% de los pacientes. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Vacuolas de grasa en el citoplasma; aparecen solo en perros. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

21. Respuesta: C) RT-PCR.

La respuesta correcta es C) RT-PCR.

La RT-PCR permite detectar ARN viral de forma rápida y sensible.

Análisis de las alternativas:

A) No. Cultivo en huevos embrionados. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Tinción de Gram en líquido cefalorraquídeo. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. RT-PCR. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Prueba de aglutinación en látex. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

22. Respuesta: D) Lavar profundamente la herida con agua y jabón.

La respuesta correcta es D) Lavar profundamente la herida con agua y jabón.

El lavado inmediato y profundo reduce la carga viral local antes de que el virus entre en nervios periféricos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Suturar la herida lo más rápido posible. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Aplicar un torniquete por encima de la lesión. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. Administrar analgésicos potentes y esperar síntomas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) Correcta. Lavar profundamente la herida con agua y jabón. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

23. Respuesta: B) Vacuna de virus muertos combinada con inmunoglobulina antirrábica humana.

La respuesta correcta es B) Vacuna de virus muertos combinada con inmunoglobulina antirrábica humana.

La profilaxis completa combina vacuna antirrábica e inmunoglobulina en personas no vacunadas previamente, según riesgo.

Análisis de las alternativas:

A) No. Dosis única de suero fisiológico y antibióticos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) Correcta. Vacuna de virus muertos combinada con inmunoglobulina antirrábica humana. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

C) No. Aislamiento en cuarto oscuro durante 40 días sin medicación. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. Inyección de virus vivos atenuados directamente en la herida. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

24. Respuesta: A) 10 días.

La respuesta correcta es A) 10 días.

La observación de perros y gatos agresores durante 10 días se usa para valorar riesgo de transmisión.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. 10 días. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

B) No. 6 meses. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) No. 24 horas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

D) No. 45 días. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

25. Respuesta: C) Fobias al viento y a movimientos bruscos.

La respuesta correcta es C) Fobias al viento y a movimientos bruscos.

La rabia puede presentar aerofobia y espasmos desencadenados por estímulos como aire o movimientos.

Análisis de las alternativas:

A) No. Fobia al contacto con metales. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Miedo intenso a la oscuridad. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

C) Correcta. Fobias al viento y a movimientos bruscos. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.

D) No. Rechazo absoluto a los alimentos sólidos únicamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

26. Respuesta: C) Trasplante de tejidos infectados, como la córnea.

La respuesta correcta es C) Trasplante de tejidos infectados, como la córnea.

Aunque la mordedura es la vía principal, se han descrito transmisiones por trasplante de tejidos infectados.

Análisis de las alternativas:

A) No. Contacto estrecho piel con piel sin heridas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

B) No. Picadura de mosquitos que previamente picaron a un animal rabioso.

puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) Correcta. Trasplante de tejidos infectados, como la córnea. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
D) No. Consumo de carne de perro cocida. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

27. Respuesta: A) Insertadas en la envoltura lipídica externa.  
La respuesta correcta es A) Insertadas en la envoltura lipídica externa.  
Las espículas glucoproteicas de los virus envueltos se proyectan desde la envoltura externa.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Insertadas en la envoltura lipídica externa. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
B) No. En el interior del núcleo helicoidal. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Libres en el citoplasma de la célula sin formar parte del virión. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Constituyendo la matriz proteica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

28. Respuesta: B) Parálisis que origina insuficiencia respiratoria.  
La respuesta correcta es B) Parálisis que origina insuficiencia respiratoria.  
La muerte en rabia se relaciona con compromiso neurológico progresivo y falla respiratoria por parálisis.

Análisis de las alternativas:

A) No. Parálisis intestinal con necrosis gástrica. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) Correcta. Parálisis que origina insuficiencia respiratoria. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
C) No. Parálisis de los músculos de la visión. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Parálisis de los miembros inferiores únicamente. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

29. Respuesta: A) Si se analiza al animal y se demuestra que no presenta la infección.  
La respuesta correcta es A) Si se analiza al animal y se demuestra que no presenta la infección.  
La decisión puede modificarse si el animal es evaluado y se demuestra que no está infectado; no debe basarse en tamaño, localización o aparente fortaleza inmune.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Si se analiza al animal y se demuestra que no presenta la infección. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
B) No. Si la mordedura fue en el pie y no sangró mucho. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
C) No. Si el paciente tiene un sistema inmune muy fuerte. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. Si el perro es de raza pequeña o cachorro. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

30. Respuesta: B) Gotear o infiltrar suero antirrábico alrededor de la herida.  
La respuesta correcta es B) Gotear o infiltrar suero antirrábico alrededor de la herida.  
La inmunoglobulina debe infiltrarse localmente alrededor de la herida para neutralizar virus en el sitio de entrada.

Análisis de las alternativas:

A) No. Beber el suero mezclado con jugos cítricos. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
B) Correcta. Gotear o infiltrar suero antirrábico alrededor de la herida. responde directamente al dato clave solicitado en el enunciado.  
C) No. Inyectarlo por vía intravenosa en el brazo opuesto. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.  
D) No. No utilizarlo nunca para evitar alergias cutáneas. puede parecer relacionada con virología, pero no corresponde al mecanismo, estructura, diagnóstico o cuadro clínico específico que pregunta el enunciado.

## Togavirus y Flavivirus

1. Respuesta: C) ARN monocatenario positivo con envoltura.  
La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ARN monocatenario positivo con envoltura." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.  
Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ADN bicatenario sin envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una

estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."

b) No. El concepto de esta alternativa es "ARN negativo en forma de bala.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."

c) Correcta. "ARN monocatenario positivo con envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
d) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario eritrotropo.": descripción de parvovirus B19, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."

e) No. Esa opción apunta a "Genoma circular con transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."

2. Respuesta: A) Citoplasma.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citoplasma." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Citoplasma." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
b) No. Esta alternativa se refiere a "Núcleo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma."  
c) No. Aquí se está describiendo "Eritrocito maduro.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma."  
d) No. Esa opción apunta a "Conducto biliar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma."  
e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Ganglio sensorial.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma."

3. Respuesta: E) Mosquito hembra hematofago.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Mosquito hembra hematofago." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Caracol Lymnaea.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mosquito hembra hematofago."  
b) No. Aquí se está describiendo "Perro domestico.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mosquito hembra hematofago."  
c) No. Esa opción apunta a "Pescado de agua dulce.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mosquito hembra hematofago."  
d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Gato definitivo.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de oocistos por heces. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mosquito hembra hematofago."  
e) Correcta. "Mosquito hembra hematofago." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

4. Respuesta: B) Potenciación dependiente de anticuerpos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Potenciación dependiente de anticuerpos." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Latencia en ganglios dorsales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase

sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Potenciación dependiente de anticuerpos."

b) Correcta. "Potenciación dependiente de anticuerpos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Autoinfección intestinal.": capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como *Strongyloides* o *Hymenolepis nana*; no es variación de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Potenciación dependiente de anticuerpos."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Toxina neurotrópica salival.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Potenciación dependiente de anticuerpos."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Destrucción de vitamina B12.": vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Potenciación dependiente de anticuerpos."

5. Respuesta: D) NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.  
La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días." porque, dentro de UNIDAD 9 - *Togavirus* y *Flavivirus*, ese dato encaja con el tema de virología: antígeno útil en diagnóstico temprano de dengue, antes de que predominen IgM/IgG. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Cinta adhesiva y coproparasitológico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Gota gruesa para larvas.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Cultivo de bilis para huevos.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días."

d) Correcta. "NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo "Biopsia de músculo para quistes.": forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminados en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días."

6. Respuesta: A) Fiebre con artralgias intensas y persistentes.  
La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Fiebre con artralgias intensas y persistentes." porque, dentro de UNIDAD 9 - *Togavirus* y *Flavivirus*, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Fiebre con artralgias intensas y persistentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. El concepto de esta alternativa es "Hidrofobia y espasmos faríngeos.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre con artralgias intensas y persistentes."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Diarrea grasa por malabsorción.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre con artralgias intensas y persistentes."

d) No. Aquí se está describiendo "Parálisis flácida por asta anterior.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre con artralgias intensas y persistentes."

e) No. Esa opción apunta a "Hematuria por huevos vesicales.": manifestación típica de *Schistosoma haematobium*, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre con artralgias intensas y persistentes."

7. Respuesta: C) Síndrome congénito y microcefalia.  
La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Síndrome congénito y microcefalia." porque, dentro de UNIDAD 9 - *Togavirus* y *Flavivirus*, ese dato encaja con el

tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Eritema infeccioso por B19.": cuadro clásico de parvovirus B19, no de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Síndrome congénito y microcefalia."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Sarcoma de Kaposi neonatal.": neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Síndrome congénito y microcefalia."

c) Correcta. "Síndrome congénito y microcefalia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esa opción apunta a "Hidatidosis pulmonar fetal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Síndrome congénito y microcefalia."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Aplasia medular por HPV.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Síndrome congénito y microcefalia."

8. Respuesta: E) Vacuna viva atenuada y control vectorial.  
La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vacuna viva atenuada y control vectorial." porque, dentro de UNIDAD 9 - *Togavirus* y *Flavivirus*, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Vacuna antirrábica únicamente.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacuna viva atenuada y control vectorial."

b) No. Aquí se está describiendo "Antibiótico macrólido.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacuna viva atenuada y control vectorial."

c) No. Esa opción apunta a "Antihelmíntico para perros.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacuna viva atenuada y control vectorial."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cocción de pescado.": prevención de cestodos del pescado, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacuna viva atenuada y control vectorial."

e) Correcta. "Vacuna viva atenuada y control vectorial." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

9. Respuesta: B) Rubivirus.  
La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Rubivirus." porque, dentro de UNIDAD 9 - *Togavirus* y *Flavivirus*, ese dato encaja con el tema de virología: género al que pertenece el virus de la rubéola. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Flavivirus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Rubivirus."

b) Correcta. "Rubivirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Lentivirus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Rubivirus."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Enterovirus.": picornavirus resistentes al ácido y transmisión fecal-oral; no siempre producen enfermedad entérica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Rubivirus."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Rhabdovirus.": virus de la rabia, con forma de bala y ARN negativo; no produce verrugas por queratinocitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Rubivirus."

10. Respuesta: D) Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.  
La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles." porque, dentro de UNIDAD 9 - *Togavirus* y *Flavivirus*, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no

responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Tratamiento con antiveneno.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Hervir pescado de río.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles".

c) No. El concepto de esta alternativa es "Desección de quistes.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles".

d) Correcta. "Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo "Observación de animales 10 días.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles".

11. Respuesta: B) Hospedador terminal

La opción correcta es "Hospedador terminal" porque en muchos arbovirus la viremia humana no alcanza una intensidad suficiente para infectar a nuevos mosquitos, por lo que la transmisión se corta en el ser humano.

Análisis de las alternativas:

A) No. El vector de estos ciclos es un artrópodo hematófago, como mosquitos o garrapatas, no el humano.

B) Correcta. El ser humano puede enfermar, pero en muchos ciclos no mantiene la transmisión hacia otros vectores.

C) No. Los reservorios naturales suelen ser animales, como aves o monos, que mantienen el virus en la naturaleza.

D) No. El humano no suele ser el reservorio natural asintomático; con frecuencia presenta enfermedad clínica.

12. Respuesta: B) Ictericia con coloración amarilla de piel y ojos

La opción correcta es "Ictericia con coloración amarilla de piel y ojos" porque la fiebre amarilla tiene tropismo hepático importante; el daño hepático produce ictericia, signo que la distingue de cuadros como dengue, zika o chikungunya.

Análisis de las alternativas:

A) No. La microcefalia congénita se asocia especialmente a Zika durante la gestación.

B) Correcta. La ictericia refleja compromiso hepático y es un dato clásico de fiebre amarilla.

C) No. La artralgia severa y persistente orienta más a chikungunya.

D) No. El exantema puede aparecer en varias arbovirosis y no diferencia específicamente fiebre amarilla.

13. Respuesta: B) Tratamiento de soporte con líquidos y paracetamol

La opción correcta es "Tratamiento de soporte con líquidos y paracetamol" porque no existe un antiviral específico de uso general para la mayoría de estas arbovirosis; el manejo se basa en hidratación, control de fiebre y evitar fármacos que aumenten sangrado.

Análisis de las alternativas:

A) No. Los antibióticos actúan contra bacterias y no tratan infecciones virales por arbovirus.

B) Correcta. La hidratación y el paracetamol son medidas de soporte adecuadas para fiebre y malestar.

C) No. La aspirina puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente si se trata de dengue.

D) No. El aciclovir se usa contra herpesvirus, no contra alfavirus o flavivirus.

14. Respuesta: D) Determinación de anticuerpos IgM

La opción correcta es "Determinación de anticuerpos IgM" porque la IgM aparece en infección reciente o activa y es más útil que la IgG aislada para demostrar un proceso agudo.

Análisis de las alternativas:

A) No. La neutrofilia es un dato inespecífico y puede orientar más a procesos bacterianos.

B) No. La IgG puede persistir por infecciones pasadas o vacunación, por eso no confirma por sí sola infección activa.

C) No. Los virus no se identifican de rutina por microscopía óptica convencional.

D) Correcta. La IgM indica respuesta reciente y apoya infección activa o reciente por arbovirus.

15. Respuesta: D) Su modo de transmisión respiratoria

La opción correcta es "Su modo de transmisión respiratoria" porque aunque comparte características estructurales de Togaviridae, la rubéola no es un arbovirus: se transmite de persona a persona por vía respiratoria.

Análisis de las alternativas:

A) No. La rubéola es un virus ARN, no ADN bicatenario.

B) No. La rubéola es un virus envuelto, como otros togavirus.

C) No. El material la describe con un solo serotipo, lo que favorece el control por vacuna.

D) Correcta. La transmisión respiratoria la diferencia de alfavirus transmitidos por artrópodos.

16. Respuesta: B) Presencia de anticuerpos no neutralizantes

La opción correcta es "Presencia de anticuerpos no neutralizantes" porque los anticuerpos no neutralizantes pueden unirse al virus y facilitar su entrada en células con receptores Fc, fenómeno conocido como potenciación dependiente de anticuerpos.

Análisis de las alternativas:

A) No. El estado de vitamina D no explica este mecanismo de entrada viral.

B) Correcta. Los anticuerpos no neutralizantes facilitan la entrada viral en células con receptores Fc y pueden agravar la infección.

C) No. La vacuna contra fiebre amarilla genera anticuerpos protectores neutralizantes contra ese virus.

D) No. Los antibióticos no modifican la entrada de flavivirus por receptores Fc.

17. Respuesta: B) Aedes aegypti

La opción correcta es "Aedes aegypti" porque Aedes aegypti es el principal mosquito urbano implicado en la transmisión de dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla urbana.

Análisis de las alternativas:

A) No. Anopheles se relaciona principalmente con malaria.

B) Correcta. Aedes aegypti es el vector urbano más importante para dengue y chikungunya.

C) No. Culex puede transmitir otros arbovirus, pero no es el principal vector urbano clásico de dengue y chikungunya.

D) No. Aedes albopictus también puede participar, pero el vector urbano principal señalado es Aedes aegypti.

18. Respuesta: D) Disfunción renal y hemorragias

La opción correcta es "Disfunción renal y hemorragias" porque la etapa grave de fiebre amarilla se asocia con compromiso hepatorenal, sangrado y falla multiorgánica.

Análisis de las alternativas:

A) No. La cefalea puede aparecer en la fase inicial, pero no define gravedad.

B) No. El dolor de espalda puede ser parte del cuadro febril inicial.

C) No. El prurito o exantema no es el signo clásico de progresión grave.

D) Correcta. La disfunción renal y las hemorragias indican enfermedad sistémica grave.

19. Respuesta: C) Trombocitopenia

La opción correcta es "Trombocitopenia" porque en la comparación, dengue se caracteriza por trombocitopenia más marcada, mientras chikungunya destaca por artralgias intensas.

Análisis de las alternativas:

A) No. La linfopenia marcada se describe más en chikungunya.

B) No. La fiebre puede aparecer en ambos, y el material marca mayor intensidad en chikungunya.

C) Correcta. La trombocitopenia intensa es más típica de dengue.

D) No. Las artralgias intensas son un rasgo cardinal de chikungunya.

20. Respuesta: D) 3 a 6 días

La opción correcta es "3 a 6 días" porque el periodo de incubación clásico de fiebre amarilla es corto, alrededor de 3 a 6 días después de la picadura infectante.

Análisis de las alternativas:

A) No. Doce a veinticuatro horas es demasiado corto para el periodo típico.

B) No. Veintiún días excede el periodo habitual.

C) No. Una a dos semanas no corresponde al intervalo clásico señalado.

D) Correcta. Tres a seis días es el periodo de incubación típico.

21. Respuesta: D) Si presenta fiebre justo al momento del parto o días antes

La opción correcta es "Si presenta fiebre justo al momento del parto o días antes" porque el riesgo neonatal aumenta cuando la madre está viremica cerca del parto, especialmente si tiene fiebre en los días próximos al nacimiento.

Análisis de las alternativas:

A) No. El riesgo no se limita al primer trimestre.

B) No. La vía principal señalada no es la lactancia materna exclusiva.

C) No. La cesárea no es el factor determinante por sí sola.

D) Correcta. La viremia materna periparto explica la mayor probabilidad de transmisión al recién nacido.

22. Respuesta: C) Grupo sanguíneo del hospedador

La opción correcta es "Grupo sanguíneo del hospedador" porque el material relaciona la enfermedad con tropismo viral, dosis o concentración infectante y respuesta del hospedador; el grupo sanguíneo no aparece como factor principal.

Análisis de las alternativas:

A) No. El tropismo determina qué tejidos se afectan y qué síntomas predominan.

B) No. La respuesta inmune individual modifica gravedad y manifestaciones.

C) Correcta. El grupo sanguíneo no se presenta como determinante central de la enfermedad por arbovirus.

D) No. La concentración del virus inoculado influye en el desarrollo del cuadro.

23. Respuesta: C) Icosaédrica

La opción correcta es "Icosaédrica" porque alfavirus y flavivirus son virus envueltos de ARN positivo con cápside de simetría icosaédrica.

Análisis de las alternativas:

A) No. Pleomórfica describe variación de forma, no la simetría principal de la cápside.

B) No. La simetría helicoidal no corresponde al grupo.

C) Correcta. La cápside icosaédrica es la forma característica.

D) No. Biconvexa no es una clasificación habitual de cápsides virales en este contexto.

24. Respuesta: D) Persistente

La opción correcta es "Persistente" porque en el artrópodo vector, el virus suele mantenerse de forma persistente, permitiendo que el vector transmita durante un periodo prolongado.

Análisis de las alternativas:

A) No. No se describe como latencia neuronal del vector.

B) No. Una infección de pocas horas no permitiría sostener la transmisión vectorial.

C) No. Si fuera intensamente lítica, dañaría al vector y dificultaría la transmisión persistente.

D) Correcta. La persistencia en el mosquito permite que actúe como vector eficaz.

25. Respuesta: D) RT-PCR

La opción correcta es "RT-PCR" porque durante la viremia, la RT-PCR permite detectar ARN viral directamente, antes de depender de anticuerpos tardíos.

Análisis de las alternativas:



- A) No. La tuberculina se usa para respuesta celular frente a *Mycobacterium tuberculosis*.  
 B) No. La IgG puede aparecer más tarde y no detecta directamente el virus circulante.  
 C) No. Los virus no crecen en agar sangre como las bacterias.  
 D) Correcta. La RT-PCR detecta el genoma viral durante la fase febril.

26. Respuesta: C) Chikungunya

La opción correcta es "Chikungunya" porque chikungunya es un alfavirus reconocido por artralgias intensas y, en algunos pacientes, dolor articular persistente en fase subaguda o crónica.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Zika es un flavivirus y se recuerda más por complicaciones neurológicas o congénitas.  
 B) No. Fiebre del Nilo Occidental es un flavivirus asociado a fiebre y neuroinvasión.  
 C) Correcta. Chikungunya es el alfavirus clásico de artralgias persistentes.  
 D) No. Rubéola es *Togaviridae*, pero pertenece a Rubivirus y no causa el síndrome articular crónico típico de chikungunya.

27. Respuesta: D) Hígado, bazo y ganglios linfáticos

La opción correcta es "Hígado, bazo y ganglios linfáticos" porque tras la replicación inicial, muchos arbovirus se amplifican en órganos del sistema reticuloendotelial como hígado, bazo y ganglios, generando viremia secundaria.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Pulmones y tráquea no son el sitio general descrito para esta amplificación.  
 B) No. Intestino delgado y colon no representan el patrón común de viremia secundaria.  
 C) No. La médula ósea no se menciona como único órgano de amplificación.  
 D) Correcta. Hígado, bazo y ganglios linfáticos son órganos clave para la amplificación viral.

28. Respuesta: B) Eliminación de vectores y sus zonas de reproducción

La opción correcta es "Eliminación de vectores y sus zonas de reproducción" porque cuando no hay vacuna disponible, la prevención se centra en cortar la transmisión vectorial eliminando criaderos y evitando picaduras.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Hervir agua previene infecciones hídricas, no arbovirosis transmitidas por mosquitos.  
 B) Correcta. Eliminar criaderos y controlar vectores corta la cadena de transmisión.  
 C) No. El paracetamol trata síntomas, pero no previene transmisión.  
 D) No. Las mascarillas ayudan en vías respiratorias, no en transmisión por mosquito.

29. Respuesta: A) Exantema, uno de los cinco clásicos de la infancia

La opción correcta es "Exantema, uno de los cinco clásicos de la infancia" porque la rubéola se reconoce por un exantema maculopapular y forma parte de los exantemas clásicos de la infancia.

Análisis de las alternativas:

- A) Correcta. El exantema es una manifestación típica de rubéola.  
 B) No. Las escamas blanquecinas sugieren procesos dermatológicos no virales como dermatitis seborreica.  
 C) No. Las vesículas con costras orientan más a varicela-zóster.  
 D) No. Los nódulos subcutáneos dolorosos no son el dato clásico de rubéola.

30. Respuesta: D) Monos

La opción correcta es "Monos" porque en ciclos selváticos, los primates no humanos actúan como reservorios importantes para mantener virus como dengue o fiebre amarilla en la naturaleza.

Análisis de las alternativas:

- A) No. Los roedores no son el reservorio selvático típico señalado para estos virus.  
 B) No. Las aves son reservorios de algunos arbovirus, pero no el dato principal aquí.  
 C) No. Los cerdos son relevantes en otros ciclos, no como reservorio típico de dengue/fiebre amarilla selvática.  
 D) Correcta. Los monos mantienen ciclos selváticos importantes de estos virus.

## Retrovirus

1. Respuesta: A) Transcriptasa inversa.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Transcriptasa inversa." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Transcriptasa inversa." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
 b) No. El concepto de esta alternativa es "Neuraminidasa.": glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa."  
 c) No. Esta alternativa se refiere a "Hemaglutinina.": glucoproteína de influenza que media unión a la célula y es antígeno principal. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa."  
 d) No. Aquí se está describiendo "Cuerpo de Negri.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa."  
 e) No. Esa opción apunta a "Disco succionario.": un dato posible dentro de otra

unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa."

2. Respuesta: E) ARN monocatenario positivo con envoltura.

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ARN monocatenario positivo con envoltura." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "ADN bicatenario lineal sin envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."  
 b) No. Esta alternativa se refiere a "ARN negativo segmentado.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."  
 c) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario sin envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."  
 d) No. Esa opción apunta a "ARN bicatenario de cápside triple.": ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura."  
 e) Correcta. "ARN monocatenario positivo con envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
3. Respuesta: B) Incorporar el ADN proviral al genoma celular.
- La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Incorporar el ADN proviral al genoma celular." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.
- Análisis de las alternativas:
- a) No. Esta alternativa se refiere a "Unir virus a ácido siálico.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incorporar el ADN proviral al genoma celular."  
 b) Correcta. "Incorporar el ADN proviral al genoma celular." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.  
 c) No. Esa opción apunta a "Liberar viriones por neuraminidasa.": glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incorporar el ADN proviral al genoma celular."  
 d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Formar quistes resistentes.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incorporar el ADN proviral al genoma celular."  
 e) No. El concepto de esta alternativa es "Producir huevos embrionados.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incorporar el ADN proviral al genoma celular."
4. Respuesta: D) CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.
- La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: receptor de linfocitos T cooperadores y otras células diana del VIH. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.
- Análisis de las alternativas:
- a) No. Aquí se está describiendo "Antígeno P eritrocitario.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4."  
 b) No. Esa opción apunta a "Receptor de bilis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4."  
 c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Quitina externa.": un dato

posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4."

d) Correcta. "CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Botrios del escole."; una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4."

5. Respuesta: A) Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Anemia por consumo de B12."; un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Obstrucción intestinal por adultos."; un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas."
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Fiebre por esquistosomiasis eritrocitaria."; un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas."
- e) No. Aquí se está describiendo "Dermatitis por pediculosis."; un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inmunodeficiencia celular e infecciones oportunistas."

6. Respuesta: C) Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: retrovirus que infecta células CD4 y causa inmunodeficiencia progresiva. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Huevos en heces seriadas."; una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Trofozoitos móviles en fresco."; forma móvil y metabólicamente activa de protozoarios; se observa mejor en heces recientes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH."
- c) Correcta. "Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "Cercarias en agua."; una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH."
- e) No. Esta opción apunta a "Veneno en sangre."; un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH."

7. Respuesta: E) Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Monitorear replicación y respuesta al tratamiento." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Identificar huevos operculados."; huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Monitorear replicación y respuesta al tratamiento."
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Clasificar mordeduras ofídicas."; vía de

exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Monitorear replicación y respuesta al tratamiento."

- c) No. Aquí se está describiendo "Medir vitamina B12 por cestodos."; vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Monitorear replicación y respuesta al tratamiento."
- d) No. Esa opción apunta a "Detectar larvas en cinta adhesiva."; una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Monitorear replicación y respuesta al tratamiento."
- e) Correcta. "Monitorear replicación y respuesta al tratamiento." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

8. Respuesta: B) Bloquear distintas etapas de la replicación viral.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Bloquear distintas etapas de la replicación viral." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Eliminar solo bacterias anaerobias."; un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bloquear distintas etapas de la replicación viral."
- b) Correcta. "Bloquear distintas etapas de la replicación viral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a "Neutralizar venenos de serpientes."; un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bloquear distintas etapas de la replicación viral."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Paralizar nematodos intestinales únicamente."; una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bloquear distintas etapas de la replicación viral."
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Destruir oocistos ambientales."; formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/ esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bloquear distintas etapas de la replicación viral."

9. Respuesta: D) Leucemia/linfoma de células T del adulto.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Leucemia/linfoma de células T del adulto." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Condiloma acuminado."; verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leucemia/linfoma de células T del adulto."
- b) No. Esa opción apunta a "Rabia paralítica."; rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leucemia/linfoma de células T del adulto."
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Fasciolosis biliar."; un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leucemia/linfoma de células T del adulto."
- d) Correcta. "Leucemia/linfoma de células T del adulto." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Cisticercosis muscular."; larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leucemia/linfoma de células T del adulto."

10. Respuesta: C) Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: barrera preventiva frente a transmisión sexual de VIH y otros agentes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Evitar exclusivamente gatos."; hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de oocistos por heces. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige

reconocer "Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cocinar vegetales acuáticos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal."

c) Correcta. "Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Observar perros por 10 días.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal."

e) No. Aquí se está describiendo "No caminar descalzo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal."

11. Respuesta: A) Nucleocápside excéntrica dentro del virión maduro  
La opción correcta es "Nucleocápside excéntrica dentro del virión maduro" porque los retrovirus tipo B se distinguen por presentar una nucleocápside excéntrica o asimétrica dentro del virión maduro.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. La nucleocápside excéntrica es el rasgo morfológico del tipo B.  
B) No. La forma cilíndrica se asocia a otros retrovirus, como lentivirus.  
C) No. Los retrovirus son virus envueltos, por lo que no carecen de envoltura.  
D) No. La nucleocápside central y esférica corresponde al tipo C, no al tipo B.

12. Respuesta: A) Insertar el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora

La opción correcta es "Insertar el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora" porque la integrasa cataliza la inserción del ADN viral ya sintetizado dentro del ADN cromosómico de la célula infectada.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. La inserción del ADN proviral es la función propia de la integrasa.  
B) No. El corte de poliproteínas es función de la proteasa viral.  
C) No. La unión a CD4 depende de gp120 y correceptores, no de integrasa.  
D) No. La conversión de ARN a ADN es función de la retrotranscriptasa.

13. Respuesta: C) Ausencia de correceptores como CCR5 o CXCR4 en sus linfocitos

La opción correcta es "Ausencia de correceptores como CCR5 o CXCR4 en sus linfocitos" porque el VIH necesita CD4 y correceptores como CCR5 o CXCR4 para entrar; alteraciones o ausencia funcional de esos correceptores pueden dificultar la infección.

Análisis de las alternativas:

A) No. Los CD8 ayudan al control, pero no explican por sí solos resistencia de entrada.  
B) No. Los anticuerpos naturales no son el mecanismo señalado.  
C) Correcta. Sin correceptores funcionales, la entrada del VIH se dificulta significativamente.  
D) No. El material apunta a correceptores, no a ausencia total de CD4.

14. Respuesta: A) Se sintetiza ARN viral a partir del ADN mediante ARN polimerasa celular  
La opción correcta es "Se sintetiza ARN viral a partir del ADN mediante ARN polimerasa celular" porque después de la integración, el provirus funciona como molde para que la maquinaria celular transcriba ARN viral.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. La transcripción del provirus por ARN polimerasa celular sigue a la integración.  
B) No. La retrotranscripción ocurre antes de la integración.  
C) No. La proteasa actúa más tarde durante la maduración del virión.  
D) No. La gemación ocurre al final del ciclo, no inmediatamente después de integrar.

15. Respuesta: B) El recuento de linfocitos T CD4 y la presencia de infecciones oportunistas

La opción correcta es "El recuento de linfocitos T CD4 y la presencia de infecciones oportunistas" porque SIDA corresponde a una etapa avanzada definida por inmunodeficiencia marcada, CD4 bajos o enfermedades oportunistas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Una persona VIH positiva puede transmitir antes de tener SIDA.  
B) Correcta. CD4 bajos y enfermedades oportunistas definen la progresión a SIDA.  
C) No. Anticuerpos positivos indican infección por VIH, no necesariamente SIDA.  
D) No. El tratamiento puede indicarse en cualquier etapa de VIH, no solo en SIDA.

16. Respuesta: B) CD4 entre 200 y 499 y porcentaje entre 14% y 28%  
La opción correcta es "CD4 entre 200 y 499 y porcentaje entre 14% y 28%" porque la etapa 2 se ubica en un rango intermedio de inmunodepresión, con CD4 entre 200 y 499 o porcentaje de 14% a 28%.

Análisis de las alternativas:

A) No. CD4 mayor de 500 corresponde a etapa 1.  
B) Correcta. El rango 200-499 y 14%-28% define etapa 2.  
C) No. CD4 menor de 200 o enfermedad oportunista corresponde a etapa 3/SIDA.  
D) No. El síndrome retroviral agudo no define por sí solo la etapa 2.

17. Respuesta: B) Dentro de las primeras 2 horas del suceso  
La opción correcta es "Dentro de las primeras 2 horas del suceso" porque la profilaxis post-exposición debe iniciarse lo antes posible, idealmente dentro de las primeras dos horas.

Análisis de las alternativas:

A) No. Esperar confirmación puede retrasar una intervención preventiva crítica.  
B) Correcta. El inicio temprano mejora la probabilidad de prevenir infección.  
C) No. Siete días es demasiado tarde para el inicio ideal.  
D) No. Esperar síntomas anula el objetivo preventivo de la profilaxis.

18. Respuesta: D) Sarcoma de Kaposi

La opción correcta es "Sarcoma de Kaposi" porque el sarcoma de Kaposi se asocia a VHH-8 y aparece con mayor frecuencia en inmunodeprimidos, especialmente en SIDA.

Análisis de las alternativas:

A) No. El linfoma de Burkitt se asocia más a VEB.  
B) No. El linfoma de Hodgkin puede relacionarse con VEB en algunos casos, no es el tumor clásico por VHH-8.  
C) No. El carcinoma hepatocelular se relaciona más con hepatitis crónicas y cirrosis.  
D) Correcta. Sarcoma de Kaposi es el tumor típico asociado a VHH-8 en SIDA.

19. Respuesta: C) Porque posee alta sensibilidad pero especificidad limitada, pudiendo dar falsos positivos

La opción correcta es "Porque posee alta sensibilidad pero especificidad limitada, pudiendo dar falsos positivos" porque ELISA es muy sensible y útil para screening, pero los resultados reactivos deben confirmarse por pruebas más específicas.

Análisis de las alternativas:

A) No. ELISA puede ser positivo antes de SIDA.  
B) No. ELISA no es una prueba genómica de ADN viral.  
C) Correcta. La alta sensibilidad con posibilidad de falsos positivos justifica confirmación.  
D) No. La carga viral se mide por técnicas moleculares, no por ELISA convencional.

20. Respuesta: B) Disminuir el riesgo de resistencias y mutaciones virales  
La opción correcta es "Disminuir el riesgo de resistencias y mutaciones virales" porque la combinación de fármacos bloquea etapas diferentes y reduce la probabilidad de que el virus desarrolle resistencia.

Análisis de las alternativas:

A) No. La terapia no está diseñada para acortar el periodo ventana diagnóstico.  
B) Correcta. Usar varios fármacos disminuye escape viral y resistencia.  
C) No. La combinación no elimina todos los efectos adversos.  
D) No. La terapia controla la replicación, pero no elimina completamente reservorios.

21. Respuesta: B) Replicación viral persistente pero lenta, con descenso gradual de CD4

La opción correcta es "Replicación viral persistente pero lenta, con descenso gradual de CD4" porque en la fase crónica puede haber pocos síntomas, pero el virus sigue replicándose y los CD4 disminuyen progresivamente.

Análisis de las alternativas:

A) No. La viremia explosiva es más típica de la fase aguda.  
B) Correcta. La persistencia viral con descenso gradual de CD4 define la latencia clínica.  
C) No. Los CD4 no se recuperan espontáneamente por encima del basal sin control terapéutico.  
D) No. La replicación no se detiene por completo solo por anticuerpos.

22. Respuesta: B) Disminuye drásticamente hasta ser casi inexistente  
La opción correcta es "Disminuye drásticamente hasta ser casi inexistente" porque la carga viral indetectable reduce de forma marcada la transmisión, base del concepto indetectable igual a intransmisible en transmisión sexual.

Análisis de las alternativas:

A) No. La carga viral indetectable no aumenta el riesgo biológico.  
B) Correcta. Al controlar la replicación, el riesgo de transmisión cae de manera muy importante.  
C) No. El efecto no se limita solo a transmisión vertical.  
D) No. Aunque existan reservorios, el riesgo depende mucho de la carga viral circulante y genital.

23. Respuesta: A) Linfocitos T, macrófagos y células dendríticas  
La opción correcta es "Linfocitos T, macrófagos y células dendríticas" porque CD4 se expresa en linfocitos T colaboradores y también en macrófagos/células dendríticas, que son blancos importantes del VIH.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Estas células expresan CD4 y son dianas principales del VIH.  
B) No. Linfocitos B y NK no son el blanco principal por CD4.  
C) No. Las neuronas no son la diana directa principal por gp120-CD4.  
D) No. Eritrocitos y plaquetas no expresan CD4 funcional para entrada del VIH.

24. Respuesta: C) Permitir que el virión salga adquiriendo envoltura lipídica  
La opción correcta es "Permitir que el virión salga adquiriendo envoltura lipídica" porque en la gemación, el nuevo virión sale a través de la membrana celular y toma de ella su envoltura lipídica.

Análisis de las alternativas:

A) No. La gemación no equivale a lisis explosiva.  
B) No. La inyección de ARN no describe la salida viral.  
C) Correcta. La adquisición de envoltura durante la salida es la función de la gemación.  
D) No. La formación de sincitios es otro efecto de fusión celular, no la gemación.

25. Respuesta: C) Provoca pérdida o disminución severa de la respuesta  
La opción correcta es "Provoca pérdida o disminución severa de la respuesta" porque la hipersensibilidad retardada depende de inmunidad celular mediada por linfocitos T; al perder CD4, esa respuesta se deteriora.

Análisis de las alternativas:

A) No. No aumenta; disminuye la capacidad de respuesta celular.  
B) No. La respuesta retardada no depende exclusivamente de anticuerpos.  
C) Correcta. La pérdida de CD4 reduce o anula la respuesta DTH.  
D) No. No se reemplaza de forma equivalente por inflamación aguda inespecífica.

26. Respuesta: A) Digerir polipéptidos largos para formar proteínas y enzimas funcionales

La opción correcta es "Digerir polipéptidos largos para formar proteínas y enzimas funcionales"

enzimas funcionales" porque la proteasa corta poliproteínas virales como Gag y Gag-Pol, permitiendo maduración del virión.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. El corte de poliproteínas genera componentes maduros e infectantes.

B) No. La entrada ocurre por unión/fusión, no por acción de proteasa sobre membrana.

C) No. El VIH no necesita degradar el ADN celular para replicarse.

D) No. La síntesis de ADN desde ARN es función de la retrotranscriptasa.

27. Respuesta: B) Que la replicación masiva termina destruyendo la célula infectada

La opción correcta es "Que la replicación masiva termina destruyendo la célula infectada" porque una infección lítica implica daño y muerte de la célula infectada por la producción y salida de nuevas partículas virales.

Análisis de las alternativas:

A) No. La lisis no significa atenuación progresiva.

B) Correcta. La destrucción celular por replicación viral define infección lítica.

C) No. El estado dormido corresponde más a latencia.

D) No. La vía de transmisión no define el carácter lítico.

28. Respuesta: C) Diarrea asociada a Salmonella, Shigella y Campylobacter

La opción correcta es "Diarrea asociada a Salmonella, Shigella y Campylobacter" porque la inmunodeficiencia avanzada favorece infecciones gastrointestinales oportunistas o graves, con diarrea por bacterias como Salmonella, Shigella y Campylobacter.

Análisis de las alternativas:

A) No. La litiasis biliar no es la complicación gastrointestinal infecciosa típica del SIDA.

B) No. Las úlceras por estrés no resumen la complicación infecciosa destacada.

C) Correcta. La diarrea por patógenos entéricos es una complicación común en inmunodeprimidos.

D) No. La hiperactividad simpática no explica el patrón infeccioso descrito.

29. Respuesta: B) Controlan la progresión, pero requieren activación por CD4

La opción correcta es "Controlan la progresión, pero requieren activación por CD4" porque los CD8 citotóxicos ayudan a controlar células infectadas, pero su activación eficaz depende de la cooperación de CD4.

Análisis de las alternativas:

A) No. Las principales células diana son CD4, macrófagos y dendríticas.

B) Correcta. Los CD8 son importantes para el control antiviral, pero dependen de ayuda inmunológica.

C) No. Los anticuerpos son producidos por linfocitos B/plasmocitos, no CD8.

D) No. La integración viral depende de integrasa y ocurre en células infectadas, no por acción de CD8.

30. Respuesta: A) Persona que vive con VIH

La opción correcta es "Persona que vive con VIH" porque PVV es una forma actual y respetuosa de referirse a una persona que vive con VIH, sin definir necesariamente etapa clínica.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. Persona que vive con VIH es la expansión correcta.

B) No. No existe una vacuna efectiva de uso general contra VIH que justifique este significado.

C) No. Aunque hay poblaciones vulnerables, PVV se refiere a quienes viven con la infección.

D) No. No significa portador de variantes virulentas.

31. Respuesta: A) Infección de microglía y neuronas por VIH o infecciones oportunistas

La opción correcta es "Infección de microglía y neuronas por VIH o infecciones oportunistas" porque el compromiso neurológico en SIDA se relaciona con infección de células del sistema nervioso como microglía y con infecciones oportunistas que afectan el cerebro.

Análisis de las alternativas:

A) Correcta. El compromiso de microglía y las infecciones oportunistas explican la demencia asociada al SIDA.

B) No. Los antirretrovirales pueden tener efectos adversos, pero no son la causa principal descrita.

C) No. La desnutrición puede agravar el estado general, pero no explica directamente la demencia del SIDA.

D) No. El sarcoma de Kaposi no causa típicamente demencia por ruptura capilar cerebral masiva.

## Generalidades, huéspedes y prevención

1. Respuesta: E) Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Permanece siempre como quiste ambiental.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Solo se transporta mecánicamente sin cambiar.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Muere antes de completar el ciclo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta."

d) No. Aquí se está describiendo "No produce ningún dano.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta."

e) Correcta. "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

2. Respuesta: B) Desarrollo larvario o reproducción asexual.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Desarrollo larvario o reproducción asexual." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Únicamente diagnóstico serológico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual."

b) Correcta. "Desarrollo larvario o reproducción asexual." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "La eliminación obligatoria de anticuerpos.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual."

d) No. Esa opción apunta a "El tratamiento farmacológico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "La vacunación del humano.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual."

3. Respuesta: D) Mantiene el parásito disponible para transmisión.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Mantiene el parásito disponible para transmisión." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Siempre elimina el parásito por tos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mantiene el parásito disponible para transmisión."

b) No. Aquí se está describiendo "Impide toda zoonosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mantiene el parásito disponible para transmisión."

c) No. Esa opción apunta a "Es sinónimo de vector mecánico.": transporte pasivo del agente, sin multiplicación ni desarrollo dentro del vector. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mantiene el parásito disponible para transmisión."

d) Correcta. "Mantiene el parásito disponible para transmisión." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Solo existe en virus envueltos.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mantiene el parásito disponible para transmisión."

4. Respuesta: A) En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "En el

biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "El biológico nunca transmite enfermedad.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "El mecánico siempre inocula saliva infectante.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.".

d) No. El concepto de esta alternativa es "Ambos requieren reproducción sexual del parásito.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.".

e) No. Esta alternativa se refiere a "Solo el mecánico tiene importancia médica.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.".

5. Respuesta: C) Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: medida básica contra transmisión fecal-oral: hervido, filtrado o potabilización para evitar formas infectantes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Aislamiento respiratorio estricto permanente.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Antivirales de amplio espectro.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.".

c) Correcta. "Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Vacuna antitetánica como única medida.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.".

e) No. Aquí se está describiendo "Cierre de escuelas sin educación sanitaria.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.".

6. Respuesta: E) Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Solo existe en cultivos celulares.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.".

b) No. El concepto de esta alternativa es "No requiere ningún huésped.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.".

c) No. Esta alternativa se refiere a "Siempre se transmite por transfusión.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.".

d) No. Aquí se está describiendo "Nunca involucra reservorios.": fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.".

e) Correcta. "Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

7. Respuesta: B) Examen coproparasitológico seriado.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Examen coproparasitológico seriado." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Radiografía simple única.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparasitológico seriado.".

b) Correcta. "Examen coproparasitológico seriado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "Hemocultivo para anaerobios.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparasitológico seriado.".

d) No. Esa opción apunta a "Prueba de catalasa.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparasitológico seriado.".

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Tinción de Gram de piel.": una coloración para bacterias que diferencia Gram positivas y Gram negativas; no detecta directamente genomas virales. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparasitológico seriado.".

8. Respuesta: D) Unicelulares.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Unicelulares." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: rasgo general de protozoarios, a diferencia de helmintos que son metazoarios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Pluricelulares segmentados.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".

b) No. Aquí se está describiendo "Artrópodos con exoesqueleto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".

c) No. Esa opción apunta a "Serpientes venenosas.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".

d) Correcta. "Unicelulares." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Hongos filamentosos.": un concepto de micología. Sirve para hongos, pero no explica el agente o mecanismo evaluado en esta pregunta. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".

9. Respuesta: C) Letrinas, calzado y lavado de manos.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Letrinas, calzado y lavado de manos." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Solo antitermicos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe



marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos."

b) No. Esa opción apunta a "Vacuna SRP.": vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos."

c) Correcta. "Letrinas, calzado y lavado de manos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. El concepto de esta alternativa es "Antiveneno preventivo.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Uso de lentes de sol.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos."

10. Respuesta: A) Indirecto o heteroxeno.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Indirecto o heteroxeno." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Indirecto o heteroxeno." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Directo o monoxeno.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Aviral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Saprofito estricto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno."

e) No. Aquí se está describiendo "Exclusivamente mecánico.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno."

## Paludismo

1. Respuesta: B) Hembras de Anopheles.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Hembras de Anopheles." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: mosquito hembra transmisor habitual de malaria. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Triatominos hematofagos.": insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles."

b) Correcta. "Hembras de Anopheles." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esta alternativa se refiere a "Flebotomos.": insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles."

d) No. Aquí se está describiendo "Caracoles Lymnaea.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles."

e) No. Esa opción apunta a "Pulgas de perro.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles."

2. Respuesta: D) Hgado.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Hgado." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto

solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Vejiga.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hgado."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Ganglio sensorial.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hgado."

c) No. Aquí se está describiendo "Intestino grueso.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hgado."

d) Correcta. "Hgado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vía biliar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hgado."

3. Respuesta: A) Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Aquí se está describiendo "Migración de larvas por pulmón.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados."

c) No. Esa opción apunta a "Liberación de huevos por proglotides.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Invasión de queratinocitos.": célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Mordedura local de serpiente.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados."

4. Respuesta: C) Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: malaria: infección por Plasmodium con fase hepática inicial y fase eritrocitaria clínica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Solo infección leve sin complicaciones.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento."

b) No. Esa opción apunta a "Quistes hepáticos calcificados.": forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento."

c) Correcta. "Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. El concepto de esta alternativa es "Verrugas genitales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Parotiditis viral.": infección por virus de paperas, con inflamación parotídea y posibles complicaciones como orquitis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento."

5. Respuesta: E) Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de



otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Medir anticuerpos y vacunar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Buscar huevos y larvas.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.".
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Identificar veneno y necrosis.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Detectar quistes y ooquistes felinos.": formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/ esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.".
- e) Correcta. "Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

6. Respuesta: B) Antígenos parasitarios.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Antígenos parasitarios." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Anticuerpos antirrábicos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígenos parasitarios.".
- b) Correcta. "Antígenos parasitarios." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Huevos operculados.": huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígenos parasitarios.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Cuerpos de inclusión nuclear.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígenos parasitarios.".
- e) No. Esa opción apunta a "Toxinas de serpiente.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Antígenos parasitarios.".

7. Respuesta: D) P. vivax y P. ovale.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "P. vivax y P. ovale." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "P. falciparum y P. malariae.": especie más relacionada con malaria grave y cerebral si no se trata. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "P. vivax y P. ovale.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "T. cruzi y T. rangeli.": tripanosoma no patógeno o de baja relevancia clínica que puede confundirse en diagnóstico con T. cruzi. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "P. vivax y P. ovale.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Leishmania donovani y infantum.": protozoo transmitido por flebotomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "P. vivax y P. ovale.".
- d) Correcta. "P. vivax y P. ovale." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Giardia y Trichomonas.": flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/eyeyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta

correcta exige reconocer "P. vivax y P. ovale.".

8. Respuesta: C) Transplacentaria o transfusional.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Transplacentaria o transfusional." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: transmisión no vectorial posible de malaria o Chagas por sangre contaminada. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Inhalación de polvo con huevos.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transplacentaria o transfusional.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Contacto con verrugas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transplacentaria o transfusional.".
- c) Correcta. "Transplacentaria o transfusional." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Mordedura de gato.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transplacentaria o transfusional.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Carne de pescado cruda.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transplacentaria o transfusional.".

9. Respuesta: A) Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a "Ausencia mundial de malaria.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eliminación de mosquitos de todo el país.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.".
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Inutilidad de todo diagnóstico en viajeros.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.".
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Erradicación de Plasmodium en Brasil.": protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito Anopheles hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.".

10. Respuesta: E) Control vectorial y protección contra picaduras.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Control vectorial y protección contra picaduras." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Evitar gatos durante embarazo.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control vectorial y protección contra picaduras.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cocinar carne de cerdo.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control vectorial y protección contra picaduras.".

- c) No. El concepto de esta alternativa es "Lavar heridas por mordedura.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control vectorial y protección contra picaduras.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Observar perros por 10 días.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control vectorial y protección contra picaduras.".
- e) Correcta. "Control vectorial y protección contra picaduras." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

## Trypanosoma

1. Respuesta: D) Trypanosoma cruzi.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Trypanosoma cruzi." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: protozoo causante de Chagas americano, transmitido principalmente por triatominos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Trypanosoma brucei gambiense.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Trypanosoma rangeli exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Leishmania infantum.": protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi.".
- d) Correcta. "Trypanosoma cruzi." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a "Plasmodium falciparum.": protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito *Anopheles* hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi.".

2. Respuesta: A) Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas. La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "La vinchuca inocula larvas por saliva siempre.": nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas.".
- c) No. Aquí se está describiendo "El mosquito *Anopheles* deposita ooquistes.": artrópodo vector; puede transmitir *arbovirus* o *Plasmodium* según el género y contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas.".
- d) No. Esa opción apunta a "El caracol libera cercarias al agua.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "La pulga transmite proglotides.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces de triatomo contaminan piel lesionada o mucosas.".

3. Respuesta: C) Amastigote.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Amastigote." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Ooquiste.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto

- de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Metacercaria.": forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".
- c) Correcta. "Amastigote." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Pleroceroide.": larva infectante de *Diphyllobothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Hipozoito.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".

4. Respuesta: E) Tripomastigotes.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Tripomastigotes." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma de Trypanosoma observable en sangre, especialmente en fase aguda. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Huevos mameonados.": huevos típicos de *Ascaris*; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- b) No. Esa opción apunta a "Quistes hidatídicos.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Pentonas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- e) Correcta. "Tripomastigotes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

5. Respuesta: B) Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Ulceración nasal mucocutánea.": forma de leishmaniasis que puede destruir mucosas y causar desfiguración. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".
- b) Correcta. "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Vesículas en dermatoma.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Mordedura de serpiente coral.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".
- e) No. Aquí se está describiendo "Diarrea por *Giardia*.": flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/eyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".

6. Respuesta: D) Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Bronquiolitis por sincitis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta

exige reconocer "Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción".

b) No. El concepto de esta alternativa es "Condiloma acuminado.": verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción".

c) No. Esta alternativa se refiere a "Anemia megaloblástica por pescado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción".

d) Correcta. "Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esa opción apunta a "Hidrofobia.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción".

7. Respuesta: C) Megaesofago o megacolon.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Megaesofago o megacolon." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: manifestación digestiva crónica de Chagas por daño del plexo entérico. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Colitis por huevos de Schistosoma.": trematodo sanguíneo cuyas cercarias penetran activamente la piel y cuyos huevos causan inflamación. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Megaesofago o megacolon".

b) No. Esta alternativa se refiere a "Ictericia por Fasciola.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Megaesofago o megacolon".

c) Correcta. "Megaesofago o megacolon." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esa opción apunta a "Enteritis por rotavirus.": virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Megaesofago o megacolon".

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Apendicitis por Ascaris.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Megaesofago o megacolon".

8. Respuesta: A) Serología con pruebas diferentes.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Serología con pruebas diferentes." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Serología con pruebas diferentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Aquí se está describiendo "Gota gruesa única.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Serología con pruebas diferentes".

c) No. Esa opción apunta a "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Serología con pruebas diferentes".

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cultivo de garganta.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Serología con pruebas diferentes".

e) No. El concepto de esta alternativa es "Papanicolaou.": una prueba citológica cervical útil para detectar alteraciones por HPV, como coilocitosis o lesiones intraepiteliales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Serología con pruebas diferentes".

9. Respuesta: E) Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Produce siempre cardiopatía mortal.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno".

b) No. Esa opción apunta a "Es transmitido por Anopheles.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Genera quistes musculares.": forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno".

d) No. El concepto de esta alternativa es "Causa sarcoma de Kaposi.": neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno".

e) Correcta. "Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

10. Respuesta: B) T. brucei y mosca tsetse.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "T. brucei y mosca tsetse." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "T. cruzi y vinchuca.": nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "T. brucei y mosca tsetse".

b) Correcta. "T. brucei y mosca tsetse." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. El concepto de esta alternativa es "Leishmania y flebotomo.": protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "T. brucei y mosca tsetse".

d) No. Esta alternativa se refiere a "Plasmodium y Anopheles.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "T. brucei y mosca tsetse".

e) No. Aquí se está describiendo "Toxoplasma y gato.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "T. brucei y mosca tsetse".

## Toxoplasma gondii

1. Respuesta: A) Felino.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Felino." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Felino." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. El concepto de esta alternativa es "Humano.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino".

c) No. Esta alternativa se refiere a "Mosquito.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino".

d) No. Aquí se está describiendo "Caracol.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino".

e) No. Esa opción apunta a "Pez.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino".

2. Respuesta: C) Taquizoito.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Taquizoito." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de

protozoología/parasitología: forma proliferativa e invasiva de *Toxoplasma*, predominante en fase aguda. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Ooquiste esporulado.": forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.":
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Bradyzoito tisular.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.":
- c) Correcta. "Taquizoito." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a "Metacercaria.": forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.":
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Proglótide.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.":

3. Respuesta: E) Fase crónica y transmisión por carne.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Fase crónica y transmisión por carne." porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Fase sexual en gato únicamente.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fase crónica y transmisión por carne.":
- b) No. Aquí se está describiendo "Eliminación por orina humana.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fase crónica y transmisión por carne.":
- c) No. Esa opción apunta a "Picadura de flebotomo.": insecto vector de *Leishmania*. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fase crónica y transmisión por carne.":
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Huevos en vías biliares.": localización de adultos de *Fasciola*, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fase crónica y transmisión por carne.":
- e) Correcta. "Fase crónica y transmisión por carne." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

4. Respuesta: B) Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares." porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminada en heces formadas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Mordedura de perro rabioso.": vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.":
- b) Correcta. "Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Picadura de vinchuca.": nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.":
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Cercarias en agua dulce.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.":
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Pescado con plerocercioide.": larva infectante de *Diphyllibothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.":

5. Respuesta: D) La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante." porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al

mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "El padre tiene verrugas cutáneas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.":
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "El recién nacido ingiere pescado crudo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.":
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Hay mordedura de serpiente en parto.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.":
- d) Correcta. "La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo "Existe contacto con piojos.": insectos ectoparásitos causantes de pediculosis. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.":

6. Respuesta: C) Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis." porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: parte de la triada clásica de toxoplasmosis congénita junto con calcificaciones intracraneales y coriorretinitis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Parotiditis, orquitis y meningitis.": complicación clásica de parotiditis en varones pospuberales. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.":
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Tos, fiebre y bronquiolitis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.":
- c) Correcta. "Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "Diarrea, meteorismo y esteatorrea.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.":
- e) No. Esa opción apunta a "Hematuria, fibrosis vesical y cáncer.": manifestación típica de *Schistosoma haematobium*, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.":

7. Respuesta: A) Encefalitis con lesiones cerebrales.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Encefalitis con lesiones cerebrales." porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: cuadro de reactivación de *Toxoplasma* en inmunodeprimidos, especialmente VIH avanzado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Encefalitis con lesiones cerebrales." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Condilomas anogenitales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Encefalitis con lesiones cerebrales.":
- c) No. Aquí se está describiendo "Colitis por huevos.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Encefalitis con lesiones cerebrales.":
- d) No. Esa opción apunta a "Crisis aplásica pura.": interrupción brusca de producción eritroide, especialmente grave si el paciente ya tiene anemia hemolítica crónica. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Encefalitis con lesiones cerebrales.":
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Parálisis diafragmática por veneno.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige



reconocer "Encefalitis con lesiones cerebrales."

8. Respuesta: E) IgM, IgG y avididad de IgG.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "IgM, IgG y avididad de IgG." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "IgM, IgG y avididad de IgG.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Gota gruesa y gota fina.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "IgM, IgG y avididad de IgG.".
- c) No. Esa opción apunta a "Cultivo de caracol.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "IgM, IgG y avididad de IgG.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Prueba de coagulasa.": una prueba enzimática usada sobre todo para identificar Staphylococcus aureus; pertenece a bacteriología, no al diagnóstico viral directo. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "IgM, IgG y avididad de IgG.".
- e) Correcta. "IgM, IgG y avididad de IgG." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

9. Respuesta: B) Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Suspender toda vacunación SRP ya recibida.": vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.".
- b) Correcta. "Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Tomar antiveneno mensual.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.".
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Consumir pescado crudo congelado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.".
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Caminar descalza para inmunizarse.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.".

10. Respuesta: D) Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Se transforma en adulto en vía biliar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Penetra piel como larva filariforme.": larva infectante de Strongyloides o uncinarias, capaz de penetrar piel en varios ciclos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.".
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Forma cápside viral icosaédrica.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia

el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.".

d) Correcta. "Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo "Produce vitamina B12.": vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.".

## Leishmania

1. Respuesta: C) Promastigote metacíclico.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Promastigote metacíclico." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma flagelada infectante de Leishmania inoculada por flebótomo. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Amastigote intracelular.": forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Ooquiste esporulado.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico.".
- c) Correcta. "Promastigote metacíclico." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "Cercaria acuática.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico.".
- e) No. Esa opción apunta a "Huevo embrionado.": forma infectante de algunos nematodos como Ascaris cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico.".

2. Respuesta: E) Amastigote en macrófagos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Amastigote en macrófagos." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Tripomastigote en eritrocitos.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Merozoito en hepatocitos.": célula hepática donde Plasmodium se multiplica primero tras inoculación por mosquito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Larva filariforme en piel.": larva infectante de Strongyloides o uncinarias, capaz de penetrar piel en varios ciclos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos.".
- d) No. Esa opción apunta a "Procercoide en crustáceos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos.".
- e) Correcta. "Amastigote en macrófagos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

3. Respuesta: B) Flebótomo.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Flebótomo." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: insecto vector de Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Anopheles.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebótomo.".
- b) Correcta. "Flebótomo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a "Triatmino.": insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebótomo.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Caracol Lymnaea.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de

entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebotomo."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Pulga.": un vector o artrópodo. Es clave en transmisión vectorial, pero no siempre participa en el agente del enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebotomo."

4. Respuesta: D) Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: disminución de varias líneas celulares sanguíneas, compatible con leishmaniasis visceral por afectación sistémica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Verrugas genitales y colicocitos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia."

b) No. Esa opción apunta a "Diarrea grasa sin invasión.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Hidrofobia y encefalitis.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia."

d) Correcta. "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Prurito anal nocturno.": dato de Enterobius vermicularis, no de CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia."

5. Respuesta: C) Perro.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Perro." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Gato como definitivo.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Pez de agua dulce.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro."

c) Correcta. "Perro." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Cerdo exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro."

e) No. Aquí se está describiendo "Caracol.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro."

6. Respuesta: A) Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. El concepto de esta alternativa es "Aplasia eritroide pura.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Parálisis flácida poliomiélica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas."

d) No. Aquí se está describiendo "Quistes en cerebro por huevos.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas."

e) No. Esa opción apunta a "Bronquiolitis infantil.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas."

7. Respuesta: E) Amastigotes en material de lesión o médula.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Amastigotes en material de lesión o médula." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Huevos mameonados en heces.": huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigotes en material de lesión o médula."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Cercarias en piel.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigotes en material de lesión o médula."

c) No. Aquí se está describiendo "Ooquistes ácido-alcohol resistentes.": formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigotes en material de lesión o médula."

d) No. Esa opción apunta a "Antígenos de influenza.": componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigotes en material de lesión o médula."

e) Correcta. "Amastigotes en material de lesión o médula." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

8. Respuesta: B) Aumenta mortalidad y dificulta manejo.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Aumenta mortalidad y dificulta manejo." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Impide toda transmisión vectorial.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumenta mortalidad y dificulta manejo."

b) Correcta. "Aumenta mortalidad y dificulta manejo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esa opción apunta a "Convierte al parásito en virus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumenta mortalidad y dificulta manejo."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Elimina necesidad de tratamiento.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Aumenta mortalidad y dificulta manejo."

9. Respuesta: D) Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Control del vector, reservorios y protección contra picaduras." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Solo clorar agua sin otras medidas.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta



correcta exige reconocer "Control del vector, reservorios y proteccion contra picaduras.".

b) No. Esa opción apunta a "Vacunar contra HPV.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control del vector, reservorios y proteccion contra picaduras.".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Observar perros mordedores 10 días.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control del vector, reservorios y proteccion contra picaduras.".

d) Correcta. "Control del vector, reservorios y proteccion contra picaduras." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Cocinar pescado de río.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Control del vector, reservorios y proteccion contra picaduras.".

10. Respuesta: A) Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Solo ocurre en países ricos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.".
- c) No. El concepto de esta alternativa es "No requiere vector ni reservorio.": fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Nunca causa dano clinico.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.".
- e) No. Aquí se está describiendo "Se erradica mundialmente.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.".

## Protozoarios intestinales y urogenitales

1. Respuesta: E) Resistente e infecciosa.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Resistente e infecciosa." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Siempre movil e invasiva.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Exclusiva de sangre.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Transmitida por flebotomo.": insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Un estadio de helminto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este

enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa.".

e) Correcta. "Resistente e infecciosa." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

2. Respuesta: B) Heces recientes.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Heces recientes." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Heces formadas antiguas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes.".
- b) Correcta. "Heces recientes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Sangre seca.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes.".
- d) No. Esa opción apunta a "Espunto esteril.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Orina matinal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes.".

3. Respuesta: D) Entamoeba histolytica invasiva.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Entamoeba histolytica invasiva." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: ameba patógena capaz de invadir colon y producir disentería o absceso hepático. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Entamoeba coli comensal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Entamoeba histolytica invasiva.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Giardia no invasiva.": flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/eyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Entamoeba histolytica invasiva.".
- c) No. Esa opción apunta a "Trichomonas vaginalis.": protozoo urogenital de transmisión sexual que no presenta forma quística. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Entamoeba histolytica invasiva.".
- d) Correcta. "Entamoeba histolytica invasiva." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Cryptosporidium.": coccidio que causa diarrea acuosa, grave o prolongada en inmunodeprimidos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Entamoeba histolytica invasiva.".

4. Respuesta: C) Duodeno y yeyuno proximal.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Duodeno y yeyuno proximal." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: sitio típico de Giardia, donde altera absorción sin invadir profundamente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Colon sigmoide exclusivo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Duodeno y yeyuno proximal.".
- b) No. Esa opción apunta a "Vías biliares adultas.": localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Duodeno y yeyuno proximal.".
- c) Correcta. "Duodeno y yeyuno proximal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Ganglios sensitivos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el

enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Duodeno y yeyuno proximal."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Medula osea.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Duodeno y yeyuno proximal."

5. Respuesta: A) Giardiasis.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Giardiasis." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/yeyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Giardiasis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Rabia.": rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Giardiasis."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Sarcoma de Kaposi.": neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Giardiasis."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Parotiditis.": infección por virus de paperas, con inflamación parotídea y posibles complicaciones como orquitis. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Giardiasis."

e) No. Aquí se está describiendo "Crotalismo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Giardiasis."

6. Respuesta: E) No tiene fase quística y se transmite sexualmente.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "No tiene fase quística y se transmite sexualmente." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Forma huevos embrionados en suelo.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No tiene fase quística y se transmite sexualmente."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Tiene reservorio felino definitivo.": fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No tiene fase quística y se transmite sexualmente."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Necesita caracol intermediario.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No tiene fase quística y se transmite sexualmente."

d) No. Aquí se está describiendo "Es un virus de ARN.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "No tiene fase quística y se transmite sexualmente."

e) Correcta. "No tiene fase quística y se transmite sexualmente." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

7. Respuesta: B) Cerdos y cuadros disintéricos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Cerdos y cuadros disintéricos." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Gatos y toxoplasmosis.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de oocistos por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cerdos y cuadros disintéricos."

b) Correcta. "Cerdos y cuadros disintéricos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "Perros y hidatidosis.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cerdos y cuadros disintéricos."

d) No. Esa opción apunta a "Mosquitos y dengue.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o *Plasmodium* según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cerdos y cuadros disintéricos."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Peces y B12 baja.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cerdos y cuadros disintéricos."

8. Respuesta: D) Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada. La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Adultos sanos con verrugas comunes.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada."

b) No. Aquí se está describiendo "Pacientes con mordedura ofídica.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada."

c) No. Esa opción apunta a "Pescadores con anemia megaloblástica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada."

d) Correcta. "Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Gestantes vacunadas contra rubéola.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada."

9. Respuesta: A) Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "Cuerpos de Negri en cerebro.": inclusiones citoplasmáticas neuronales clásicas de rabia, observadas sobre todo en diagnóstico postmortem. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Huevos en vía biliar.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Serología de Chagas crónico.": la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Prueba de neutralización de veneno.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces."

10. Respuesta: C) Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: medida básica contra transmisión fecal-oral: hervido, filtrado o potabilización para evitar formas infectantes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Solo repelente contra flebotomos.": insecto vector

de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vacuna SRP en adultos.": vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.".

c) Correcta. "Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Cocinar carne de res.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.".

e) No. Aquí se está describiendo "Antiveneno en puestos de salud.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.".

## Nematodos intestinales

1. Respuesta: B) Huevo embrionado ingerido.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Huevo embrionado ingerido." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: forma infectante de algunos nematodos como Ascaris cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Larva filariforme penetrante.": larva infectante de Strongyloides o uncinarias, capaz de penetrar piel en varios ciclos. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevo embrionado ingerido.".

b) Correcta. "Huevo embrionado ingerido." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esta alternativa se refiere a "Cisticerco en carne.": larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevo embrionado ingerido.".

d) No. Aquí se está describiendo "Metacercaria en vegetal acuático.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevo embrionado ingerido.".

e) No. Esa opción apunta a "Plerocercoides en pescado.": larva infectante de Diphyllibothrium latum en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevo embrionado ingerido.".

2. Respuesta: D) Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Migración larvaria pulmonar con eosinofilia." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Adultos en vías biliares siempre.": localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.".

b) No. Esta alternativa se refiere a "Huevos en vejiga.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.".

c) No. Aquí se está describiendo "Cisticercos cerebrales.": larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.".

d) Correcta. "Migración larvaria pulmonar con eosinofilia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Toxina neurotrópica salival.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.".

3. Respuesta: C) Existe alta carga de vermes adultos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Existe alta carga de vermes adultos."

porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: gran número de gusanos adultos; aumenta riesgo de obstrucción intestinal o migración ectópica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Solo hay un huevo no fecundado.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Existe alta carga de vermes adultos.".

b) No. Aquí se está describiendo "El parásito está en mosquito.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Existe alta carga de vermes adultos.".

c) Correcta. "Existe alta carga de vermes adultos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "El paciente fue vacunado contra polio.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Existe alta carga de vermes adultos.".

e) No. El concepto de esta alternativa es "La infección es por Trichomonas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Existe alta carga de vermes adultos.".

4. Respuesta: A) Prolapso rectal y anemia.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Prolapso rectal y anemia." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Prolapso rectal y anemia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esa opción apunta a "Hidrofobia.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Prolapso rectal y anemia.".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Condiloma acuminado.": verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Prolapso rectal y anemia.".

d) No. El concepto de esta alternativa es "Fiebre amarilla.": flavivirus prevenible con vacuna específica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Prolapso rectal y anemia.".

e) No. Esta alternativa se refiere a "Quiste hidatídico.": lesión por Echinococcus granulosus; no es manifestación de VIH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Prolapso rectal y anemia.".

5. Respuesta: E) Cinta adhesiva perianal matinal.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Cinta adhesiva perianal matinal." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Gota gruesa.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cinta adhesiva perianal matinal.".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Biopsia hepática.": una muestra de hígado; puede revelar algunos parásitos tisulares, pero no es el método típico para oxiuriasis ni para virus respiratorios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cinta adhesiva perianal matinal.".

c) No. El concepto de esta alternativa es "Aspirado de médula ósea.": una muestra útil para buscar amastigotes en leishmaniasis visceral; no corresponde a parásitos intestinales comunes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cinta adhesiva perianal matinal.".

d) No. Esta alternativa se refiere a "PCR respiratoria.": una prueba molecular aplicada a secreciones respiratorias; sirve para virus respiratorios, pero no para huevos o parásitos intestinales. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cinta adhesiva perianal matinal.".

e) Correcta. "Cinta adhesiva perianal matinal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

6. Respuesta: B) Oxiuriasis.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Oxiuriasis." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Fasciolosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Oxiuriasis.":
- b) Correcta. "Oxiuriasis." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Dengue.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Oxiuriasis.":
- d) No. Aquí se está describiendo "Rabia.": rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Oxiuriasis.":
- e) No. Esa opción apunta a "Leishmaniasis visceral.": protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Oxiuriasis.":

7. Respuesta: D) Autoinfección e hiperinfección.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Autoinfección e hiperinfección." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influenza. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Cancer cervical.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Autoinfección e hiperinfección.":
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Aplasia eritroide por B19.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Autoinfección e hiperinfección.":
- c) No. Aquí se está describiendo "Mononucleosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Autoinfección e hiperinfección.":
- d) Correcta. "Autoinfección e hiperinfección." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Zoster localizado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Autoinfección e hiperinfección.":

8. Respuesta: A) Penetración cutánea de larvas filariformes.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Penetración cutánea de larvas filariformes." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: larvas infectantes de Strongyloides/uncinarias; no son efecto citopático viral. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Penetración cutánea de larvas filariformes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo "Ingestión de carne bovina cruda.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.":
- c) No. Esa opción apunta a "Picadura de triatomo.": insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.":
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Oocistos de gato.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de oquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.":
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Mordedura de serpiente.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.":

9. Respuesta: C) Pérdida crónica de sangre intestinal.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Pérdida crónica de sangre intestinal." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con

el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Deficit de B12 por pescado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.":
- b) No. Esa opción apunta a "Hemólisis por malaria grave.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.":
- c) Correcta. "Pérdida crónica de sangre intestinal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Aplasia por parvovirus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.":
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Destrucción medular por VIH.": retrovirus que infecta células CD4 y causa inmunodeficiencia progresiva. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.":

10. Respuesta: E) Larva migrans visceral u ocular.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Larva migrans visceral u ocular." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Teniasis intestinal adulta.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Larva migrans visceral u ocular.":
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Diarrea acuosa por coccidios.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Larva migrans visceral u ocular.":
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Verrugas por HPV.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Larva migrans visceral u ocular.":
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Parotiditis.": infección por virus de paperas, con inflamación parotídea y posibles complicaciones como orquitis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Larva migrans visceral u ocular.":
- e) Correcta. "Larva migrans visceral u ocular." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

## Cestodos

1. Respuesta: D) Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: larva infectante de Diphylobothrium latum en pescado crudo o mal cocido. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Carne de cerdo con bradizoitos.": forma lenta dentro de quistes tisulares de Toxoplasma, relacionada con infección crónica. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.":
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Berro con metacercarias.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.":
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Agua con cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.":
- d) Correcta. "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a "Huevos en polvo domiciliario.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico



del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides".

2. Respuesta: C) Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblastica y síntomas neurológicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Hidrofobia y encefalitis.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica".

b) No. Esta alternativa se refiere a "Conditomas genitales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica".

c) Correcta. "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esa opción apunta a "Insuficiencia respiratoria por RSV.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica".

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Crisis aplásica por B19.": interrupción brusca de producción eritroide, especialmente grave si el paciente ya tiene anemia hemolítica crónica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica".

3. Respuesta: A) Carne bovina con cisticercos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Carne bovina con cisticercos." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Carne bovina con cisticercos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Aquí se está describiendo "Carne porcina con huevos embrionados.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos".

c) No. Esa opción apunta a "Pescado con plerocercoides.": larva infectante de Diphyllibothrium latum en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos".

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Perro con quiste hidatídico adulto.": lesión por Echinococcus granulosus; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos".

e) No. El concepto de esta alternativa es "Caracol con cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos".

4. Respuesta: E) Huevos de Taenia solium.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Huevos de Taenia solium." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: cestodo porcino; sus huevos causan cisticercosis y sus cisticercos en carne causan teniasis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Cisticercos de Taenia saginata.": cestodo de carne bovina; no produce mononucleosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de Taenia solium".

b) No. Esa opción apunta a "Plerocercoides de pescado.": larva infectante de Diphyllibothrium latum en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de Taenia solium".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Metacercarias de Fasciola.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de Taenia solium".

d) No. El concepto de esta alternativa es "Ooquistes de Cryptosporidium.": formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/ esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de Taenia solium".

e) Correcta. "Huevos de Taenia solium." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

5. Respuesta: B) Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Ingestión de huevos de T. solium.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos".

b) Correcta. "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. El concepto de esta alternativa es "Picadura de flebotomo.": insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos".

d) No. Esta alternativa se refiere a "Mordedura de perro.": vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos".

e) No. Aquí se está describiendo "Agua con cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos".

6. Respuesta: D) Puede completar ciclo directo y autoinfectar.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Puede completar ciclo directo y autoinfectar." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Necesita siempre pescado y copépodo.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede completar ciclo directo y autoinfectar".

b) No. El concepto de esta alternativa es "Solo infecta perros.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede completar ciclo directo y autoinfectar".

c) No. Esta alternativa se refiere a "No produce huevos.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede completar ciclo directo y autoinfectar".

d) Correcta. "Puede completar ciclo directo y autoinfectar." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esa opción apunta a "Es un trematodo hepático.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Puede completar ciclo directo y autoinfectar".

7. Respuesta: A) Ingestión accidental de pulgas infectadas.

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Ingestión accidental de pulgas infectadas." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: insectos que pueden transmitir agentes o actuar como hospedadores intermediarios de Dipylidium. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Ingestión accidental de pulgas infectadas." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esta alternativa se refiere a "Picadura de Anopheles.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ingestión accidental de pulgas infectadas".

c) No. Aquí se está describiendo "Carne bovina mal cocida.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ingestión accidental de pulgas infectadas".

d) No. Esa opción apunta a "Berro contaminado.": vegetal acuático que puede portar metacercarias de Fasciola. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ingestión accidental de pulgas infectadas".

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Heces de gato con

ooquistes.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ingestión accidental de pulgas infectadas."

8. Respuesta: C) Huesped intermediario accidental.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Huesped intermediario accidental." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: organismo donde ocurren fases larvianas o reproducción asexual del parásito. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Huesped definitivo principal.": organismo donde el parásito alcanza la madurez sexual o realiza reproducción sexual. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huesped intermediario accidental."

b) No. Aquí se está describiendo "Vector biológico.": artrópodo en el que el agente se desarrolla o multiplica antes de transmitirse. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huesped intermediario accidental."

c) Correcta. "Huesped intermediario accidental." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Reservorio felino.": fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huesped intermediario accidental."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Caracol intermediario.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huesped intermediario accidental."

9. Respuesta: E) Adultos intestinales.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Adultos intestinales." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Quistes hidatídicos hepáticos.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adultos intestinales."

b) No. Esa opción apunta a "Cisticercos musculares.": larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adultos intestinales."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Huevos operculados biliares.": huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como *Fasciola*. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adultos intestinales."

d) No. El concepto de esta alternativa es "Larvas pulmonares de *Ascaris*.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Adultos intestinales."

e) Correcta. "Adultos intestinales." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

10. Respuesta: B) Imágenes y serología según localización.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Imágenes y serología según localización." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de *Enterobius* alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Imágenes y serología según localización."

b) Correcta. "Imágenes y serología según localización." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. El concepto de esta alternativa es "Gota gruesa.": un método parasitológico para malaria; concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Imágenes y serología según localización."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Papanicolaou.": una prueba citológica cervical útil para detectar alteraciones por HPV, como colilocitosis o lesiones intraepiteliales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Imágenes y serología según localización."

e) No. Aquí se está describiendo "Cultivo viral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe

marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Imágenes y serología según localización."

## Trematodos

1. Respuesta: C) Caracoles del género *Lymnaea*.

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Caracoles del género *Lymnaea*." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: hospedadores intermediarios de *Fasciola hepática*. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Mosquitos *Aedes*.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o *Plasmodium* según el género y contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del género *Lymnaea*."

b) No. El concepto de esta alternativa es "Pulgas de perro.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del género *Lymnaea*."

c) Correcta. "Caracoles del género *Lymnaea*." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Aquí se está describiendo "Peces de agua dulce.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del género *Lymnaea*."

e) No. Esa opción apunta a "Gatos domésticos.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del género *Lymnaea*."

2. Respuesta: A) Metacercaria en vegetación acuática.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Metacercaria en vegetación acuática." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Metacercaria en vegetación acuática." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Esta alternativa se refiere a "Cercaria que penetra piel.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetación acuática."

c) No. Aquí se está describiendo "Huevo embrionado en suelo.": forma infectante de algunos nematodos como *Ascaris* cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetación acuática."

d) No. Esa opción apunta a "Plerocercario en pescado.": larva infectante de *Diphyllobothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetación acuática."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cisticerco en cerdo.": larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetación acuática."

3. Respuesta: E) Vías biliares.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vías biliares." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: localización de adultos de *Fasciola*, donde depositan huevos que salen por heces. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Colon.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."

b) No. Aquí se está describiendo "Ganglios sensoriales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."

c) No. Esa opción apunta a "Medula ósea.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."



d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vejiga urinaria exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."

e) Correcta. "Vías biliares." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

4. Respuesta: B) Heces.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Heces." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Saliva.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."
- b) Correcta. "Heces." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Orina siempre.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Sudor.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Semen.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."

5. Respuesta: D) Migración hepática, dolor y eosinofilia.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Migración hepática, dolor y eosinofilia." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: fase aguda de fasciolosis con dolor, fiebre/eosinofilia por paso de larvas por hígado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Latencia neuronal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Bronquiolitis viral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Autoinfección intestinal.": capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influencia. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."
- d) Correcta. "Migración hepática, dolor y eosinofilia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo "Cisticercosis muscular.": larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."

6. Respuesta: A) Penetra activamente la piel.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Penetra activamente la piel." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Penetra activamente la piel." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Se ingiere en berros.": vegetal acuático que puede portar metacercarias de Fasciola. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetra activamente la piel."
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Esta en carne de cerdo.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetra activamente la piel."
- d) No. Aquí se está describiendo "Sale en proglotides.": una etapa parasitaria o

helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetra activamente la piel."

e) No. Esa opción apunta a "Permanece como quiste tisular.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetra activamente la piel."

7. Respuesta: C) Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Toxina preformada en alimentos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados."
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Replicación en queratinocitos.": célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados."
- c) Correcta. "Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a "Destrucción de eritrocitos por B19.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Veneno neurotóxico.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados."

8. Respuesta: E) Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Hematuria terminal exclusiva.": manifestación típica de Schistosoma haematobium, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal."
- b) No. Aquí se está describiendo "Crisis aplásica.": interrupción brusca de producción eritroide, especialmente grave si el paciente ya tiene anemia hemolítica crónica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal."
- c) No. Esa opción apunta a "Exantema subito.": roseola infantil, clásicamente asociada a VHH-6 y también VHH-7. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Condilomas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal."
- e) Correcta. "Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

9. Respuesta: B) Hematuria y riesgo de cáncer vesical.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Hematuria y riesgo de cáncer vesical." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: manifestación típica de Schistosoma haematobium, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Anemia por B12.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hematuria y riesgo de cáncer vesical."
- b) Correcta. "Hematuria y riesgo de cáncer vesical." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Quistes hepáticos grandes.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hematuria y riesgo de cáncer vesical."
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Meningitis aséptica viral.": cuadro

frecuente por enterovirus, especialmente en épocas cálidas. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hematuria y riesgo de cáncer vesical."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Tos por rinovirus.": picornavirus lábil al pH ácido y adaptado a 33 grados C, típico de vías respiratorias superiores. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hematuria y riesgo de cáncer vesical."

10. Respuesta: D) Grandes y operculados.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Grandes y operculados." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esa opción apunta a "Mamelonados de Ascaris.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes y operculados."

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Con espina lateral siempre.": característica de huevos de Schistosoma mansoni, no de Fasciola. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes y operculados."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Segmentados en proglotides.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes y operculados."

d) Correcta. "Grandes y operculados." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo "Acido-alcohol resistentes.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Grandes y operculados."

## Artrópodos de importancia médica

1. Respuesta: A) Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: rasgo de artrópodos: cubierta externa de quitina y cuerpo segmentado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. El concepto de esta alternativa es "Endoesqueleto oseo y pulmones alveolares.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado."

c) No. Esta alternativa se refiere a "Capsidem icosaédrica y genoma ARN.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado."

d) No. Aquí se está describiendo "Pared celular de peptidoglicano.": un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado."

e) No. Esa opción apunta a "Cuerpo plano sin apéndices.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado."

2. Respuesta: E) Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: rasgo de insectos adultos, junto con cabeza, tórax y abdomen. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Cuatro pares de patas y cefalotorax.": rasgo de arácnidos como arañas y garrapatas, con cefalotórax y abdomen. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen."

b) No. Esta alternativa se refiere a "Sin patas y cuerpo cilíndrico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este

enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen."

c) No. Aquí se está describiendo "Botrios en escolex.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen."

d) No. Esa opción apunta a "Ventosas oral y ventral siempre.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen."

e) Correcta. "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

3. Respuesta: B) Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Desarrollo obligatorio del parásito en su cuerpo.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente."

b) Correcta. "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esa opción apunta a "Inoculación de veneno neurotóxico.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente."

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Producción de huevos dentro del humano.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente."

e) No. El concepto de esta alternativa es "Replicación viral en ganglio sensorial.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente."

4. Respuesta: D) Trypanosoma cruzi.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Trypanosoma cruzi." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: protozoo causante de Chagas americano, transmitido principalmente por triatominos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Leishmania infantum.": protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi."

b) No. Esa opción apunta a "Plasmodium vivax.": protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito Anopheles hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi."

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Dengue virus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi."

d) Correcta. "Trypanosoma cruzi." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Fasciola hepática.": trematodo hepático adquirido por metacercarias; no produce mononucleosis viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Trypanosoma cruzi."

5. Respuesta: A) Leishmania.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Leishmania." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Leishmania." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Rabia.": rhabdovirus

neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leishmania".

c) No. El concepto de esta alternativa es "Poliovirus.": enterovirus con tropismo por motoneuronas, capaz de causar parálisis flácida. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leishmania".

d) No. Esta alternativa se refiere a "Taenia saginata.": cestodo de carne bovina; no produce mononucleosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leishmania".

e) No. Aquí se está describiendo "Enterobius.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Leishmania".

6. Respuesta: C) Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: arbovirus destacado por fiebre y artralgias intensas, a veces prolongadas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Chagas y leishmaniasis visceral.": protozoo transmitido por flebotomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana".

b) No. El concepto de esta alternativa es "Hidatidosis y teniasis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana".

c) Correcta. "Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Aquí se está describiendo "Oxiuriasis y trichuriasis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana".

e) No. Esta opción apunta a "Fasciolosis y esquistosomiasis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana".

7. Respuesta: E) Piojos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Piojos." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: insectos ectoparásitos causantes de pediculosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Garrapatas.": arácnidos hematófagos que pueden ser vectores biológicos de diversos agentes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piojos".

b) No. Esta alternativa se refiere a "Pulgas exclusivamente.": insectos que pueden transmitir agentes o actuar como hospedadores intermediarios de Dipylidium. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piojos".

c) No. Aquí se está describiendo "Flebotomos.": insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piojos".

d) No. Esta opción apunta a "Cucarachas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piojos".

e) Correcta. "Piojos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

8. Respuesta: B) Vectores biológicos de varios agentes.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vectores biológicos de varios agentes." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Huesped definitivo de Echinococcus.": organismo donde el parásito alcanza la madurez sexual o realiza reproducción sexuada. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vectores biológicos de varios agentes".

b) Correcta. "Vectores biológicos de varios agentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Esta opción apunta a "Reservorio felino de Toxoplasma.": fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vectores biológicos de varios agentes".

d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Caracol intermediario de Fasciola.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vectores biológicos de varios agentes".

e) No. El concepto de esta alternativa es "Adulto intestinal de Taenia.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vectores biológicos de varios agentes".

9. Respuesta: D) Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Es ingerida accidentalmente con cisticercoide." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Pica e inocula cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es ingerida accidentalmente con cisticercoide".

b) No. Esta opción apunta a "Defeca tripomastigotes.": forma de Trypanosoma observable en sangre, especialmente en fase aguda. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es ingerida accidentalmente con cisticercoide".

c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Libera ooquistes en coccidios.": formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en accidias; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es ingerida accidentalmente con cisticercoide".

d) Correcta. "Es ingerida accidentalmente con cisticercoide." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Esta alternativa se refiere a "Deposita huevos de Ascaris.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Es ingerida accidentalmente con cisticercoide".

10. Respuesta: C) Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: medida de APS para reducir mosquitos y otros vectores, junto con barreras y educación comunitaria. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta opción apunta a "Suspender agua potable.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad".

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Evitar toda vacunación.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad".

c) Correcta. "Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. Esta alternativa se refiere a "Usar antibióticos semanales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad".

e) No. Aquí se está describiendo "Capturar serpientes para estudio.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad".

## Importancia médica de serpientes

1. Respuesta: E) Bothrops.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Bothrops." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de

ofidismo: género responsable de la mayoría de accidentes ofídicos en Sudamérica y de gran relevancia sanitaria en Paraguay. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo. Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Micrurus.": coral verdadera; su veneno se caracteriza principalmente por neurotoxicidad. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.":
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Cobra.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.":
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Dispholidus.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.":
- d) No. Aquí se está describiendo "Sistrurus exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.":
- e) Correcta. "Bothrops." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

2. Respuesta: B) Incluye especies capaces de accidentes severos.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Incluye especies capaces de accidentes severos." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Es siempre no venenosa.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.":
- b) Correcta. "Incluye especies capaces de accidentes severos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Solo causa lesiones leves locales.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.":
- d) No. Esa opción apunta a "Pertenece a anfibios.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.":
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "No existe en el país.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.":

3. Respuesta: D) Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: manifestaciones locales y hemorragias típicas de accidente botrópico. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Parálisis sin lesión local ni coagulopatía.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.":
- b) No. Aquí se está describiendo "Diarrea crónica y malabsorción.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.":
- c) No. Esa opción apunta a "Hidrofobia y fiebre.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.":
- d) Correcta. "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Exantema y artralgia.": manifestaciones inmunomediadas de la segunda fase de parvovirus B19, cuando suele disminuir la contagiosidad. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.":

4. Respuesta: A) Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a "Verrugas cutáneas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.":
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Diarrea acuosa por enterocito.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.":
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Quistes hepáticos.": forma resistente e infectante de muchos protozoos intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.":
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Anemia megaloblástica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.":

5. Respuesta: C) Cuadro neurotóxico.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Cuadro neurotóxico." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Cuadro biliar crónico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuadro neurotóxico.":
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Colitis disenterica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuadro neurotóxico.":
- c) Correcta. "Cuadro neurotóxico." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Bronquiolitis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuadro neurotóxico.":
- e) No. Aquí se está describiendo "Mononucleosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuadro neurotóxico.":

6. Respuesta: E) Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Torniquete apretado prolongado.": medida contraindicada porque puede empeorar isquemia y daño local. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.":
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Cortes y succión de la herida.": maniobra prehospitalaria contraindicada: aumenta lesión e infección y no retira veneno de forma útil. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.":
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Aplicar hielo directo por horas.": medida contraindicada porque puede agravar lesión tisular local. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.":
- d) No. Aquí se está describiendo "Dar alcohol para analgesia.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea

absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido."

e) Correcta. "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

7. Respuesta: B) Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad.

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: tratamiento específico del envenenamiento por serpiente, indicado según tipo y gravedad. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. El concepto de esta alternativa es "Antiviral de amplio espectro.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."

b) Correcta. "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

c) No. Aquí se está describiendo "Albendazol por 3 días.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Antihistaminico como unica medida.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."

8. Respuesta: D) Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local.

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: estudios útiles para evaluar gravedad sistémica en ofidismo, especialmente coagulopatía, sangrado y daño renal. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Esta alternativa se refiere a "Papanicolau y colposcopia.": una prueba citológica cervical útil para detectar alteraciones por HPV, como coilocitosis o lesiones intraepiteliales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local."

b) No. Aquí se está describiendo "Gota gruesa y gota fina exclusivamente.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local."

c) No. Esa opción apunta a "Coprocultivo de rutina.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local."

d) Correcta. "Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. El concepto de esta alternativa es "Serologia de VEB.": la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local."

9. Respuesta: C) Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Ayudar si es segura, pero no retrasar atención." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) No. Aquí se está describiendo "Ser obligatoria antes de todo tratamiento.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ayudar si es segura, pero no retrasar atención."

b) No. Esa opción apunta a "Realizarse capturando siempre el animal vivo.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del

contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ayudar si es segura, pero no retrasar atención."

c) Correcta. "Ayudar si es segura, pero no retrasar atención." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

d) No. El concepto de esta alternativa es "Sustituir la evaluacion clinica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ayudar si es segura, pero no retrasar atención."

e) No. Esta alternativa se refiere a "Evitar el uso de antiveneno.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Ayudar si es segura, pero no retrasar atención."

10. Respuesta: A) Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

a) Correcta. "Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eliminar todos los reptiles del país.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo."

c) No. El concepto de esta alternativa es "Diagnosticar virosis respiratorias.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo."

d) No. Esta alternativa se refiere a "Tratar parásitos intestinales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo."

e) No. Aquí se está describiendo "Reemplazar vacunacion humana.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo."