

郑安欣 (EMMA ZHENG) 的女童军金奖项目

自闭症早期干预与认知

● 双语资源指南 · 中文版



旨在帮助华语家庭了解自闭症早期征兆、获取双语筛查资源并提供连接本地干预服务的具体步骤。

早期征兆与发育警示信号

自闭症是一种神经发育状况，最早可在 18—24 个月时被可靠地识别。及早识别发育警示信号，使家长能够在儿童大脑发育最关键的早期阶段获得干预服务。

1 社交与沟通里程碑

- **叫名字无反应：** 在12个月大时，被叫到名字时没有转身或回应（常被误认为是听力问题）。
- **缺乏共同注意：** 在18个月大时，不会用手指指引你看有趣的事物（例如，指着飞机或玩具），或者当你用手指指物时他不顺着看。
- **不分享兴趣：** 在15个月大时，不会拿着或展示玩具/物品给父母，仅为了分享喜悦。
- **无模仿：** 在18个月大时，不会模仿简单的动作、声音或面部表情。
- **无互动游戏：** 在12个月大时，不会玩简单的互动游戏（如躲猫猫、拍手歌）或挥手说“再见”。

2 游戏与行为模式

- **缺乏假装游戏：** 在 18—24 个月大时，不会进行想象性游戏（例如，假装喂洋娃娃、接玩具电话或推动积木当车开）。
- **重复性行为：** 反复拍手、摇晃身体或原地打转。
- **异常的游戏焦点：** 以不寻常的方式玩玩具，例如反复转动玩具车的轮子或排列物品而非正常玩耍，如果这种顺序被打破会感到极度焦虑。
- **感官敏感：** 对日常声音（如吸尘器或搅拌机）表现出极端痛苦，或者对灯光或旋转物体有异常的迷恋。

直观快速参考 — 6 大核心警示征兆（12至36个月）



眼神接触少



不用手指出示



语言发育迟缓



重复刻板行为



缺乏想象游戏



感官知觉过敏

⚠ “黄金法则”警示信号（任何年龄）

任何技能退化或丧失（包括言语、咿呀学语、眼神接触、手势或任何年龄的社交能力）是一个重要的警示信号，需要立即由儿科医生进行发育评估。

寻求帮助的步骤：筛查与评估

遵循以下步骤，引导您的家庭从最初的担忧到获得干预服务。

- 1

观察与追踪记录

使用美国疾病预防控制中心（CDC）的“关注早期征兆，尽早行动”里程碑核对表。记录您在孩子的语言、眼神接触、游戏或社交参与方面的任何担忧。
- 2

与儿科医生沟通

在孩子 18 个月和 24 个月的健康儿童随访时，申请正式的发育筛查。主动向医生咨询 M-CHAT-R/F 筛查问卷。
- 3

进行全面诊断评估

如果初筛结果显示有中高风险，应向发育儿科医生、儿童心理学家或多学科评估团队寻求全面的诊断评估。
- 4

获取早期干预服务

联系北维州本地的婴幼儿干预中心（0—3岁）或 Child Find 筛查项目（2—5岁）。早期干预是免费的，且无需提供诊断证明即可开始服务。无需社会安全号（SSN）。

北维州（DMV）本地服务联系方式

费尔法克斯 CSB — (703) 324-4400
申请干预与社区服务最重要电话，无需SSN。

Child Find 筛查项目 (FCPS)
费尔法克斯郡公立学校（FCPS）为20个月至5岁提供免费筛查。


婴幼儿早期干预联系中心 (ITC)
为 0—3 岁发育迟缓或有发育风险的婴幼儿提供免费干预。

ASNV 协会 — (571) 328-5792
北维吉尼亚自闭症协会，提供教育课程和互助小组。

改变认知观念

多维自闭症谱系图（色彩轮）

直观理解神经多样性
多维自闭症谱系图（色彩轮）



每个自闭症儿童均拥有独特的雷达形态分布。

目前，医学界与自闭症群体正在积极倡导改变以往对自闭症的线性分级观念。自闭症不再被看作是一个从“轻度/高功能”到“重度/低功能”的简单一维数轴，而是应当被看作是一个多维的色彩轮（自闭症轮）。

色彩轮上的每一个“轴向”都代表了一组独立的神经发育维度（例如：感官处理、语言交流、社交互动、运动协调以及执行功能）。每个孩子在不同维度上都有其独特的表现，他们会展现出不同程度的发育差异，也会在特定方向上拥有出色的优势。

核心启示： 有的孩子可能在感官处理上极其敏感（需要较高的支持），但在语言表达和字词认知方面发育很快。另一些孩子可能在特定专注领域展现出惊人天赋，但在非结构化社交场合需要一定的引导。自闭症轮模型能更清晰地发掘出每个宝宝独特的强项并给以尊重。

获取更多权威资源与支持

官方健康与研究资源

[CDC — 孤独症谱系障碍筛查指南](#) — 监测指南。

[CDC — 自闭症谱系障碍基本信息](#) — 资源与信息。

[CDC "关注早期征兆，尽早行动"](#) — 发育跟踪工具。

[NIH / NICHD: 自闭症与早期干预](#) — 科研支持资源。

[Autism Speaks 自闭症之声官网](#) — 自闭症支持与倡导资源。

[自闭症之声“100天工具包”](#) — 诊断初期家庭指南。

双语与文化敏感资源

[自闭症之声中文资源包](#) — 免费下载翻译为中文的指南。

[CARES 华语自闭症资源服务](#) — 华语家庭的同伴支持与讲座。

[婴幼儿早期干预联系中心 \(Fairfax ITC\)](#) — 为 0 至 3 岁儿童提供发育评估和干预服务。

[FCPS Child Find 发育筛查项目](#) — 免费为 20 个月至 5 岁儿童提供筛查。

常见误区解答

自闭症：常见误区与医学事实

误区

“会说话的宝宝肯定不是自闭症。”

事实

自闭症是宽谱系。许多患儿说话流利，但在社交双向互动、理解非语言肢体符号或适应日常规则变化方面需要支持。

误区

“孩子还小，等等看长大会不会好。”

事实

在18—36个月的脑发育黄金期进行早期干预能取得最大成效。盲目“等待”往往会延误关键的康复干预时机。

误区

“自闭症是因为家庭抚育冷漠导致的。”

事实

自闭症是一种与生俱来的神经发育差异。全球大量科学研究表明，它与父母的教养方式、情感环境或疫苗完全无关。

项目背景简介

本宣传册是郑安欣 (Emma Zheng) 女童军金奖项目的一部分，旨在提升大华府地区华语移民家庭和中国湖北省农村地区对早期自闭症筛查的认知。在18至36个月之间进行早期诊断并实施康复干预，是改善患儿长期发育质量的最关键因素。

宣讲外展会场

[希望中文学校 \(泰森校区\)](#) — 在周六/周日下午家长休息时间 (2:00—4:00 PM) 举行宣讲会。

[维也纳华语教会社区 \(CCCVA\)](#) — 地址: 541 Marshall Rd. SW, Vienna, VA 22180。通过教会及社区网络分发资料。

申请双语宣讲或获取资料

我们可为中文学校、教会团体、儿科诊所和社区中心提供免费宣讲服务。

EZHENGVA@GMAIL.COM



© 2026 郑安欣 — 美洲女童军个人金奖项目 · 所有宣传资料均可免费分发与使用。

参考来源: 美国国立卫生研究院 (NIH), CDC, ChildFind, Autism Speaks · 官方网址: emmaz-sv.github.io/early-autism-awareness