

Polvo Liofilizado para Solución Inyectable

# Omeprazol

## 40 mg

Potente Antiácido  
inhibidor de la  
bomba de protones.

Indicado en :

- Úlcera gástrica o duodenal sangrante.
- Úlcera gástrica o duodenal no sangrante, cuando la terapia oral está contraindicada.
- Esofagitis por reflujo.
- Síndrome de Zollinger-Ellison.
- Profilaxis de neumonitis por aspiración ácida.



Presentación

Caja x 10 Unidades

Registro ISP No.

F-13903/09



**Vitalis**  
PHARMACEUTICAL

Sabe mucho de vida

[www.labvitalis.com](http://www.labvitalis.com)

# Omeprazol

## 40 mg

Polvo Liofilizado para Solución Inyectable



**Antiácido inhibidor de la bomba de protones.**

#### INDICACIONES:

Tratamiento en condiciones clínicas severas donde se requiere un alto grado de supresión de la secreción ácida gástrica o cuando la ingestión oral se encuentra alterada o está contraindicada.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al Omeprazol

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Debe evaluarse el factor riesgo beneficio en embarazo y lactancia. En el caso de úlcera gástrica debe descartarse la posibilidad de malignidad antes de iniciar la terapia con OMEPRAZOL.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS:

OMEPRAZOL, es un medicamento bien tolerado.

Se ha reportado a una frecuencia menor al 1%; cefalea, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, mareo, astenia y rash cutáneo.

#### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

El Omeprazol prolonga la vida media del Diazepam, fenitoina, antipirina, aminopirina y Warfarina. Deben tomarse las debidas precauciones cuando se administren concomitantemente otros medicamentos que utilicen la vía metabólica del citocromo P - 450.

**POSOLÓGIA:** Dosis: 20 mg a 60 mg /día

**Síndrome de Zollinger-Ellison:** Se recomienda una dosis inicial de 60 mg al día I.V. Cuando la dosificación exceda los 60 mg al día, deberá dividirse la dosis y administrarse dos veces al día.

**Profilaxis de la neumonía por aspiración:** Omeprazol I.V. 40 mg debe administrarse una hora antes de la cirugía; si la intervención se retrasa más de dos horas se deberá administrar una dosis adicional de 40 mg.

**Insuficiencia renal:** No se requiere ajustar la dosis.

**Insuficiencia hepática:** Una dosis diaria de 10 a 20 mg puede ser suficiente.

**Ancianos:** No se requiere ajustar la dosis.

La experiencia de Omeprazol parenteral en niños es limitada.

OMEPRAZOL Liofilizado para infusión intravenosa (I.V.), debe reconstituirse en el frasco vial añadiendo 10ml de solución salina al 0.9% o dextrosa al 5%, hasta quedar totalmente uniforme la solución.

Una vez reconstituido el producto, disolverla en 90 ml de la solución empleada inicialmente para competir 100ml.

Si la solución fue preparada en Dextrosa al 5%, debe utilizarse antes de 6 horas; si se utilizó solución salina al 0.9%, debe utilizarse antes de 12 horas.

OMEPRAZOL, para infusión (I.V.), solo puede ser disuelto en solución salina al 0.9% y Dextrosa al 5%.

La infusión debe administrarse por vía intravenosa durante 20 a 30 minutos, una vez al día.

**CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 25° C. PROTÉJASE DEL CALOR Y LA LUZ. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA. PRODUCTO DE USO DELICADO, ADMINÍSTRESE POR PRESCRIPCIÓN Y BAJO VIGILANCIA MÉDICA.**

#### PRESENTACIÓN:

Cada frasco ampolla con liofilizado contiene:

Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de Omeprazol

PAIS	REG. SANITARIO	TEL. CONTACTO
Colombia	INVIMA 2001M-0000504	(571)673 4340 • Ext.: 2011
Chile	F-13903/09	(562)2201 9424
MAYOR INFORMACIÓN: <a href="http://www.labvitalis.com">www.labvitalis.com</a> - <a href="mailto:info@labvitalis.com">info@labvitalis.com</a>		
Badajoz 100 - Oficina 702 - Teléfono: ( 562)2201 9424 SANTIAGO - LAS CONDES - CHILE		

L-ME-J-049-2

La información contenida en este folleto, está dirigida exclusivamente al cuerpo médico como recordación. Material de uso exclusivo del representante de VITALIS