

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (ASSIST)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias
Sigla	ASSIST
Autores	Grupo de Trabajo de la OMS
Año	2002
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Uso problemático de sustancias
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario (Entrevista clínica)
Disponibilidad en español	Sí (OMS)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Conservar créditos y avisos; adaptacion/comercial sujeto a OMS.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Uso problemático de sustancias. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Evalúa cada tipo de sustancia por separado (10 clases de sustancias) en su nivel de riesgo.

3 Características generales

Formato	Cuestionario (Entrevista clínica)
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	8 ítems básicos aplicados iterativamente a cada sustancia que se haya consumido.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert sobre frecuencia de consumo y problemas derivados (0 a 6 puntos según el ítem y la respuesta).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Evalúa cada tipo de sustancia por separado (10 clases de sustancias) en su nivel de riesgo.
Ítems	8 ítems básicos aplicados iterativamente a cada sustancia que se haya consumido.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert sobre frecuencia de consumo y problemas derivados (0 a 6 puntos según el ítem y la respuesta).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria específica para cada clase de sustancia (rango 0 a 39).

Regla de corrección	Sumatoria específica para cada clase de sustancia (rango 0 a 39).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Estratifica el riesgo para cada sustancia: Bajo (0-3; alcohol 0-10), Moderado (4-26; alcohol 11-26, requiere intervención breve), Alto (27+, requiere tratamiento especializado).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Screening primario global, excelente fiabilidad concurrente.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Screening primario global, excelente fiabilidad concurrente.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (OMS)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 4 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Uso problemático de sustancias en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Grupo de Trabajo de la OMS; 2002.
- Disponibilidad española reportada: Sí (OMS)
- Trazabilidad local: 3 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Uso problemático de sustancias
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 8 ítems básicos aplicados iterativamente a cada sustancia que se haya consumido.; Evalúa cada tipo de sustancia por separado (10 clases de sustancias) en su nivel de riesgo.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria específica para cada clase de sustancia (rango 0 a 39).
Interpretación	Estratifica el riesgo para cada sustancia: Bajo (0-3; alcohol 0-10), Moderado (4-26; alcohol 11-26, requiere intervención breve), Alto (27+, requiere tratamiento especializado).
Estado de fuentes	Locales válidos: 3; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Grupo de Trabajo de la OMS (2002). Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias.

Fuente de referencia del catálogo: [OMS ASSIST](<https://www.who.int/publications/i/item/9789241599382>)

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241599382>

<https://doi.org/10.7334/PSICOTHEMA2013.172>

<https://www.paho.org/es/documentos/prueba-deteccion-consumo-alcohol-tabaco-sustancias-assist-manual-para-uso-atencion>

<https://www.paho.org/sites/default/files/consumo-sustancias-Assist-manual.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	OMS ASSIST v3.0 español, abril de 2009. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 ec099 215f63fd5 920 163 662e3e6a53 626 364b193b794 216a11b4695c4 9bd7800.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Entrevista estructurada.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	OMS ASSIST v3.0 español, abril de 2009.
6. Periodo temporal	Vida y últimos tres meses, según pregunta.
7. Escala/formato de respuesta	Categorías específicas por pregunta; no es una única Likert.
8. Algoritmo de puntuación	Manual OMS ASSIST v3.0: calcular por sustancia sumando P2–P7; P1 (cribado de vida) y P8 (inyección) no integran la puntuación. Riesgo alcohol: 0–10 bajo, 11–26 moderado, ≥27 alto; demás sustancias: 0–3 bajo, 4–26 moderado, ≥27 alto.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Estratifica el riesgo para cada sustancia: Bajo (0-3; alcohol 0-10), Moderado (4-26; alcohol 11-26, requiere intervención breve), Alto (27+, requiere tratamiento especializado). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Documento OMS accesible; conservar atribución y revisar las condiciones de reutilización de OMS antes de redistribuir/adaptar.
13. Referencias y fuentes verificadas	OMS. ASSIST v3.0, español (2009), https://www.who.int/publications/i/item/978924159938-2 .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.