

MAS — Escala de Manía de Bech-Rafaelsen (MAS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 11

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

Se trata de una escala de segunda generación derivada por una parte de la escala de Biegel para los estados maníacos y por otra como contraposición a la escala de melancolía de los mismos autores. Consta de 11 ítems que evalúan la presencia e intensidad de los síntomas maníacos, según los criterios diagnósticos DSM-IV y CIE-10 (excepto el B8 [comportamientos temerarios o imprudentes] de la CIE-10).

Cada ítem se puntúa utilizando una escala Likert de intensidad que oscila entre 0 y 4. La escala proporciona criterios operativos de puntuación.

Se trata de una escala heteroaplicada en la que el clínico sigue el método de una entrevista clínica semiestructurada. Existe también una versión autoaplicada (Bech, 1993).

El marco de referencia temporal son como mínimo los 3 días previos. (Hay autores que recomiendan los 3 días previos para pacientes ingresados y los 7 días previos para pacientes ambulatorios.)

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona una medida objetiva de la gravedad de los síntomas que en la actualidad está experimentando el

paciente, que se obtiene sumando las puntuaciones en los 11 ítems.

La puntuación oscila entre 0 y 44 puntos. Los puntos de corte establecidos para la versión original son:

0-5: no manía.

6-9: hipomanía (leve).

10-14: manía probable.

15: manía definitiva.

Fuente: The mania rating scale: Scale construction and inter-observer agreement. Neuropsychopharmacology 1978; 17: 430-431