

SIPS — Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos (Structured Interview for Prodromal States, SIPS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 33

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

La SIPS es una entrevista de ayuda diagnóstica semiestructurada diseñada para diferenciar clínicamente entre los síndromes prodrómicos y la psicosis u otros fenómenos clínicos, y detectar los pacientes con riesgo inminente de desarrollar psicosis.

La SIPS permite identificar la presencia de uno o más de los 3 síndromes prodrómicos descritos por los autores (Woods y cols., 2001):

A. Síndrome psicótico breve intermitente: presencia clara de síntomas psicóticos breve y recientemente.

B. Síndrome con síntomas positivos atenuados: síntomas psicóticos atenuados recientes.

C. Síndrome de riesgo genético (presencia de trastorno esquizotípico de la personalidad y/o familiar de pri-

mer grado con un trastorno psicótico) y disfunción global (30 % de reducción en la puntuación en la EEAG en el último mes respecto de la puntuación hace 1 año).

Incluye 4 componentes, además de un apartado previo de resumen e historia demográfica y un listado final resu-

men con los criterios de los tres síndromes prodrómicos y presencia de estado psicótico:

La SOPS (v. punto 4.3.1).

Una versión de la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG, ver capítulo 12), con criterios operati-

vos de puntuación bien definidos.

Un listado de los criterios DSM-IV para el trastorno esquizotípico de la personalidad.

Historia familiar de trastornos mentales y del comportamiento.

Instrumento heteroaplicado por personal con experiencia clínica y previamente entrenado en el manejo de esta entrevista.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Las puntuaciones y las respuestas dicotómicas sí/no otorgadas a cada uno de los ítems evaluados se transcriben

en la hoja de «Resumen de los datos SIPS».

A partir de la información de esta hoja de resumen de datos se van contestando las

preguntas dicotómicas sí/no
del «Sumario de la SIPS», las cuales nos permitirían confirmar la exclusión de síndrome
psicótico y el diagnóstico
de uno o más de los tres síndromes prodrómicos.
© Psiquiatría Editores, S.L.

38 Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica

Fuente: A scale for the assessment of prodromal symptoms and states. En: Miller TJ, Mednick SA, McGlashan TH, Libiger J, Johannessen JO, eds. Early intervention in psychotic disorders. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001; 135-139