

SOPS — Escala de Síntomas Prodrómicos (Scale of Prodromal Symptoms, SOPS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 19

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

La SOPS es un instrumento desarrollado para evaluar la presencia e intensidad de signos y síntomas prodrómicos de esquizofrenia.

Consta de 19 ítems que evalúan los siguientes cuatro grupos de síntomas:

Positivos (5 ítems).

Negativos (6 ítems).

De desorganización (4 ítems).

Generales (4 ítems).

La puntuación de los 19 ítems se realiza mediante una escala tipo Likert de 7 grados de libertad en el rango no psicótico, que oscilan de 0 (ausente) a 5 (grave pero no psicótico) y 6 (extremo/grave y psicótico).

Cada uno de los grados de intensidad de presencia está ilustrado con un glosario orientativo de ejemplos.

Se recomienda aplicar en períodos inferiores a 6 meses desde la última visita. Cuando las revisiones se realizan en un período superior a los 6 meses, se debe aplicar la SIPS.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona una puntuación de gravedad psicopatológica global, suma de las puntuaciones en los 19 ítems, y

puntuaciones parciales en cada uno de las 4 dimensiones psicopatológicas.

No existen puntos de corte propuestos, a mayor puntuación mayor gravedad psicopatológica.

Fuente: A scale for the assessment of prodromal symptoms and states. En: Miller TJ, Mednick SA, McGlashan TH, Libiger J, Johannessen JO, eds. Early intervention in psychotic disorders. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001; 135-139