

SUMD — Escala de Evaluación del Insight (Scale Unawareness of Mental Disorders, SUMD)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 9

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

La SUMD fue diseñada para evaluar la conciencia de enfermedad en los pacientes psicóticos multidimensionalmente.

La versión reducida, la más utilizada actualmente, consta de 9 ítems que se agrupan en dos partes:

La primera parte, o evaluación global de la conciencia de enfermedad, está formada por los 3 primeros ítems

y se centra en la conciencia de padecer una enfermedad mental, de los efectos de la medicación y de las consecuencias sociales de la enfermedad mental.

La segunda parte o conciencia de los síntomas, está formada por 6 ítems que evalúan el nivel de conciencia y

la atribución de 6 síntomas: alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, embotamiento afectivo, anhedonia y asociabilidad. Lógicamente, es necesario que previamente el evaluador haya valorado la presencia o

ausencia de dichos síntomas (los autores recomiendan utilizar para ello la PANSS; sólo se evalúa la conciencia de un síntoma si en esta escala puntúa 3 o más).

Las puntuaciones del nivel de conciencia se realizan mediante una escala Likert de 6 valores de intensidad que

oscilan entre 0 (ítem no relevante), 1 (conciencia) y 5 (no hay conciencia). Para las puntuaciones de la atribución

de los 6 síntomas se utiliza la misma escala Likert. Para evaluar la atribución de un síntoma es necesario tener

conciencia del mismo; por ello, sólo se evalúa la atribución en los síntomas puntuados con 3 o menos en el apartado de conciencia.

La versión no reducida evalúa 14 síntomas, incluyendo además de los de la versión reducida, los siguientes: afecto

inapropiado, apariencia inusual, comportamiento estereotipado, juicio social pobre, control de impulsos agresivos,

control de impulsos sexuales, alogia, abolición y trastornos de la atención.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Proporciona una puntuación de conciencia de enfermedad global y una puntuación de conciencia de los síntomas y de atribución de los síntomas.

La puntuación de conciencia global se obtiene sumando las puntuaciones en los 3 primeros síntomas. Los autores no proporcionan puntos de corte. A mayor puntuación, mayor gravedad.

Las puntuaciones de conciencia y de atribución de los síntomas se obtienen aplicando la siguiente fórmula: suma

de los puntos obtenidos en la dimensión correspondiente (conciencia o atribución) de los ítems 4 al 9 dividido

por el número de ítems relevantes para esa dimensión (conciencia o atribución). Ítems relevantes son aquellos

que obtienen puntuaciones superiores a 0. Los autores no proporcionan puntos de corte.

En ambas dimensiones,

a mayor puntuación, mayor gravedad.

Fuente: Assessment of insight in psychosis. Am J Psychiatry 1993; 150: 873-879