

COPE-48

Versión española del COPE-48: Evaluación del afrontamiento en pacientes psiquiátricos ambulatorios

Martínez-Ortega, Y., Gomà-i-Freixanet, M., y Fornieles-Deu, A. (2018). *Terapia Psicológica*, 36(1), 9-14. Adaptación de: Martínez Ortega, Y., Gomà-i-Freixanet, M., y Fornieles, A. (2016). The COPE-48: An adapted version of the COPE inventory for use in clinical settings. *Psychiatry Research*, 30, 808-814.

Instrucciones

Instrumento autoadministrado de lápiz y papel. Indique con qué frecuencia realiza cada una de las siguientes conductas o pensamientos cuando afronta una situación estresante, usando la siguiente escala:

1 = No lo hago nunca 2 = Lo hago algunas veces 3 = Lo hago con bastante frecuencia 4 = Lo hago muchas veces

(Nota de verificación: el artículo original especifica en el cuerpo del texto una escala Likert de cuatro puntos «1 = No lo hago nunca a 4 = Lo hago muchas veces»; las dos categorías intermedias no se transcriben textualmente en el artículo — se han rotulado aquí de forma genérica como «algunas veces» / «con bastante frecuencia» siguiendo la convención estándar del COPE de Carver et al. Verificar la redacción exacta de las categorías 2 y 3 contra el artículo fuente antes de una aplicación clínica formal.)

1. Afrontamiento activo del problema

1. Concentro mis esfuerzos en hacer algo acerca de ello. [1 2 3 4]
2. Elaboro un plan de acción. [1 2 3 4]
3. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer. [1 2 3 4]
4. Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario dejo otras cosas un poco de lado. [1 2 3 4]
5. Intento firmemente evitar que otras cosas interfieran con mis esfuerzos por hacer frente a esto. [1 2 3 4]
6. Llevo a cabo una acción directa en torno al problema. [1 2 3 4]
7. Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto. [1 2 3 4]
8. Medito profundamente acerca de qué pasos tomar. [1 2 3 4]

9. Hago lo que ha de hacerse, paso a paso. [1 2 3 4]

2. Consumo de alcohol o drogas

10. Utilizo alcohol o drogas para hacerme sentir mejor. [1 2 3 4]

11. Intento perderme un rato bebiendo alcohol o consumiendo drogas. [1 2 3 4]

12. Bebo alcohol o tomo drogas para pensar menos en ello. [1 2 3 4]

13. Utilizo alcohol o drogas para ayudarme a superarlo. [1 2 3 4]

3. Centrarse en las emociones y desahogarse

14. Me altero y dejo que mis emociones afloren. [1 2 3 4]

15. Me altero y soy realmente consciente de ello. [1 2 3 4]

16. Dejo aflorar mis sentimientos. [1 2 3 4]

17. Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese malestar. [1 2 3 4]

4. Búsqueda de apoyo social

18. Intento conseguir consejo de alguien sobre qué hacer. [1 2 3 4]

19. Hablo de mis sentimientos con alguien. [1 2 3 4]

20. Hablo con alguien para averiguar más acerca de la situación. [1 2 3 4]

21. Intento conseguir apoyo emocional de amigos o familiares. [1 2 3 4]

22. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto acerca del problema. [1 2 3 4]

23. Consigo el apoyo y comprensión de alguien. [1 2 3 4]

24. Pregunto a personas que han tenido experiencias similares qué hicieron. [1 2 3 4]

25. Hablo con alguien de cómo me siento. [1 2 3 4]

5. Humor

26. Me río de la situación. [1 2 3 4]

27. Hago bromas sobre ello. [1 2 3 4]

28. Bromeo sobre ello. [1 2 3 4]

29. Hago bromas de la situación. [1 2 3 4]

6. Religión

30. Confío en Dios. [1 2 3 4]

31. Busco la ayuda de Dios. [1 2 3 4]

32. Intento encontrar alivio en mi religión. [1 2 3 4]

33. Rezo más de lo habitual. [1 2 3 4]

7. Negación

34. Me digo a mi mismo: “esto no es real”. [1 2 3 4]

35. Me niego a creer que ha sucedido. [1 2 3 4]

36. Finjo que no ha sucedido realmente. [1 2 3 4]

37. Actúo como si nunca hubiera sucedido. [1 2 3 4]

8. Refrenar el afrontamiento

38. Me disuado a mí mismo de hacer algo demasiado rápidamente. [1 2 3 4]

39. Demoro hacer algo acerca de ello hasta que la situación lo permita. [1 2 3 4]

40. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar precipitadamente. [1 2 3 4]

41. Me obligo a esperar el momento adecuado para hacer algo. [1 2 3 4]

9. Aceptación y crecimiento personal

42. Acepto que esto ha pasado y que no se puede cambiar. [1 2 3 4]

43. Intento verlo de manera diferente para hacerlo parecer más positivo. [1 2 3 4]

44. Busco algo bueno en lo que está sucediendo. [1 2 3 4]

45. Pienso en cómo podría manejar mejor el problema. [1 2 3 4]

46. Acepto la realidad del hecho que ha sucedido. [1 2 3 4]

47. Aprendo a vivir con ello. [1 2 3 4]

48. Aprendo algo de la experiencia. [1 2 3 4]

Total de ítems: 48 (verificado = 48).

Puntuación

Puntuación de cada escala = suma o media de los ítems que la componen (el artículo fuente no especifica explícitamente suma vs. media; reporta medias por escala en su Tabla 2, lo que sugiere que la puntuación de referencia es la media de los ítems de cada escala).

Puntuaciones más altas = mayor uso de esa estrategia de afrontamiento. Consistencia interna media reportada (alfa de Cronbach) = 0.81 en población psiquiátrica ambulatoria (N=301); la escala 8 (Refrenar el afrontamiento) mostró consistencia interna más baja (alfa=0.55), mantenida por su utilidad clínica según los autores.