

ADAS-Cog — Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS)

Administración: Heteroaplicada

N.º de ítems: 21; 11 forman el ADAS cognitivo y 10 el ADAS no cognitivo

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El ADAS es un instrumento diseñado para la evaluación del estado cognitivo y del comportamiento de los pacientes con enfermedad de Alzheimer.

Es el único instrumento que la Agencia Europea del Medicamento tiene en cuenta y considera básico en la actualidad para la valoración de la eficacia terapéutica de los nuevos productos que buscan indicación en el campo de las demencias.

Consta de un total de 21 ítems que se agrupan en dos subescalas: el ADAS cognitivo (11 ítems) y el ADAS no cognitivo (10 ítems).

El ADAS cognitivo evalúa las siguientes funciones cognitivas:

Memoria: recuerdo inmediato de palabras, reconocimiento de palabras y recuerdo de las instrucciones de la prueba de memoria.

Lenguaje: encadenamiento de órdenes múltiples, denominación de objetos y dedos, capacidad en el lenguaje hablado, comprensión del lenguaje hablado y dificultad en encontrar las palabras adecuadas.

Praxia: constructiva e ideatoria.

Orientación: temporal y espacial.

El ADAS no cognitivo evalúa las alteraciones del:

Estado de ánimo: lloros, depresión, apetito.

Comportamiento: concentración/distraibilidad, falta de cooperación en las pruebas, ideas delirantes, aluci-

naciones y actividad psicomotora (deambulación, hiperactividad y temblor).

Es un instrumento heteroaplicado. El tiempo de administración aproximado es de 45 minutos.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Para poder administrar este instrumento se precisa material complementario que no se adjunta en esta obra

(objetos, láminas, cartulinas con palabras escritas, sobre, sello, etc.).

Cada una de las pruebas de las 2 subescalas tiene criterios operativos específicos para la puntuación.

Las puntuaciones en los ítems del ADAS cognitivo varían en los distintos ítems. En todos los casos mayor pun-

tuación significa mayor deterioro. La puntuación total oscila entre 0 y 69. Las puntuaciones de referencia son

las siguientes:

- Ancianos sanos: 0-10 puntos.

- Alzheimer ligero-moderado sin tratar: 15-25 puntos.

Las puntuaciones en los ítems del ADAS no cognitivo oscilan entre 0 (ninguna disfunción) y 5 (máxima dis-

función). La puntuación en esta subescala oscila pues entre 0 y 50.

La puntuación total se calcula sumando las puntuaciones en los 11 ítems del ADAS cognitivo y en los 10 ítems del

ADAS no cognitivo. La puntuación total oscila entre 0 y 119 puntos; a mayor puntuación mayor deterioro.

Fuente: The Alzheimer's Disease Assessment Scale: An instrument for assessing treatment efficacy. Psychopharmacol Bull 1983; 19: 448-450