

BWSQ — Cuestionario de Síntomas de Retirada de Benzodiazepinas (Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire, BWSQ)

Administración: Autoaplicada

N.º de ítems: 20

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El BWSQ consta de 20 ítems que evalúan los síntomas que más frecuentemente aparecen con la retirada de las benzodiazepinas. De los 20 ítems: 10 se refieren a trastornos de la percepción y sensación. 7 a síntomas somáticos. 3 son independientes (humor depresivo, pérdida de control de movimientos voluntarios, incluyendo convulsiones epilépticas, y pérdida de memoria). Posee además espacio para describir y puntuar 4 posibles síntomas que presente ese paciente en concreto y que no estén incluidos en el listado de 20 síntomas que componen la escala. Autoaplicado, los pacientes han de contestar a cada uno de los ítems utilizando una escala tipo Likert de 3 grados de intensidad, desde ausencia del síntoma (valor 0) a presente y grave (valor 2 puntos). Existen dos versiones: BWSQ-1: evalúa los síntomas más graves que el paciente ha experimentado en cualquier momento durante el consumo de o la abstinencia a benzodiazepinas. – Cuando contesta el cuestionario, el sujeto, además de indicar si cada uno de los síntomas los ha padecido o no y en qué intensidad los ha padecido, tiene también que indicar si los padeció mientras estaba tomando el tratamiento o cuando se había disminuido o interrumpido la medicación. BWSQ-2: evalúa los síntomas experimentados en las 2 últimas semanas por lo que es útil para determinar la incidencia de los síntomas durante la retirada.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

El cuestionario proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en cada uno de los ítems.

El rango posible de puntuación oscila entre 0 y 40. No existen puntos, de corte establecidos;

a mayor puntuación, mayor gravedad del síndrome de retirada.

© Psiquiatría Editores, S.L.

11. Instrumentos de evaluación de efectos adversos 143

11.2. Escala de Acatisia de Barnes (Barnes Akathisia Rating Scale, BAS, BARS)

Autor T. R. E. Barnes.

Referencia A rating scale for drug-induced akathisia. Br J Psychiatry 1989; 154: 672-676.

Evalúa Acatisia inducida por fármacos.

N.º de ítems 4.

Administración Heteroaplicada.

DESCRIPCIÓN

La BAS o BARS es una escala de 4 ítems que evalúa la presencia y gravedad de la acatisia inducida por fármacos.

Debe ser administrada por el clínico.

Es la escala más utilizada en los estudios para valorar la acatisia inducida por fármacos.

Incluye ítems objetivos y subjetivos, junto una evaluación clínica global de acatisia.

Las puntuaciones, para cada uno de los tres primeros ítems, oscilan de 0 (ausente) a 3 (acatisia grave).

El cuarto ítem es para calificar la gravedad global.

Para cada puntuación se proporcionan definiciones comprensivas.

Evalúa el estrés causado al paciente por un síntoma específico, no sólo el síntoma en sí mismo, puntuado utili-

zando la evaluación clínica global.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Las definiciones e instrucciones para las evaluaciones son fáciles de entender y las puntuaciones de gravedad están

bien delimitadas y son clínicamente relevantes.

Permite obtener una sola puntuación.

© Psiquiatría Editores, S.L.

144 Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica