

Test de Fagerström de Dependencia de la Nicotina (FTND) — versión española

Fagerström 1978/1991; adaptación española Carrasco et al. 1994; reproducción clínica Hospital Virgen de las Nieves

TEST DE FAGERSTRÖM DE DEPENDENCIA DE LA NICOTINA (FTND)

Fagerström KO (1978, revisado por Heatherton, Kozlowski, Frecker & Fagerström 1991). Adaptación/uso en español: Carrasco Gómez, Luna, Vila (1994), Rev Esp Drogodependencias; Córdoba et al. (2000), Aten Primaria. Fuente local de reproducción: hoja clínica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), Granada — recurso clínico de uso habitual en consulta de deshabituación tabáquica.

Población diana: población general fumadora. Escala heteroadministrada de 6 ítems.

1. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo?

Hasta 5 minutos = 3 puntos; Entre 6 y 30 minutos = 2; 31-60 minutos = 1; Más de 60 minutos = 0.

2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido, como la biblioteca o el cine?

Sí = 1; No = 0.

3. ¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar?

El primero de la mañana = 1; Cualquier otro = 0.

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma cada día?

10 o menos = 0; 11-20 = 1; 21-30 = 2; 31 o más = 3.

5. ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que durante el resto del día?

Sí = 1; No = 0.

6. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día?

Sí = 1; No = 0.

PUNTUACIÓN TOTAL: suma de los 6 ítems (rango 0-10). Puntos de corte: menos de 4 = dependencia baja; entre 4 y 7 = dependencia moderada; más de 7 = dependencia alta.

Bibliografía citada en la hoja clínica: Fagerström KO. Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. Addict Behav 1978;3(3-4):235-41. Carrasco TJ, Luna M, Vila J. Validez del Fagerström Tolerance Questionnaire como medida de dependencia física de la nicotina: una revisión. Rev Esp Drogodependencias 1994;19(1):3-14. Lee EW, D'Alonzo GE. Cigarette smoking, nicotine addiction, and its pharmacologic treatment. Arch Intern Med 1993;153(1):34-48. Córdoba R, Martín C, Casas R, Barbera C, Botaya M, Hernández A, Jané C. Valor de los cuestionarios breves en la predicción del abandono del tabaco en atención primaria. Aten Primaria 2000;25(1):32-6.

Nota de procedencia: este documento es una RECONSTRUCCIÓN TEXTUAL a partir de la fuente académica verificada citada en Fuente_y_uso.md (no es una copia escaneada de un binario del titular, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar). El texto fue transcrito íntegramente y cotejado con la fuente antes de su inclusión. Verificar siempre contra la fuente oficial antes de cualquier uso clínico o de investigación formal.