

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: BSL23

1. Identificación del Instrumento

Título original	Borderline Symptom List-23 (BSL-23)
Título español	Lista de Síntomas Borderline-23
Sigla	BSL-23
Autores originales	Martin Bohus, C. Schmahl et al.
Año original	2009
Adaptador español	Soler, Vega et al.
Año adaptación	2013
Formato	Cuestionario de autoinforme de 23 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El BSL-23 fue desarrollado a partir de la versión extensa de 95 ítems para medir específicamente la sintomatología y el malestar subjetivo experimentado por personas diagnosticadas con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), basándose en los criterios diagnósticos del DSM-IV.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar de forma rápida y sensible síntomas centrales y malestar en el TLP.
Población	Adolescentes y adultos con sospecha o diagnóstico de TLP.
Administración	Autoadministrado (aprox. 5 minutos).
Tiempo	Alrededor de 5 minutos.
Corrección	Media aritmética de todos los ítems puntuados (rango de 0 a 4).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Invertidos	Descripción
Síntomas Límite	Ítems 1 al 23	No	Evalúa el afecto negativo, la inestabilidad de la autoimagen, las conductas autodestructivas, la impulsividad y la disociación.
Escala Analógica (Suplemento)	Ítem 24 (Escala analógica visual)	No	Una escala adicional de 0 a 100 para evaluar el nivel de malestar global actual.

5. Sistema de Puntuación

Los 23 ítems se responden en una escala Likert de 5 puntos (0 = Para nada, 1 = Un poco, 2 = Moderadamente, 3 = Mucho, 4 = Extremadamente). La puntuación final es la media aritmética (suma total dividida por 23).

6. Interpretación de Resultados y Baremos

La puntuación final va de 0 a 4 puntos. Puntuaciones medias altas (> 1.5) indican una sintomatología límite severa y un malestar subjetivo elevado, siendo útil para monitorizar la respuesta al tratamiento psicoterapéutico (ej., Terapia Dialéctica Conductual).

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El BSL-23 posee excelentes coeficientes de consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0.94 a 0.96) y muestra una sensibilidad muy alta a los cambios clínicos durante el tratamiento psicológico.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La validación española realizada por Soler et al. (2013) ratificó la excelente consistencia interna, fiabilidad test-retest y adecuada validez convergente respecto a otras medidas de desregulación emocional.

9. Aplicaciones Prácticas

Psicología clínica, psiquiatría (monitoreo del TLP), investigación en psicoterapia y salud mental en general.

10. Fortalezas del Instrumento

- Altamente específico para TLP, a diferencia de los inventarios generales de personalidad.
- Excelente capacidad para reflejar el cambio terapéutico rápido a lo largo de las sesiones.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- No se recomienda como único criterio para realizar el diagnóstico diferencial primario del TLP.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Los resultados deben evaluarse con sensibilidad dada la alta presencia de reactivos sobre ideación autolítica y autolesiones.

13. Síntesis Técnica General

El BSL-23 es el cuestionario clínico abreviado de autoinforme de elección para el monitoreo evolutivo de los síntomas límbicos en el TLP.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Bohus, M., et al. (2009). Borderline Symptom List (BSL-23): development and psychometric properties. *Psychopathology*, 42(2), 127-135.
- Soler, J., et al. (2013). Validación de la versión española de la Borderline Symptom List (BSL-23). *Actas Esp Psiquiatr*, 41(3), 145-152.