

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: CESD

1. Identificación del Instrumento

Título original	Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D)
Título español	Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos
Sigla	CES-D
Autores originales	Laurie Radloff
Año original	1977
Adaptador español	Vázquez, Blanco et al. / Mariño et al. (América Latina)
Año adaptación	1997 / 2009
Formato	Cuestionario de autoinforme de 20 ítems de tipo Likert

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La escala CES-D fue diseñada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los EE.UU. (NIMH) para medir la prevalencia de la sintomatología depresiva y el estado de ánimo depresivo en población general mediante estudios epidemiológicos. A diferencia de otras escalas clínicas, minimiza los reactivos somáticos extremos.

3. Características Generales

Objetivo	Cribado y medición de la severidad del estado de ánimo depresivo.
Población	Población general y pacientes de atención primaria.
Administración	Autoadministrado (aprox. 5 minutos).
Tiempo	Estimado en 5 minutos.
Corrección	Suma de los 20 ítems tras invertir los correspondientes (rango 0 a 60).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión	Ítems	Invertidos	Descripción
Estado de Ánimo Depresivo	3, 6, 9, 10, 14, 17, 18	No	Evalúa sentimientos de tristeza, soledad, llanto e indefensión.
Afecto Positivo	4, 8, 12, 16	Sí	Mide el bienestar y optimismo general (ítems invertidos).
Síntomas Somáticos / Abulia	1, 2, 5, 7, 11, 20	No	Evalúa fatiga, problemas de sueño y abulia motora.
Relaciones Interpersonales	13, 15, 19	No	Evalúa la percepción de hostilidad o desinterés social.

5. Sistema de Puntuación

Los ítems se responden en función de la frecuencia durante la última semana de 0 (Rara vez) a 3 (La mayor parte del tiempo). Los **4 ítems de afecto positivo (4, 8, 12 y 16) son invertidos** y deben puntuarse al revés (3=0, 2=1, 1=2, 0=3) antes de la suma final.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

La puntuación oscila entre 0 y 60. Los puntos de corte recomendados en población general son:

* Menos de 16 puntos: Ausencia de sintomatología clínica depresiva.

* 16 o más puntos: Presencia de sintomatología depresiva clínicamente significativa (punto de corte estándar para sospecha de episodio depresivo).

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La escala CES-D demuestra una fiabilidad excepcional (Alfa de Cronbach > 0.85 en población comunitaria y > 0.90 en muestras clínicas), y una sensibilidad de hasta el 88% para diagnosticar trastornos depresivos.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Existen validaciones muy extensas en España, México, Colombia y Chile, habiéndose ajustado en algunos casos puntos de corte locales y mostrando propiedades psicométricas sobresalientes.

9. Aplicaciones Prácticas

Investigación epidemiológica de salud mental, medicina preventiva, atención primaria y gerontología.

10. Fortalezas del Instrumento

- Excelente para estudios poblacionales masivos.
- Permite desglosar afecto positivo e interpersonal por separado.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Es una medida de cribado sintomático, no establece un diagnóstico categorial formal de TDM por sí sola.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Se debe actuar éticamente si se detecta ideación autolítica implícita o severidad de puntuación en el cribado masivo.

13. Síntesis Técnica General

La CES-D es la herramienta epidemiológica clásica y de referencia para la medición del espectro depresivo y la salud pública.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement*, 1(3), 385-401.
- Vázquez, F. L., et al. (1997). Validation of the Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) in a Spanish sample. *Journal of Affective Disorders*, 44(2), 175-180.