

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: GAD7

1. Identificación del Instrumento

Título original	Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7)
Título español	Escala del Trastorno de Ansiedad Generalizada-7
Sigla	GAD-7
Autores originales	Robert L. Spitzer, K. Kroenke, J. B. W. Williams y B. Löwe
Año original	2006
Adaptador español	Asociación Española de Psiquiatría / MAPI
Año adaptación	2008
Formato	Cuestionario breve de autoinforme de 7 ítems de tipo Likert

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El GAD-7 se diseñó como un instrumento de cribado rápido y de autoinforme para identificar casos probables de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) en servicios de atención primaria y medir la gravedad de los síntomas ansiosos en general.

3. Características Generales

Objetivo	Tamizaje y medición de la gravedad del Trastorno de Ansiedad Generalizada.
Población	Adolescentes y adultos (12 años en adelante).
Administración	Autoadministrado (aprox. 1-2 minutos).
Tiempo	Menos de 2 minutos.
Corrección	Suma de las puntuaciones de los 7 ítems (rango total: 0 a 21).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Sintomatología Ansiosa	1 al 7	Evalúa tensión, preocupación excesiva, irritabilidad, dificultad para relajarse y miedo irracional.

5. Sistema de Puntuación

Los 7 ítems se responden evaluando la frecuencia en las últimas 2 semanas de 0 (Nunca) a 3 (Casi todos los días). Se suman los valores de los ítems para obtener una puntuación global de 0 a 21.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones de gravedad de la ansiedad se interpretan como:

- * 0 - 4 puntos: Ansiedad mínima.
- * 5 - 9 puntos: Ansiedad leve.
- * 10 - 14 puntos: Ansiedad moderada (punto de corte clínico recomendado para sospecha de TAG).
- * 15 - 21 puntos: Ansiedad grave.

Un reactivo adicional al final explora la interferencia funcional del paciente en la vida diaria.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El GAD-7 posee una excelente consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0.92) y una alta validez test-retest ($r = 0.83$). Su sensibilidad (89%) y especificidad (82%) para el diagnóstico de TAG son muy altas.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La versión oficial española cuenta con una enorme difusión institucional, mostrando propiedades psicométricas sobresalientes y equivalencia lingüística total.

9. Aplicaciones Prácticas

Medicina general de familia, atención de urgencias de psiquiatría, y monitoreo evolutivo de tratamientos de ansiedad.

10. Fortalezas del Instrumento

- Sumamente breve, directo y fácil de calificar en consulta rápida.
- Excelente sensibilidad predictiva.
- Incluye ítem de interferencia funcional.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- No diferencia con precisión entre TAG, trastorno de pánico o trastorno de ansiedad social, al medir la ansiedad de forma general.

12. Consideraciones Éticas y Legales

No debe utilizarse como diagnóstico exclusivo de TAG sin descartar causas médicas concurrentes.

13. Síntesis Técnica General

El GAD-7 es el estándar internacional de cribado clínico rápido para el Trastorno de Ansiedad Generalizada.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Spitzer, R. L., et al. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1092-1097.