

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: PANSS

1. Identificación del Instrumento

Título original	Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)
Título español	Escala de los Síndromes Positivo y Negativo de la Esquizofrenia
Sigla	PANSS
Autores originales	Stanley R. Kay, L. A. Opler y A. Fiszbein
Año original	1987
Adaptador español	Peralta y Cuesta / Lemos-Giráldez et al.
Año adaptación	1994 / 2004
Formato	Escala de valoración clínica (entrevista estructurada) de 30 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La PANSS fue diseñada para evaluar de manera integral los síntomas positivos, negativos y psicopatológicos generales en pacientes diagnosticados con trastornos del espectro esquizofrénico, superando las limitaciones de escalas unidimensionales previas como la BPRS.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar de forma cuantitativa la severidad de los síntomas de la esquizofrenia.
Población	Adultos diagnosticados con esquizofrenia o trastornos psicóticos.
Administración	Heteroadministrado por un clínico entrenado (aprox. 30-40 minutos).
Tiempo	Entrevista de 30 a 40 minutos + 10 minutos de corrección.
Corrección	Suma de los ítems de las 3 subescalas independientes.

4. Estructura y Dimensiones

Escala	Ítems	Descripción
Escala Positiva (P)	7 ítems (P1 al P7; delirios, alucinaciones, desorganización, etc.)	Mide el exceso o distorsión de funciones normales.
Escala Negativa (N)	7 ítems (N1 al N7; aplanamiento, abulia, retraimiento social, etc.)	Mide la pérdida o disminución de funciones normales.
Psicopatología General (G)	16 ítems (G1 al G16; ansiedad, depresión, tensión, etc.)	Evalúa síntomas emocionales, cognitivos y conductuales generales de la enfermedad.

5. Sistema de Puntuación

Cada ítem se valora de 1 (Ausente) a 7 (Extremo) según la gravedad clínica observada en la entrevista y la información familiar. Puntuación mínima total: 30; máxima: 210.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de forma independiente para cada una de las escalas (P, N, G). Se define clínicamente un predominio de síndrome positivo (si $P > N$) o síndrome negativo (si $N > P$), lo cual tiene importantes implicaciones pronósticas y de respuesta farmacológica.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La PANSS posee una consistencia interna sobresaliente (Alfa de Cronbach > 0.80 para las escalas P y N, y > 0.85 para la escala G) y una fiabilidad interjueces muy alta ($r > 0.88$).

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La adaptación en español por Peralta y Cuesta ha demostrado ser el estándar de evaluación en psiquiatría en el ámbito hispanohablante.

9. Aplicaciones Prácticas

Ensayos clínicos de antipsicóticos, unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos e investigación en psicosis.

10. Fortalezas del Instrumento

- Cubre exhaustivamente tanto síntomas positivos como negativos.
- Es el estándar metodológico internacional para estudios sobre esquizofrenia.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Requiere un riguroso entrenamiento interjueces y experiencia psiquiátrica clínica previa.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe administrarse garantizando la seguridad y dignidad del paciente, minimizando la fatiga en episodios agudos.

13. Síntesis Técnica General

La PANSS es el instrumento clínico de heteroevaluación de referencia definitiva a nivel mundial para el estudio y monitoreo de la esquizofrenia.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Kay, S. R., et al. (1987). The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 13(2), 261-276.
- Peralta, V., & Cuesta, M. J. (1994). Psychometric properties of the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) in a Spanish sample. *Psychiatry Research*, 53(1), 31-40.