

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: PCL5

1. Identificación del Instrumento

Título original	Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5)
Título español	Escala de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático para el DSM-5
Sigla	PCL-5
Autores originales	Frank W. Weathers, B. P. Marx et al. (National Center for PTSD)
Año original	2013
Adaptador español	National Center for PTSD / Validaciones clínicas de MAPI
Año adaptación	2015
Formato	Cuestionario de autoinforme de 20 ítems de tipo Likert

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El PCL-5 se diseñó para evaluar los 20 síntomas característicos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) de acuerdo con los criterios del DSM-5, los cuales se organizan en cuatro dimensiones sintomáticas diferenciadas.

3. Características Generales

Objetivo	Monitorear la severidad de los síntomas del TEPT y el cribado rápido.
Población	Adultos expuestos a traumas graves.
Administración	Autoadministrado (aprox. 5-10 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 5 a 10 minutos.
Corrección	Suma de los 20 ítems (rango total: 0 a 80).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión	Ítems	Descripción
Intrusión (Criterio B)	1 al 5	Evalúa recuerdos perturbadores, pesadillas y reactividad fisiológica al trauma.
Evitación (Criterio C)	6 al 7	Evalúa la evitación activa de recuerdos, pensamientos y estímulos externos.
Alteraciones en Cognición/Ánimo (Criterio D)	8 al 14	Mide amnesia lacunar, creencias negativas persistentes, culpa y anhedonia.
Hiperactivación y Reactividad (Criterio E)	15 al 20	Mide irritabilidad, hipervigilancia, respuesta de sobresalto e insomnio.

5. Sistema de Puntuación

Cada ítem se responde evaluando el nivel de malestar en el último mes de 0 (Nada en absoluto) a 4 (Extremadamente). Puntuación total: 0-80.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Una puntuación total entre **31 y 33 puntos** o más sugiere la presencia de un TEPT clínico significativo y justifica una evaluación detallada mediante entrevista CAPS-5.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El PCL-5 demuestra una consistencia interna sobresaliente (Alfa de Cronbach > 0.90) y una validez concurrente muy alta con entrevistas estructuradas.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La versión oficial española cuenta con el aval y distribución del National Center for PTSD, mostrando propiedades psicométricas robustas equivalentes al original.

9. Aplicaciones Prácticas

Investigación en trauma, clínicas especializadas en salud mental de adultos y psicología de emergencias.

10. Fortalezas del Instrumento

- Alineado perfectamente con el marco del DSM-5.
- Muy rápido de administrar frente a entrevistas clínicas.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Requiere un suceso traumático indexado previo como punto de referencia.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe evaluarse con precaución, proporcionando un canal de contención si el paciente presenta alto malestar por reviviscencia.

13. Síntesis Técnica General

El PCL-5 es la escala de autoinforme estandarizada definitiva para evaluar el TEPT de acuerdo al DSM-5.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Weathers, F. W., et al. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). National Center for PTSD. Available from www.ptsd.va.gov.