

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: PHQ15

1. Identificación del Instrumento

Título original	Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15)
Título español	Cuestionario de Salud del Paciente-15
Sigla	PHQ-15
Autores originales	Robert L. Spitzer, K. Kroenke, J. B. W. Williams et al.
Año original	2002
Adaptador español	Ros Montalbán, et al. (Estudio DEPRE-SOMA) / MAPI
Año adaptación	2010
Formato	Cuestionario de autoinforme de 15 ítems de tipo Likert

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El PHQ-15 es un cuestionario breve derivado de la evaluación PHQ para diagnosticar y cuantificar de manera rápida la gravedad de los síntomas somáticos del paciente, facilitando la detección de trastornos de somatización y quejas físicas sin causa orgánica.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar la gravedad del malestar asociado a síntomas somáticos físicos.
Población	Adultos en atención de medicina general y salud mental.
Administración	Autoadministrado (aprox. 2 minutos).
Tiempo	Menos de 3 minutos.
Corrección	Suma de los 15 ítems (rango total: 0 a 30).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Sintomatología Somática	Ítems 1 al 15	Evalúa molestias somáticas comunes (dolor de estómago, cabeza, espalda, disnea, mareos, etc.).

5. Sistema de Puntuación

Los ítems se valoran según las últimas 4 semanas en una escala de 0 (No le ha molestado nada) a 2 (Le ha molestado mucho). Los ítems 'problemas menstruales' se puntúan solo para mujeres y los ítems sobre el dolor se ponderan de manera unificada. Rango total: 0-30.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de la siguiente manera:

- * 0 - 4 puntos: Gravedad del síntoma somático mínima.
- * 5 - 9 puntos: Gravedad leve.
- * 10 - 14 puntos: Gravedad moderada.
- * 15 o más puntos: Gravedad severa (sugiere un trastorno de síntomas somáticos relevante).

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El PHQ-15 cuenta con una alta fiabilidad (Alfa de Cronbach de 0.80 a 0.85) y una fuerte validez de criterio para predecir la utilización de servicios de salud médica general.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La validación realizada por el estudio DEPRE-SOMA de Ros Montalbán et al. (2010) confirmó una alta fiabilidad y validez estructural para su uso en pacientes psiquiátricos españoles.

9. Aplicaciones Prácticas

Atención primaria, medicina psicosomática, consultas especializadas de dolor crónico y salud mental general.

10. Fortalezas del Instrumento

- Muy rápido y sencillo de corregir.
- Altamente sensible a la somatización secundaria en depresión y ansiedad.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Debe interpretarse descartando patologías médicas orgánicas subyacentes reales para evitar sesgos diagnósticos.

12. Consideraciones Éticas y Legales

No se debe invalidar la experiencia de dolor del paciente desestimando de entrada su malestar como 'puramente psicológico'.

13. Síntesis Técnica General

El PHQ-15 es el tamizaje estándar más utilizado en atención de medicina general para cuantificar la gravedad de los síntomas somáticos.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Kroenke, K., et al. (2002). The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating somatic symptom severity. *Psychosom Med*, 64(2), 258-266.
- Ros Montalbán, S., et al. (2010). Validación de la versión española del cuestionario PHQ-15. *Actas Esp Psiquiatr*, 38(6), 345-357.