

CUESTIONARIO DE SCREENING DE ANSIEDAD (ASQ-15)*Anxiety Screening Questionnaire (Wittchen et al., 1999) · Instituto Max Planck de Psiquiatría***Paciente / Código:****Edad:****Fecha:****Evaluador / Centro:****Sexo:** [] F [] M
Nº Historia / Cód:**Ámbito:** [] Primaria [] Especializada**INSTRUCCIONES:** Instrumento de cribado rápido en dos fases. **Ítems 1 a 7:** Exploración general de trastornos afectivos y de ansiedad. **Ítems 8 a 15:** Profundización en síntomas cardinales, incontrolabilidad, afectación somática y cronicidad del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Responda a cada pregunta marcando SÍ o NO.

Nº	Pregunta de Cribado Clínico de Ansiedad	SÍ	NO
1	Motivo de consulta principal: dolor somático, quejas emocionales o enfermedad física no aclarada.	()	()
2	En las últimas semanas, ¿ha padecido tristeza persistente, desánimo o pérdida marcada de energía? (Ánimo)	()	()
3	En las últimas 2 semanas, ¿ha experimentado ataques súbitos de miedo intenso, angustia o pánico? (Pánico)	()	()
4	En las últimas semanas, ¿ha experimentado fuertes temores irracionales en situaciones sociales o al hablar con otros? (Fobia Social)	()	()
5	En las últimas 2 semanas, ¿ha evitado o temido intensamente usar transportes públicos, tiendas o sitios concurridos? (Agorafobia)	()	()
6	En los últimos 2 meses, ¿ha padecido las secuelas de algún acontecimiento terrible o peligroso vivido? (TEPT)	()	()
7	En las últimas 4 semanas, ¿ha estado preocupado/a, tenso/a o ansioso/a la mayor parte del tiempo? (Ítem filtro TAG)	()	()
8	¿Estuvo ansioso/a o preocupado/a por asuntos cotidianos como tareas del hogar, economía o familia? (TAG)	()	()
9	¿Estuvo preocupándose de forma continua por su salud física o por padecer alguna enfermedad médica? (TAG)	()	()
10	¿Se preocupó de forma excesiva por otros asuntos de su vida diaria? (TAG)	()	()
11	¿Sintió que se preocupaba mucho más de lo que otras personas harían en su situación? (TAG)	()	()
12	¿Le resultó muy difícil o imposible dejar de preocuparse aunque lo intentó? (Incontrolabilidad TAG)	()	()
13	¿Sintió con frecuencia: inquietud, agotamiento, falta de concentración, irritabilidad, rigidez muscular o insomnio? (Somático TAG)	()	()
14	¿Interfirieron notablemente la ansiedad o preocupaciones en su trabajo, hogar o relaciones sociales? (Deterioro TAG)	()	()
15	¿El período de preocupación excesiva ha durado semanas, meses o más de 6 meses? (Cronología TAG)	()	()

NORMAS DE CORRECCIÓN, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y BAREMOS CLÍNICOS (ASQ-15)**Cribado de Trastornos de Ansiedad Específicos:**

Ítem 3 Afirmativo	Sospecha de Trastorno de Pánico
Ítem 4 Afirmativo	Sospecha de Fobia Social / Ansiedad Social
Ítem 5 Afirmativo	Sospecha de Agorafobia
Ítem 6 Afirmativo	Sospecha de TEPT postraumático
Ítems 2 y 7 Afirmativos	Comorbilidad Depresiva y Ansiosa

Criterios de Puntuación para Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG):

- **Criterio Diagnóstico de TAG Probable:** Se dictamina ante la concurrencia de:
 1. Respuesta afirmativa al **ítem 7** (Preocupación la mayor parte del tiempo).
 2. Al menos una respuesta afirmativa a los **ítems 8, 9 o 10** (Áreas de preocupación).
 3. Dificultad o incapacidad de control (**ítem 11 o 12 = SÍ**).
 4. Presencia de sintomatología somática de hiperactivación (**ítem 13 = SÍ**).
 5. Deterioro e interferencia funcional clínicamente significativa (**ítem 14 = SÍ**).
 6. Duración cronológica $\geq$ 6 meses (**ítem 15 = SÍ**).