

ESCALA BREVE DE ANSIEDAD DE TYRER (BSA)

Brief Scale for Anxiety — Evaluación Dimensional Breve y Sensible al Cambio

Peter Tyrer et al. (1984) • Subescala de Ansiedad de la CPRS

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada por el clínico. Valore la severidad de los síntomas durante la última semana puntuando de 0 a 6 (las anclas 0, 2, 4 y 6 están definidas; 1, 3 y 5 representan niveles intermedios):

0 = Ausente | 2 = Leve | 4 = Moderado | 6 = Grave / Extremo

Nº	Ítem / Definición Operativa del Síntoma	0	1	2	3	4	5	6
1	Tensión interna (Sentimientos de incomodidad, confusión interna o angustia. 0=Apacible, 2=Ocasional leve, 4=Continuo que controla con dificultad, 6=Terror incesante)							
2	Sentimientos de hostilidad (Ira, cólera y resentimiento. 0=No provocado, 2=Provocado fácilmente pero se disipa, 4=Ira excesiva, 6=Cólera persistente incontrolable)							
3	Hipocondriasis (Preocupación exagerada por padecer una enfermedad médica. 0=Ausente, 2=Presagios ante molestias leves, 4=Convencido pero admite calma breve, 6=Ideas absurdas e invalidantes)							
4	Preocupación por pequeñas cosas (Aprensión por rutinas cotidianas. 0=Ninguna, 2=Excesiva pero manejable, 4=Preocupación persistente por nimiedades, 6=Incesante, consuelo ineficaz)							
5	Fobias (Temor no razonable y evitación ante situaciones específicas. 0=Sin fobias, 2=Malestar vago dominable, 4=Malestar marcado con evitación, 6=Fobias incapacitantes que impiden salir)							
6	Sueño reducido (Reducción subjetiva del tiempo o calidad del sueño. 0=Como siempre, 2=Ligera dificultad, 4=Sueño reducido en al menos 2 horas, 6=Menos de 2-3 horas de sueño)							
7	Perturbación autonómica subjetiva (Palpitaciones, disnea, mareos, boca seca, sudor. 0=Ausente, 2=Ocasional bajo estrés, 4=Frecuente con incomodidad, 6=Muy frecuente e invalidante)							
8	Dolores corporales (Malestar corporal o cefaleas funcionales. 0=Ausentes o transitorios, 2=Ocasionales definidos, 4=Prolongados y molestos [pide analgésicos], 6=Muy intensos que interfieren)							
9	Alteraciones autonómicas observadas (Signos objetivos de disautonomía: sudor, rubor, temblor, hiperventilación. 0=No observadas, 2=Leves bajo estrés, 4=Obvias en varias ocasiones, 6=Interfieren con la sesión)							
10	Tensión muscular observada (Fascies tensa, mandíbula rígida, postura envarada. 0=Relajado, 2=Ligeramente tenso, 4=Moderadamente tenso en cuello/mandíbula, 6=Marcadamente envarado)							

INTERPRETACIÓN Y PUNTOS DE CORTE (Tyrer et al., 1984)

Puntuación Total (0 - 60 puntos):

- Suma de los 10 ítems evaluados.
- **0 - 9 puntos:** Normalidad / Ansiedad mínima.
- **10 - 19 puntos:** Ansiedad leve.
- **20 - 29 puntos:** Ansiedad moderada.
- **>= 30 puntos:** Ansiedad severa / extrema.

Dimensiones Clínicas:

- **Ansiedad Subjetiva (ítems 1 a 6):** Tensión interna, hostilidad, hipocondriasis, preocupaciones, fobias, sueño.
- **Ansiedad Somática y Observada (ítems 7 a 10):** Disautonomía referida, algias, disautonomía y rigidez objetiva durante la entrevista.