

ESCALA DE DEPRESIÓN DE CALGARY (CDS)

Calgary Depression Scale for Schizophrenia — Discriminación entre Depresión y Síntomas Negativos

Addington, Addington & Schissel (1990) • Adaptación española: Sarró et al. (2004)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluable: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada mediante entrevista clínica. Evalúa síntomas depresivos específicos en pacientes con esquizofrenia durante las últimas 2 semanas, sin confundirse con síntomas negativos o extrapiramidales:

0 = Ausente | 1 = Leve | 2 = Moderado | 3 = Grave

Nº	Ítem Clínico de la Escala de Calgary	0	1	2	3
1	Depresión (humor triste o deprimido en las 2 últimas semanas; 0=Ausente a 3=Grave diario >50% tiempo)				
2	Desesperanza (visión negativa del futuro y desánimo; 0=Ausente a 3=Grave desesperanza total)				
3	Autodesprecio (sentimientos de inferioridad o falta de autoestima; 0=Ausente a 3=Grave)				
4	Ideas de autorreferencia culpógenas (creencia de que la gente habla mal o censura; 0=Ausente a 3=Delirio)				
5	Culpabilidad patológica (remordimiento excesivo por hechos pasados; 0=Ausente a 3=Delirio de culpa)				
6	Depresión matutina (empeoramiento marcado del estado de ánimo por las mañanas; 0=Ausente a 3=Grave)				
7	Despertar precoz (despertarse antes de la hora habitual; 0=Normal a 3=Despierta >2h antes)				
8	Suicidio (ideas de muerte, deseos de morir o planes de autolisis; 0=Ausente a 3=Intento o plan firme)				
9	Depresión observada (tristeza deducida por expresión facial, llanto o voz; 0=Normal a 3=Llanto continuo)				

PUNTUACIÓN Y PUNTO DE CORTE EN ESQUIZOFRENIA (Addington et al., 1990)

Regla de Puntuación:

- Suma directa de los 9 ítems puntuados de 0 a 3.
- **Rango Total:** de **0 a 27 puntos**.
- Validez discriminante óptima frente a acinesia por antipsicóticos y aplanamiento afectivo esquizofrénico.

Punto de Corte Diagnóstico:

- **Puntuación Total > 6 puntos: Presencia de episodio depresivo mayor concomitante en la esquizofrenia** (sensibilidad 85%, especificidad 82%).
- Indicación formal para iniciar tratamiento antidepresivo coadyuvante.