

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ESCALA DE DEPRESIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale — CES-D)

Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale. *Appl Psychol Meas*, 1(3), 385-401. • Adaptación española validada.

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de sentimientos y conductas. Marque con una cruz con qué frecuencia se sintió de esta manera durante la última semana:

0 = Raras veces / Menos de 1 día | 1 = Poco o 1-2 días | 2 = Con frecuencia o 3-4 días | 3 = Casi siempre o 5-7 días

Nº	Durante la última semana:	0 < 1 día	1 1-2 días	2 3-4 días	3 5-7 días
1	Me molestaron cosas que habitualmente no suelen molestarme.	☐	☐	☐	☐
2	No tenía ganas de comer; tenía poco apetito.	☐	☐	☐	☐
3	Sentí que no podía quitarme de encima la tristeza ni con el apoyo de mi familia o amigos.	☐	☐	☐	☐
4	Sentí que era tan valioso(a) como cualquier otra persona. (Inverso)	☐	☐	☐	☐
5	Tuve dificultades para concentrarme en lo que estaba haciendo.	☐	☐	☐	☐
6	Me sentí deprimido(a).	☐	☐	☐	☐
7	Sentí que todo lo que hacía requería un gran esfuerzo.	☐	☐	☐	☐
8	Me sentí con esperanzas acerca del futuro. (Inverso)	☐	☐	☐	☐
9	Pensé que mi vida había sido un fracaso.	☐	☐	☐	☐
10	Sentí temor o miedo.	☐	☐	☐	☐
11	Mi sueño no fue reparador o dormí mal.	☐	☐	☐	☐
12	Estuve feliz. (Inverso)	☐	☐	☐	☐
13	Hablé menos de lo acostumbrado.	☐	☐	☐	☐
14	Me sentí solo(a).	☐	☐	☐	☐
15	La gente no fue amistosa conmigo.	☐	☐	☐	☐
16	Disfruté de la vida. (Inverso)	☐	☐	☐	☐
17	Tuve momentos de llanto.	☐	☐	☐	☐
18	Me sentí triste.	☐	☐	☐	☐
19	Sentí que no le caía bien a la gente.	☐	☐	☐	☐
20	Sentí que no tenía ganas de hacer nada.	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 0 a 60 puntos):

• **Ítems invertidos (en verde):** Los ítems 4, 8, 12 y 16 se puntúan de forma inversa: 0=3, 1=2, 2=1, 3=0. • **Punto de corte clásico:** Puntuación total *ge*16 puntos sugiere riesgo o presencia de sintomatología depresiva clínicamente significativa. • **Severidad sugerida:** 0-15 Depresión ausente o subclínica; 16-21 Depresión leve a moderada; *ge*22 Depresión clínicamente relevante / severa.

psico-flujo · Instrumento epidemiológico de acceso abierto (Radloff, 1977). Formato tipográfico institucional.