

ÍNDICE GLOBAL DE DUKE PARA EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (DGRP)

Duke Global Rating Scale for PTSD — Impresión Clínica Global de Cambio en TEPT

Jonathan R. T. Davidson et al. (1998) • Duke University Medical Center

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada por el facultativo. Estime el cambio experimentado por el paciente en cada componente respecto al inicio del tratamiento puntuando de 1 a 7:

1 = Muchísimo mejor | 2 = Mucho mejor | 3 = Algo mejor | 4 = Sin cambios | 5 = Algo peor | 6 = Mucho peor | 7 = Muchísimo peor

Nº	Componente Clínico de TEPT Evaluado	1	2	3	4	5	6	7
1	Componente intrusivo (sueños, pesadillas, imágenes, reviviscencias, malestar por recuerdos del trauma)							
2	Componente evitativo y paralizante (evitación de situaciones, aislamiento social, desapego, amnesia)							
3	Componente de hiperactivación (sobresalto, hiperalerta, concentración deteriorada, insomnio, irritabilidad)							
4	Cambio global total en el cuadro de TEPT del paciente							

INTERPRETACIÓN DEL CAMBIO CLÍNICO GLOBAL

Criterio Estándar de Respuesta:

- Se define respuesta clínica favorable si el ítem 4 (Cambio Global) se califica con **1 (Muchísimo mejor)** o **2 (Mucho mejor)**.
- Puntuación 3 (Algo mejor) indica respuesta parcial.

Monitorización por Dominios:

- Permite detectar respuestas disociadas (p. ej. reducción del sobresalto con persistencia de conductas evitativas).
- Puntuaciones de 5 a 7 señalan deterioro o reactivación sintomática.