

DIARIO DEL PACIENTE: TRASTORNO DE PÁNICO Y AGORAFOBIA Panic Attack Record (Barlow & Craske) · Registro Clínico Diario de Crisis de Angustia y Ansiedad Anticipatoria

Paciente / Código:	Edad:	Fecha de registro:
Terapeuta / Centro:	Sexo: ☐ F ☐ M Día de la semana: ☐ L ☐ M ☐ X ☐ J ☐ V ☐ S Semana de tto.: ☐ D	

INSTRUCCIONES: Cumplimente cada noche antes de dormir. Si ha presentado crisis de angustia durante la jornada, registre su duración, intensidad (0-10) y marque los síntomas experimentados según la lista DSM-5: **Síntomas (1 a 13):** 1. Palpitaciones/Taquicardia | 2. Sudoración | 3. Temblores | 4. Falta de aire/Disnea | 5. Opresión torácica | 6. Náuseas/Malestar digestivo | 7. Mareo/Inestabilidad | 8. Desrealización/Despersonalización | 9. Miedo a perder el control/enloquecer | 10. Miedo a morir | 11. Parestesias (hormigueo) | 12. Escalofríos o sofocos | 13. Sensación de asfixia/Atragantamiento.

Nº	Parámetro Clínico Diario / Crisis de Angustia	Anotación y Registro del Paciente
1	Ansiedad anticipatoria (% del día preocupado/a por la posibilidad de sufrir un ataque)	% del tiempo vigil
2	Intensidad máxima del temor/preocupación a lo largo de la jornada (escala analógica 0 a 10)	Puntuación (0-10):
3	¿Experimentó hoy algún ataque de pánico o crisis súbita de angustia?	☐ SÍ ☐ NO
4	Crisis 1: Hora: _____ · Duración: _____ min · Intensidad (0-10): _____ Tipo: ☐ Inesperado ☐ Situacional · Síntomas (1 al 13): _____	Síntomas: _____
5	Crisis 2: Hora: _____ · Duración: _____ min · Intensidad (0-10): _____ Tipo: ☐ Inesperado ☐ Situacional · Síntomas (1 al 13): _____	Síntomas: _____
6	Crisis 3: Hora: _____ · Duración: _____ min · Intensidad (0-10): _____ Tipo: ☐ Inesperado ☐ Situacional · Síntomas (1 al 13): _____	Síntomas: _____
7	Medicación de rescate utilizada durante el día (fármaco ansiolítico y dosis tomada)	Fármaco/Dosis: _____
8	Conductas de evitación agorafóbica o situaciones que no pudo afrontar en el día	Evitaciones: _____

NORMAS DE CORRECCIÓN, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y MONITORIZACIÓN CLÍNICA	
Criterios de Puntuación y Clasificación de Crisis: • Ataque de Pánico Completo: Inicio súbito con pico < 10 minutos y presencia de ≥ 4 de los 13 síntomas somáticos/cognitivos. • Ataque de Síntomas Limitados: Crisis brusca con malestar agudo pero con < 4 síntomas nucleares. • Frecuencia Semanal: Suma de ataques completos registrados en los 7 días. • Intensidad Media: Promedio aritmético diario de severidad (0-10).	Baremos y Objetivos Terapéuticos (Barlow & Craske): • Criterio de Remisión Completa: 0 ataques de pánico completos y síntomas limitados a lo largo de 4 semanas consecutivas. • Reducción de Ansiedad Anticipatoria: Descenso sostenido por debajo del 10% del tiempo vigil diario. • Abandono de Medicación de Rescate: Eliminación gradual de benzodiacepinas a demanda ante la adquisición de habilidades de tolerancia interoceptiva.