

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ESCALA DIMENSIONAL OBSESIVO-COMPULSIVA

(Dimensional Obsessive-Compulsive Scale — DOCS)

Abramowitz et al. (2010). Adaptación española: López-Roig et al. Evaluación de 4 dimensiones sintomáticas (0–80 pts).

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

Instrucciones: Este cuestionario evalúa 4 dimensiones de preocupaciones y conductas obsesivo-compulsivas. En cada dimensión, lea la descripción clínica y califique de **0 a 4** los 5 parámetros de severidad durante el **último mes**: **P1 (Tiempo)**: 0=Ninguno, 1 = menos de 1 h/día, 2=1-3 h/día, 3=3-8 h/día, 4 = más de 8 h/día | **P2 (Evitación)**: 0=Ninguna, 1=Mínima, 2=Moderada, 3=Mucha, 4=Extrema / casi todo | **P3 (Malestar)**: 0=Ninguno, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Severo, 4=Extremo / incapacitante | **P4 (Interferencia)**: 0=Ninguna, 1=Leve, 2=Moderada, 3=Severa, 4=Incapacidad total | **P5 (Dificultad de resistencia / control)**: 0=Control completo, 1=Poca dificultad, 2=Dificultad moderada, 3=Mucha dificultad, 4=Incapaz de resistirse

DIMENSIÓN 1: Preocupaciones por Contaminación y Conductas de Lavado / Desinfección *Miedo a gérmenes, bacterias, virus, fluidos corporales, químicos, suciedad o radiación. Conductas de lavado repetitivo de manos, duchas prolongadas, limpieza exhaustiva de objetos y ropa, o evitación de baños públicos, transportes o contacto físico.*

Parámetro Clínico Evaluado	0	1	2	3	4
1. Tiempo dedicado al día en pensamientos y rituales de contaminación / limpieza.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Grado de evitación de objetos, lugares, personas o situaciones contaminantes.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Malestar, ansiedad o angustia asociada a la contaminación o imposibilidad de lavar.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Interferencia en trabajo, estudios, vida social, familiar y rutinas diarias.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Dificultad para resistir la urgencia de lavarse o descartar las ideas contaminantes.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal Dimensión 1 (0–20):

DIMENSIÓN 2: Responsabilidad por Daño, Desgracias o Catástrofes y Comprobaciones *Miedo a ser responsable de accidentes, incendios, robos o desgracias a otros por descuido o error. Dudas recurrentes. Rituales de comprobación repetitiva de cerraduras, estufas, llaves de gas/agua, interruptores, enchufes o desandar caminos.*

Parámetro Clínico Evaluado	0	1	2	3	4
1. Tiempo dedicado al día en dudas sobre posibles daños y rituales de comprobación.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Grado de evitación de responsabilidades, tareas de cierre, conducción o herramientas.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Malestar o ansiedad generada ante la duda de si causó o previno un desastre/accidente.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Interferencia de las dudas y comprobaciones en el rendimiento diario y tiempos.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Dificultad para resistir la urgencia de verificar o comprobar una y otra vez.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal Dimensión 2 (0–20):

DIMENSIÓN 3: Pensamientos Inaceptables / Tabú (Agresivos, Sexuales, Religiosos) y Rituales Mentales *Pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos e involuntarios sobre violencia, hacer daño a seres queridos, blasfemias, conductas inmorales o actos sexuales prohibidos que causan repugnancia. Rituales mentales de neutralización, oraciones repetitivas, conteo o palabras tranquilizadoras.*

Parámetro Clínico Evaluado	0	1	2	3	4
1. Tiempo diario ocupado por pensamientos tabú y neutralizaciones / rezos mentales.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Grado de evitación de estímulos asociados (cuchillos, niños, personas, iglesias, etc.).	☐	☐	☐	☐	☐
3. Nivel de culpa, repugnancia, ansiedad o malestar causado por las intrusiones.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Interferencia cognitiva en concentración, relaciones afectivas y funcionamiento.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Dificultad para descartar los pensamientos o resistir los rituales neutralizadores.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal Dimensión 3 (0-20):

DIMENSIÓN 4: Simetría, Orden, Exactitud y Sensación de Incompletud («Just Right») *Necesidad apremiante de que las cosas estén perfectamente simétricas, alineadas, ordenadas o emparejadas. Sensación de que algo «no está del todo bien». Rituales de ordenar, colocar en secuencias específicas, tocar objetos de forma equilibrada o repetir conductas motoras.*

Parámetro Clínico Evaluado	0	1	2	3	4
1. Tiempo dedicado al día en ordenar, alinear, equilibrar y repetir acciones motoras.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Grado de evitación de tocar o utilizar cosas desordenadas o asimétricas.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Malestar subjetivo, inquietud o tensión ante el desorden o la falta de simetría.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Interferencia por lentitud excesiva y repeticiones en el cumplimiento de tareas.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Dificultad para resistir el impulso de reordenar o rehacer hasta sentirlo perfecto.	☐	☐	☐	☐	☐

Subtotal Dimensión 4 (0-20):

Resumen Dimensional (0-20 c/u): - Dim. 1 (Contaminación): - Dim. 2 (Responsabilidad / Daño): - Dim. 3 (Pensamientos Tabú): - Dim. 4 (Simetría / Just Right):

Puntuación Global DOCS: Suma directa de las 4 dimensiones.

Total Global (0-80):

Criterios Clinimétricos y Puntos de Corte: - < 18 puntos: Rango subclínico / población no clínica. - 18 – 27 puntos: TOC Leve - Moderado (**corte de significación clínica >= 18**). - 28 – 42 puntos: TOC Severo. Afectación marcada en múltiples dominios vitales. - 43 – 80 puntos: TOC Extremo / Gravemente incapacitante.

La DOCS permite un perfil dimensional independiente para guiar exposición y respuesta ritual.