

ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS DEL TEPT - REVISADA (EGS-R)

Protocolo Clínico de Gravedad y Diagnóstico Categorical según DSM-5 — 21 Reactivos

E. Echeburúa, P. J. Amor, B. Sarasua, I. Zubizarreta, F. P. Holgado-Tello & J. M. Muñoz (2016) • Eje I: Trastornos Clínicos

Paciente / Código:	Edad:	Sexo: ☐ M ☐ F	Fecha:
Evaluador/a:	N.º Historia:	Trauma Índice:	Tiempo tras suceso:

CONSIGNA E INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE: A continuación se presenta una lista de síntomas y dificultades que las personas pueden experimentar después de haber vivido o presenciado un acontecimiento altamente estresante o traumático. Por favor, indique con qué frecuencia e intensidad ha experimentado cada síntoma durante el **último mes** en relación al suceso índice:

0 = Nada (no ha ocurrido) • **1 = Leve** (1 vez por semana o de intensidad ligera) • **2 = Moderado** (2 a 4 veces por semana o malestar evidente) • **3 = Grave** (5 o más veces por semana o intensidad invalidante).

N.º	Síntoma Postraumático Evaluado (Último Mes)	Criterio DSM-5	Gravedad (0-3)
1	Recuerdos desagradables, recurrentes e involuntarios del suceso traumático.	B: Intrusión	0 1 2 3
2	Sueños angustiosos o pesadillas recurrentes relacionados con el suceso.	B: Intrusión	0 1 2 3
3	Reacciones disociativas (flashbacks) en las que siente o actúa como si el suceso se repitiera.	B: Intrusión	0 1 2 3
4	Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a estímulos que recuerdan el hecho.	B: Intrusión	0 1 2 3
5	Reacciones fisiológicas notables (taquicardia, sudoración) ante recuerdos del trauma.	B: Intrusión	0 1 2 3
6	Evitación o esfuerzos para evitar pensamientos, recuerdos o sentimientos sobre el suceso.	C: Evitación	0 1 2 3
7	Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, objetos).	C: Evitación	0 1 2 3
8	Incapacidad para recordar partes importantes del suceso (amnesia disociativa, no por tóxicos).	D: Cognición	0 1 2 3
9	Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, otros o el mundo.	D: Cognición	0 1 2 3
10	Pensamientos distorsionados sobre la causa del hecho que llevan a culparse a sí mismo o a otros.	D: Cognición	0 1 2 3
11	Estado emocional negativo constante (miedo, terror, ira, culpa o vergüenza recurrente).	D: Ánimo Negativo	0 1 2 3
12	Disminución acusada del interés o participación en actividades cotidianas significativas.	D: Anhedonia	0 1 2 3
13	Sentimiento de desapego, frialdad o distanciamiento en las relaciones con los demás.	D: Desapego	0 1 2 3
14	Incapacidad persistente para sentir emociones positivas (afecto, satisfacción, alegría).	D: Afecto Positivo	0 1 2 3
15	Comportamiento irritable y accesos de cólera expresados típicamente como agresión verbal o física.	E: Alerta/Ira	0 1 2 3
16	Conducta imprudente o autodestructiva (conducción temeraria, consumo de tóxicos).	E: Conducta	0 1 2 3
17	Hipervigilancia y sensación continua de amenaza o estar en guardia.	E: Hipervigilancia	0 1 2 3
18	Respuesta de sobresalto o alarma exagerada ante estímulos inesperados.	E: Sobresalto	0 1 2 3
19	Dificultades notables de concentración en tareas cotidianas o laborales.	E: Concentración	0 1 2 3
20	Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sueño inquieto).	E: Insomnio	0 1 2 3
21	Sensación de extrañeza sobre uno mismo (despersonalización) o sentir el entorno irreal/soñado (desrealización).	Esp. Disociativo	0 1 2 3

Criterio F: Deterioro Funcional	Malestar Subjetivo Global	Área Laboral / Académica	Área Social y Familiar
¿Genera interferencia clínicamente significativa?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA (Echeburúa et al., 2016):

- **Presencia de Síntoma:** Un reactivo se considera clínicamente presente si se califica con puntuación ≥ 2 * (moderado o grave).
- **Puntuación de Gravedad Global (Ítems 1 al 20):** Suma directa de las puntuaciones (Rango: **0 a 60 puntos**).
 - **0 a 14 puntos:** Mínimo / No caso
 - **15 a 18 puntos:** Sintomatología postraumática subclínica.
 - **19 a 34 puntos:** **TEPT Clínico Moderado** (Punto de corte diagnóstico validado en España; Sensibilidad 89%, Especificidad 89%).
 - **35 a 60 puntos:** **TEPT Grave / Invalidante** con alta probabilidad de comorbilidad afectiva y necesidad de intervención intensiva.
- **Criterio Diagnóstico Categorical DSM-5:** Requiere cumplir simultáneamente: Criterio B (≥ 1 síntoma en ítems 1-5); Criterio C (≥ 1 síntoma en ítems 6-7); Criterio D (≥ 2 síntomas en ítems 8-14); Criterio E (≥ 2 síntomas en ítems 15-20); Criterio F (interferencia funcional afirmativa); y duración de síntomas superior a 1 mes.
- **Especificador con Síntomas Disociativos:** Se confirma si el **Ítem 21** es ≥ 2 * (presencia de despersonalización o desrealización).