

ESCALA DE INTENSIDAD DE LA DEPENDENCIA AL ALCOHOL (EIDA)

Adaptación Española del SADQ para la Evaluación Cuantitativa de la Dependencia

Rodríguez-Martos et al. (1986) • Cuestionario autoaplicado de 30 ítems

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Indique la frecuencia de presentación de cada manifestación en el período de consumo más alto en los últimos 6 meses marcando de 0 a 3 (0=Nunca, 1=A veces, 2=Frecuentemente, 3=Casi siempre):

0 = Nunca o casi nunca | 1 = A veces | 2 = Frecuentemente | 3 = Casi siempre

Nº	Manifestación / Síntoma de Dependencia	0 Nunc	1 Veces	2 Frec	3 Siemp
A. Durante el período de mayor consumo (últimos 6 meses)					
1	Me despertaba sudando				
2	Me temblaban las manos a primera hora de la mañana				
3	Tenía náuseas a primera hora de la mañana				
4	Todo mi cuerpo temblaba violentamente si no bebía algo				
5	Me despertaba completamente bañado en sudor				
6	Temía que llegase la hora de levantarme				
7	Temía encontrarme con alguien a primera hora de la mañana				
8	Me sentía próximo a la desesperación al despertarme				
9	Me sentía muy nervioso al despertarme				
10	Me sentía asustado al despertarme				
11	Me gustaba beber alcohol por la mañana				
12	Tenía ganas de beber alcohol al despertarme				
13	Me tomaba lo antes posible y de un trago las primeras copas				
14	Bebía por la mañana para calmar los temblores				
15	Sentía una fuerte necesidad de beber alcohol al despertarme				

Nº	Manifestación / Síntoma de Dependencia (continuación)	0 Nunc	1 Veces	2 Frec	3 Siemp
16	Bebía más de 4 copas de licor al día (o 1 botella de vino / 8 cañas)				
17	Bebía más de 8 copas de licor al día (o 2 botellas de vino / 16 cañas)				
18	Bebía más de 16 copas de licor al día (o 3.5 botellas de vino / 32 cañas)				
19	Bebía más de 32 copas de licor al día (o 7 botellas de vino / 64 cañas)				
20	Llegaba a beber en menos de 1 hora 8 copas de licor				
21	Después de haber tomado algunas copas me apetecía seguir bebiendo				
22	Cuando comenzaba a beber me resultaba muy difícil parar				
23	No bebía alcohol hasta después de haber finalizado mis tareas				
24	Si bebía alcohol, no sobrepasaba el límite que me había propuesto				
25	Había días en los que conseguía no beber nada				
B. Reinstalación rápida tras recaída de 2 días posterior a abstinencia					
26	Por la mañana comenzaría a sudar				
27	Tendría temblor en las manos				
28	Tendría náuseas				
29	Mi cuerpo temblaría violentamente				
30	Mis deseos por beber alcohol serían intensos				

PUNTUACIÓN Y PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS (Rodríguez-Martos et al., 1986)**Regla de Corrección:**

- Ítems directos puntuados de 0 a 3.
- Ítems inversos (**23, 24 y 25**): Se invierten (**0=3, 1=2, 2=1, 3=0**).
- **Puntuación Total**: Suma de los 30 ítems (rango: **0 a 90 puntos**).

Interpretación Diagnóstica:

- **< 20 puntos**: Dependencia leve o consumo de bajo riesgo.
- **20 - 39 puntos**: Dependencia alcohólica moderada.
- **≥ 40 puntos**: **Dependencia alcohólica grave**; requiere programa integral de desintoxicación y deshabituación.