

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE PLUTCHIK (EI)

Plutchik's Impulsivity Scale — Autoinforme de 15 Ítems
Plutchik & van Praag (1989) • Adaptación española: Rubio et al. (1998)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Por favor, lea cada afirmación cuidadosamente e indique con qué frecuencia le ocurren las siguientes situaciones, marcando con una cruz (X) en la columna correspondiente:

0 = Nunca | 1 = A veces | 2 = A menudo | 3 = Casi siempre

Nº	Pregunta / Situación	0	1	2	3
1	¿Le resulta difícil esperar en una cola?				
2	¿Hace cosas impulsivamente?				
3	¿Gasta dinero impulsivamente?				
4*	¿Planea cosas con anticipación? (*)				
5	¿Pierde la paciencia a menudo?				
6*	¿Le resulta fácil concentrarse? (*)				
7	¿Le resulta difícil controlar los impulsos sexuales?				
8	¿Dice usted lo primero que le viene a la cabeza?				
9	¿Acostumbra a comer aun cuando no tenga hambre?				
10	¿Es usted impulsivo/a?				
11*	¿Termina las cosas que empieza? (*)				
12	¿Le resulta difícil controlar las emociones?				
13	¿Se distrae fácilmente?				
14	¿Le resulta difícil quedarse quieto/a?				
15*	¿Es usted cuidadoso/a o cauteloso/a? (*)				

CORRECCIÓN, PUNTOS DE CORTE E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rubio et al., 1998)

Regla de Puntuación:

- **11 Ítems Directos:** Se puntúan de **0 a 3** según la columna (Nunca=0, A veces=1, A menudo=2, Casi siempre=3).
- **4 Ítems Inversos (*):** Se puntúan a la inversa (**0=3, 1=2, 2=1, 3=0**):
(Ítems: 4, 6, 11 y 15).
- **Puntuación Total:** Suma de los 15 ítems (rango: **0 a 45 puntos**).

Puntos de Corte (Adaptación Española):

- **< 20 puntos:** Rango no clínico / Impulsividad normal.
- **≥ 20 puntos:** Impulsividad elevada / rasgo impulsivo clínicamente relevante.

Alerta clínica: Puntuaciones *ge20* correlacionan fuertemente con riesgo de abuso de sustancias, trastornos de la personalidad del grupo B y conducta autolesiva/ suicida.