

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ESCALA DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

(Generalized Anxiety Disorder 7-item Scale — GAD-7)

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. *Arch Intern Med*, 166(10), 1092-1097. • Adaptación española: García-Campayo et al. (2010).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido molestias debido a los siguientes problemas? Marque con una cruz su respuesta.

0 = Para nada / Ningún día | 1 = Varios días | 2 = Más de la mitad de los días | 3 = Casi todos los días

Nº	Durante las últimas 2 semanas, síntomas:	0 Ningún día	1 Varios días	2 > mitad días	3 Casi a diario
1	Sentirse nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta.	☐	☐	☐	☐
2	No poder parar o controlar sus preocupaciones.	☐	☐	☐	☐
3	Preocuparse demasiado por diferentes motivos o situaciones.	☐	☐	☐	☐
4	Dificultades notorias para relajarse.	☐	☐	☐	☐
5	Estar tan inquieto(a) que le resulta difícil permanecer quieto(a).	☐	☐	☐	☐
6	Sentirse fácilmente irritado(a), molesto(a) o de mal humor.	☐	☐	☐	☐
7	Sentir miedo o temor como si algo terrible fuera a suceder.	☐	☐	☐	☐

Ítem de impacto funcional: Si marcó cualquiera de los problemas anteriores, ¿qué tanta dificultad le han causado para hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar o llevarse bien con los demás?

☐ Ninguna dificultad ☐ Un poco de dificultad ☐ Mucha dificultad ☐ Extrema dificultad

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Puntuación total de 0 a 21 puntos):

• **0–4:** Ansiedad mínima o ausente. • **5–9:** Ansiedad leve (evaluar contexto y realizar monitoreo periódico). • **10–14:** Ansiedad moderada (punto de corte *ge*10 recomendado para sospecha clínica de TAG; sensibilidad 89%, especificidad 82%). • **15–21:** Ansiedad severa (indicación prioritaria de intervención clínica/psicoterapéutica estructurada).