

ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD (HARS)

Hamilton Anxiety Rating Scale — Evaluación de la Gravedad de la Ansiedad
Max Hamilton (1959) • Versión española validada por Bulbena et al.

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:
Heteroaplicada mediante entrevista clínica. Evalúe la intensidad y frecuencia de cada síntoma durante la última semana puntuando de 0 a 4:

0 = Ausente | 1 = Leve | 2 = Moderado | 3 = Grave | 4 = Muy grave / Incapacitante

Nº	Ítem / Definición Operativa del Síntoma	0	1	2	3	4
1	Humor ansioso: Inquietud, espera de lo peor, aprensión (anticipación temerosa), irritabilidad.					
2	Tensión: Sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarse, llanto fácil, temblor, inquietud psicomotriz.					
3	Miedos: A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los animales grandes, a las multitudes, al tráfico.					
4	Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, cansancio al despertar, pesadillas o terrores nocturnos.					
5	Funciones intelectuales: Dificultad de concentración, mala memoria, quejas de rendimiento cognitivo.					
6	Humor deprimido: Falta de interés, anhedonia, tristeza, despertar precoz, variaciones diurnas del estado de ánimo.					
7	Síntomas somáticos musculares: Dolores y molestias musculares, rigidez, mioclonías, bruxismo, voz temblorosa o poco firme.					
8	Síntomas somáticos sensoriales: Zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos o escalofríos, debilidad, parestesias/hormigueos.					
9	Síntomas cardiovasculares: Taquicardia, palpitaciones, opresión o dolor precordial, latidos vasculares perceptibles, extrasístoles.					
10	Síntomas respiratorios: Sensación de constricción u opresión torácica, sensación de ahogo, suspiros frecuentes, disnea suspirosa.					
11	Síntomas gastrointestinales: Disfagia, meteorismo, dispepsia, dolor posprandial, ardor, distensión, náuseas, vómitos, diarrea.					
12	Síntomas genitourinarios: Micciones frecuentes, tenesmo miccional, disfunción eréctil, disminución de libido, alteraciones menstruales.					
13	Síntomas autonómicos: Sequedad bucal, accesos de enrojecimiento o palidez, sudoración profusa, mareos, cefalea tensional.					
14	Comportamiento durante la entrevista: Postura tensa, temblor fino, ceño fruncido, agitación de manos, respiración jadeante, taquipnea.					

PUNTUACIÓN TOTAL, SUBESCALAS Y PUNTOS DE CORTE (Hamilton, 1959)

Puntuación Global (0 - 56 puntos):

- 0 - 13 puntos: Normalidad / Ansiedad clínicamente no significativa.
- 14 - 17 puntos: Ansiedad leve.
- 18 - 24 puntos: Ansiedad moderada.
- 25 - 30 puntos: Ansiedad grave.
- >= 31 puntos: Ansiedad muy grave o incapacitante.

Subescalas y Monitorización Clínica:

- **Ansiedad Psíquica (ítems 1 a 6 y 14):** Tensión mental, temores, insomnio, humor.
- **Ansiedad Somática (ítems 7 a 13):** Síntomas musculares, sensoriales, viscerales y autonómicos.
- **Respuesta terapéutica:** Reducción ≥ 50% de la puntuación basal. Remisión: ≤ 7 puntos.