

ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESIÓN (HDRS-17)

Hamilton Depression Rating Scale — Patrón Oro de Evaluación Heteroaplicada de 17 Ítems

Hamilton (1960, 1967) • Adaptación española validada (Bobes et al., Ramos-Brieva et al.)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada mediante entrevista clínica. Valore el estado del paciente en los últimos días puntuando de 0 a 4 (o de 0 a 2 según el ítem):

Ítems evaluados de 0 a 4 (8 ítems) o de 0 a 2 (9 ítems) | Rango Total: 0 a 52 puntos

Nº	Ítem Clínico de Evaluación (HDRS-17)	0	1	2	3	4
1	Humor deprimido (tristeza, desesperanza, desamparo, inutilidad) 0=Ausente, 1=Al preguntar, 2=Espontáneo, 3=No verbal (gesto/lanto), 4=Espontáneo verbal/no verbal					
2	Sentimientos de culpabilidad (autoacusación, errores pasados, castigo) 0=Ausente, 1=Se culpa/decepciona, 2=Ideas culpa, 3=Enfermedad es castigo, 4=Alucinaciones/delirios					
3	Suicidio (ideas de muerte, deseos de no vivir, intentos) 0=Ausente, 1=Vida no vale la pena, 2=Deseo de morir, 3=Ideas/amenazas, 4=Tentativas suicidas					
4	Insomnio precoz (dificultad para conciliar el sueño) 0=Ausente, 1=Ocasional (>30 min), 2=Cada noche					
5	Insomnio medio (despertares a medianoche y dificultad para dormir) 0=Ausente, 1=Se despierta a medianoche, 2=Despierto durante la noche / se levanta					
6	Insomnio tardío / tardo (despertar precoz matutino definitivo) 0=Ausente, 1=Se despierta temprano pero vuelve a dormir, 2=Despertar precoz definitivo					
7	Trabajo y actividades (incapacidad, pérdida de interés o productividad) 0=Normal, 1=Fatiga/debilidad, 2=Pérdida de interés, 3=Disminución rendimiento, 4=Dejó de trabajar					
8	Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento, habla y actividad motora) 0=Normal, 1=Ligero retraso, 2=Retraso evidente en diálogo, 3=Entrevista difícil, 4=Estupor completo					
9	Agitación psicomotora (inquietud motora, incapacidad de estar quieto) 0=Ninguna, 1=Inquietud leve, 2=Juega con manos/cabello, 3=Se levanta/mueve continuo, 4=Se retuerce					
10	Ansiedad psíquica (tensión, irritabilidad, preocupación excesiva, temores) 0=Ausente, 1=Tensión subjetiva, 2=Preocupación por nimiedades, 3=Actitud aprensiva, 4=Miedos/pánico					
11	Ansiedad somática (síntomas digestivos, taquicardia, sudoración, suspiros) 0=Ausente, 1=Leve, 2=Moderada, 3=Grave, 4=Incapacitante					
12	Síntomas somáticos gastrointestinales (pérdida de apetito, estreñimiento) 0=Ausente, 1=Pérdida de apetito come sin ayuda, 2=Dificultad comer sin insistencia / laxantes					
13	Síntomas somáticos generales (pesadez en extremidades, espalda, cefaleas) 0=Ninguno, 1=Pesadez extremidades/espalda/fatiga, 2=Cualquier síntoma somático bien marcado					
14	Síntomas genitales (pérdida de libido, impotencia, alteraciones menstruales) 0=Ausente, 1=Leve / disminución de interés, 2=Grave / ausencia total					
15	Hipocondría (preocupación excesiva por la salud física corporal) 0=Ausente, 1=Autoobservación corporal, 2=Preocupación por salud, 3=Quejas frecuentes, 4=Delirios					
16	Pérdida de peso (evaluada por anamnesis o báscula en el último mes) 0=Sin pérdida, 1=Pérdida leve (< 1 kg/sem), 2=Pérdida marcada (> 1 kg/sem)					
17	Introspección / Insight (conciencia de hallarse deprimido y enfermo) 0=Reconoce estar deprimido, 1=Reconoce enfermedad pero atribuye a causas físicas/clima, 2=Niega estar enfermo					

PUNTUACIÓN TOTAL Y CRITERIOS CLÍNICOS DE REMISIÓN (Hamilton, 1967)

Regla de Puntuación:

- Suma directa de los 17 ítems clásicos (rango: **0 a 52 puntos**).
- **Remisión Clínica Completa:** Puntuación total ≤ 7 puntos.
- **Respuesta Terapéutica:** Reducción $\geq 50\%$ respecto a la línea base.

Puntos de Corte de Gravedad:

- **0 - 7 puntos:** Sin depresión / Eutimia.
- **8 - 13 puntos:** Depresión leve / distimia.
- **14 - 18 puntos:** Depresión moderada.
- **19 - 22 puntos:** Depresión grave.
- **≥ 23 puntos:** Depresión muy grave (alto riesgo suicida).