

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

ESCALA DE IMPACTO DEL EVENTO — REVISADA

(Impact of Event Scale-Revised — IES-R)

Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). Adaptación: Báguena et al. (2001) / Caamaño et al. (2011). 22 reactivos.

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

[Evento estresante o traumático de referencia:

Fecha del suceso:

Descripción breve:

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de dificultades que las personas experimentan tras un acontecimiento traumático. Responda pensando únicamente en el evento descrito, indicando cuánto le ha molestado cada situación durante los **ÚLTIMOS 7 DÍAS**: **0** = Nada | **1** = Un poco | **2** = Moderadamente | **3** = Bastante | **4** = Extremadamente

Nº	Dificultad experimentada en los últimos 7 días	0	1	2	3	4
1	Cualquier recuerdo me hacía volver a sentir lo que sentí durante el suceso. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tenía problemas para permanecer dormido/a o despertaba a menudo. [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
3	Otras cosas o situaciones me hacían pensar involuntariamente en el suceso. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
4	Me sentía irritable, con accesos de enfado o con rabia. [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
5	Procuraba no alterarme o evitar ponerme mal cuando pensaba en lo sucedido. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
6	Pensaba en ello aun cuando no quería o intentaba impedirlo. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
7	Sentía como si no hubiese sucedido realmente o no fuese real. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
8	Me mantenía lejos de lugares, personas o cosas que me recordaran lo ocurrido. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
9	Imágenes vívidas del suceso asaltaban repentinamente mi mente. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
10	Me sobresaltaba, asustaba o ponía nervioso/a con facilidad. [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
11	Intentaba de forma activa no pensar en el suceso. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
12	Me daba cuenta de que aún quedaban muchos sentimientos sin resolver. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
13	Mis sentimientos sobre lo ocurrido estaban como adormecidos o anestesiados. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
14	Me encontraba actuando o sintiendo como si estuviese sucediendo de nuevo. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
15	Tenía dificultades o problemas para conciliar el sueño. [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
16	Me invadían oleadas de emociones y sentimientos intensos sobre lo sucedido. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
17	Intentaba borrarlo o apartarlo de mi memoria. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐
18	Tenía problemas de concentración en mis actividades diarias. [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
19	Los recordatorios me provocaban reacciones físicas (sudor, taquicardia, náuseas). [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
20	Soñaba o tenía pesadillas sobre lo sucedido. [INT]	☐	☐	☐	☐	☐
21	Me sentía hipervigilante, en guardia o desconfiado/a de todo. [HIP]	☐	☐	☐	☐	☐
22	Intentaba no hablar del tema con nadie. [EVI]	☐	☐	☐	☐	☐

Subescalas Clínicas (0 a 4 c/u): - **Intrusión (INT — 7 ítems):** 1, 3, 6, 9, 14, 16, 20. Total:

- **Evitación (EVI — 8 ítems):** 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22. Total:

- **Hiperactivación (HIP — 7 ítems):** 2, 4, 10, 15, 18, 19, 21. Total:

Puntuación Global IES-R: Suma directa de los 22 reactivos.

Total IES-R (0–88):

Media por ítem = Total / 22 (rango 0 a 4).

Puntos de Corte Clinimétricos: - **< 24 puntos:** Impacto clínico subclínico o leve. - **24 – 32 puntos:** Reacción postraumática de significado clínico; amerita seguimiento estrecho. - **>= 33 puntos:** **Punto de corte clínico sensible para probable TEPT.** Alto riesgo de sintomatología traumática crónica y deterioro funcional.