

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

INVENTARIO DE DECLARACIONES SOBRE AUTOLESIONES

(Inventory of Statements About Self-injury – ISAS)

Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). *J Psychopathol Behav Assess*, 31(3), 215-225. • Adaptación española: Pérez et al. (2019).

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

SECCIÓN I: CONDUCTAS DE AUTOLESIÓN NO SUICIDA (FRECUENCIA DE POR VIDA) Este cuestionario evalúa conductas de daño corporal realizadas de forma **intencionada (a propósito)** y **sin intención suicida**. Indique el número aproximado de veces que ha realizado cada una en toda su vida (p. ej., 0, 1, 5, 20, 100):

Nº	Conducta autolesiva	Nº Veces	Nº	Conducta autolesiva	Nº Veces
1	Cortarse.		7	Tallarse en la piel dibujos o palabras.	
2	Morderse.		8	Frotar piel contra superficies duras hasta sangrar.	
3	Quemarse.		9	Pellizcarse con fuerza.	
4	Rascarse con fuerza hasta herirse.		10	Clavarse agujas, grapas u objetos punzantes.	
5	Golpearse a sí mismo(a).		11	Ingerir sustancias no comestibles peligrosas.	
6	Interferir en curación de heridas.		12	Arrancarse pelo con fuerza (tricotilomanía).	

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS ADICIONALES (Si ha realizado alguna conducta anterior):

• ¿A qué edad se autolesionó intencionadamente por primera vez?

años. • ¿Suele experimentar dolor físico mientras se autolesiona? ☐ Sí ☐ NO • ¿Se autolesiona casi siempre cuando está a solas? ☐ Sí ☐ NO • ¿Cuánto tiempo suele pasar entre el impulso de autolesionarse y el acto? ☐ Menos de 1 hora ☐ Entre 1 y 3 horas ☐ Entre 3 y 6 horas ☐ Más de 6 horas • ¿Tiene actualmente deseos o impulsos de autolesionarse? ☐ Ninguno ☐ Leve ☐ Moderado ☐ Muy intenso

SECCIÓN II: FUNCIONES DE LA AUTOLESIÓN A continuación encontrará razones que algunas personas tienen para autolesionarse. Indique en qué medida cada una describe su experiencia:

0 = Para nada relevante / No describe mi experiencia | 1 = Algo relevante | 2 = Muy relevante / Describe con exactitud

N°	Cuando me autolesiono, lo hago para:	0 No	1 Algo	2 Mucho
1	Aliviar o calmar una tristeza o tensión emocional insoportable.	☐	☐	☐
2	Demostrar a otros lo mal que me siento o pedir ayuda.	☐	☐	☐
3	Castigarme a mí mismo(a) por ser una mala persona o por haber fallado.	☐	☐	☐
4	Sentir algo físico cuando estoy completamente desconectado(a) o insensible (antisociación).	☐	☐	☐
5	Evitar el impulso de cometer suicidio (mantenerme con vida).	☐	☐	☐
6	Liberar ira o furia acumulada que no puedo expresar de otra forma.	☐	☐	☐
7	Sentir que tengo el control sobre mi cuerpo y mi vida.	☐	☐	☐
8	Vengarme de alguien o hacer sentir culpable a otra persona.	☐	☐	☐
9	Crear un límite físico visible entre mí mismo(a) y los demás.	☐	☐	☐
10	Encajar o sentirme parte de un grupo de amigos o personas que también lo hacen.	☐	☐	☐
11	Expresar a través del cuerpo un dolor emocional que las palabras no pueden explicar.	☐	☐	☐
12	Experimentar una sensación de euforia o descarga placentera inmediata.	☐	☐	☐
13	Asegurarme de que todavía estoy vivo(a) y despierto(a).	☐	☐	☐
14	Disminuir la angustia o pánico que me desborda.	☐	☐	☐
15	Conseguir que otros me presten atención o me cuiden.	☐	☐	☐
16	Pagar por errores cometidos o sentir que merezco sufrir.	☐	☐	☐
17	Frenar pensamientos recurrentes o recuerdos horribles del pasado.	☐	☐	☐
18	Demostrar que soy fuerte, independiente y capaz de soportar dolor extremo.	☐	☐	☐
19	Hacer que otros dejen de exigirme cosas que no puedo soportar.	☐	☐	☐
20	Evitar dañarme de una manera mucho más grave o letal.	☐	☐	☐

N°	Cuando me autolesiono, lo hago para: (continuación)	0 No	1 Algo	2 Mucho
21	Sentir una sensación de alivio casi instantánea cuando veo la herida o sangre.	☐	☐	☐
22	Aterrorizar, manipular o impactar fuertemente a alguien.	☐	☐	☐
23	Reafirmar mi propia identidad o sentirme único(a).	☐	☐	☐
24	Sentirme conectado(a) emocionalmente con compañeros o grupos.	☐	☐	☐
25	Convertir un sufrimiento psicológico abstracto en una herida física visible y curable.	☐	☐	☐
26	Calmar un vacío interior aplastante.	☐	☐	☐
27	Expresar odio hacia mi propio cuerpo o apariencia.	☐	☐	☐
28	Despertar de una pesadilla o estado de aturdimiento mental.	☐	☐	☐
29	Detener pensamientos obsesivos que no me dejan en paz.	☐	☐	☐
30	Proteger a otras personas de mi propia ira o malestar.	☐	☐	☐
31	Obtener apoyo médico, terapéutico o familiar urgente.	☐	☐	☐
32	Castigarme por sentir impulsos o deseos que considero sucios o malos.	☐	☐	☐
33	Recuperar el control cuando todo a mi alrededor parece un caos.	☐	☐	☐
34	Comprobar si soy capaz de aguantar el sufrimiento físico sin quejarme.	☐	☐	☐
35	Obligar a otros a ver lo herido(a) que estoy por dentro.	☐	☐	☐
36	Sentirme vivo(a) cuando todo me parece falso o irreal.	☐	☐	☐
37	Aliviar una vergüenza o culpa abrumadora.	☐	☐	☐
38	Evitar explotar y hacer daño a otra persona.	☐	☐	☐
39	Establecer una marca o recuerdo tangible de un dolor emocional.	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

• **Sección I (Conductas):** Recuento de métodos empleados y frecuencia global de por vida. La presencia de *ge3* métodos distintos o > 50 episodios se asocia a mayor gravedad psicopatológica y riesgo clínico. • **Sección II (Funciones de segundo orden):** • **Factor Intrapersonal:** Suma de funciones de regulación del afecto, antidisociación, antistrés, autocastigo y antisuicidio (predominante en desregulación emocional severa y TLP). • **Factor Interpersonal:** Suma de funciones de búsqueda de ayuda, límites interpersonales, influencia y pertenencia al grupo. • **Alerta Clínica:** Las autolesiones no suicidas (NSSI) requieren abordaje clínico especializado (terapia dialéctico-conductual, regulación emocional) y cribado activo de intencionalidad suicida concurrente.

psico-flujo · Inventario de Autolesiones (Klonsky & Glenn, 2009; Pérez et al., 2019). Acceso abierto con fines clínicos e investigación.