

ESCALA DE DEPRESIÓN DE MONTGOMERY-ASBERG (MADRS)

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale — Sensibilidad Máxima al Cambio Terapéutico
Montgomery & Asberg (1979) • Adaptación española: Lobo et al. (2002)

Nombre / Código: _____ Fecha: _____

Edad: _____ años Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada mediante entrevista clínica. Evalúe la gravedad de los 10 síntomas centrales en los últimos días marcando del 0 al 6 según los anclajes operativos:

Cada ítem se puntúa de 0 (ausente) a 6 (máxima gravedad) | Rango Total: 0 a 60 puntos

Nº	Ítem Clínico Evaluado (MADRS)	0	1	2	3	4	5	6
1	Tristeza aparente (abatimiento, desesperación en voz, gestos y mímica; 0=No tristeza a 6=Extremadamente abatido)							
2	Tristeza declarada (humor deprimido expresado verbalmente por el paciente; 0=Tristeza ocasional a 6=Continua/invariable)							
3	Tensión interna (malestar indefinido, nerviosismo, tensión mental, pánico; 0=Tranquilo a 6=Pánico continuo/terror)							
4	Sueño reducido (reducción de duración/profundidad respecto al patrón habitual; 0=Sueño normal a 6=< 2-3 horas sueño)							
5	Apetito reducido (pérdida de apetito o desgana frente a la comida; 0=Normal a 6=Inapetencia total / forzado a comer)							
6	Dificultad de concentración (dificultad para coordinar ideas o lectura; 0=Sin dificultad a 6=Incapacidad completa)							
7	Lasitud / Inhibición (dificultad para iniciar y lentitud al realizar actividades; 0=Normal a 6=Incapaz de hacer nada)							
8	Incapacidad para sentir (anhedonia afectiva hacia allegados y aficiones; 0=Normal a 6=Incapacidad total de sentir afecto)							
9	Pensamientos pesimistas (ideas de culpa, autorreproches, ruina; 0=Ninguno a 6=Delirios de culpa inquebrantables)							
10	Pensamientos suicidas (sentimiento de que no vale la pena vivir a planes explícitos; 0=Disfruta vida a 6=Planes activos suicidio)							

PUNTUACIÓN TOTAL Y PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS (Montgomery & Asberg, 1979)

- Regla de Puntuación:**

 - Suma directa de los 10 ítems (rango: **0 a 60 puntos**).
 - **Remisión Clínica Completa:** Puntuación total ≤ **10 puntos**.
 - **Respuesta Terapéutica:** Descenso ≥ 50% en la puntuación basal.
 - Especialmente útil en ensayos de nuevos fármacos por su nula interferencia somática.
- Puntos de Corte de Severidad:**

 - **0 - 6 puntos:** Normal / Eutimia.
 - **7 - 19 puntos:** Depresión leve.
 - **20 - 34 puntos:** Depresión moderada.
 - **≥ 35 puntos:** Depresión grave / severa.