

TEST MÜNCHNER DE ALCOHOLISMO (MALT)

Münchner Alkoholismustest — Evaluación Clínica (MALT-O) y Autoaplicada (MALT-S)

Feuerlein et al. (1977) • Adaptación española: Rodríguez-Martos et al. (1986)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

El protocolo consta de dos secciones: MALT-O (cumplimentado por el facultativo con datos clínicos) y MALT-S (autoinforme del paciente). Marque con una cruz (X) en SÍ o NO:

MALT-O: Ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7 = 4 pts; Ítem 4 = 5 pts | MALT-S: Cada SÍ = 1 pto

Nº	Ítem Clínico / Cuestionario	SÍ	NO
MALT-O: Evaluación por el Clínico (Signos Médicos y Conductuales)			
O1	Enfermedad hepática (mínimo 1 síntoma clínico: hepatomegalia, dolor a la presión y al menos 1 alteración analítica: GOT, GPT, GGT). [4 pts]		
O2	Polineuropatía alcohólica (descartando diabetes u otras etiologías conocidas). [4 pts]		
O3	Delirium tremens (episodio actual o documentado en la anamnesis). [4 pts]		
O4	Consumo de alcohol superior a 150 ml/día en varón o 120 ml/día en mujer de alcohol puro de forma continuada durante meses. [5 pts]		
O5	Consumo de alcohol superior a 300 ml/día en varón o 240 ml/día en mujer de alcohol puro, una o más veces al mes. [4 pts]		
O6	Aliento alcohólico manifiesto en el momento de la exploración clínica. [4 pts]		
O7	Familiares o allegados han solicitado formalmente ayuda médica o social por el problema alcohólico del paciente. [4 pts]		
MALT-S: Autoinforme del Paciente (27 Ítems - 1 punto por SÍ)			
S1	En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos		
S2	A temporadas, sobre todo por las mañanas, tengo sensación nauseosa o ganas de vomitar		
S3	Alguna vez he intentado calmar la resaca, temblor o náusea matutina bebiendo alcohol		
S4	Actualmente me siento amargado por mis problemas y dificultades		
S5	No es raro que beba alcohol antes del desayuno o del almuerzo		
S6	Tras los primeros vasos de una bebida, siento la necesidad irresistible de seguir		
S7	A menudo pienso en el alcohol		
S8	A veces he bebido alcohol incluso cuando el médico me lo ha prohibido expresamente		
S9	En las temporadas en que bebo más, como menos		
S10	En el trabajo me han llamado la atención por mis ingestas de alcohol o absentismo		
S11	Últimamente prefiero beber alcohol a solas y sin que me vean		

Nº	Ítem Clínico / Cuestionario (continuación)	SÍ	NO
MALT-S: Autoinforme del Paciente (continuación)			
S12	Bebo de un trago y más deprisa que los demás		
S13	Desde que bebo más, soy menos activo		
S14	A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después de haber bebido		
S15	He ensayado sistemas para controlar la bebida (ej. no beber antes de cierta hora)		
S16	Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol		
S17	Sin alcohol no tendría yo tantos problemas personales o laborales		
S18	Cuando estoy excitado o nervioso bebo alcohol para calmarme		
S19	Creo que el alcohol está destruyendo mi vida		
S20	Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y pienso que no es necesario		
S21	Otras personas no pueden comprender por qué bebo		
S22	Si yo no bebiera me llevaría mejor con mi pareja o familia		
S23	Ya he probado a pasar temporadas sin alcohol		
S24	Si no bebiera, estaría mucho más satisfecho y contento conmigo mismo		
S25	Repetidamente me han mencionado o criticado mi «aliento alcohólico»		
S26	Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo (tolerancia)		
S27	A veces he tenido amnesias o «lagunas» tras haber bebido mucho el día anterior		

PUNTUACIÓN TOTAL Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (Feuerlein et al., 1977)**Cálculo de la Puntuación Total:**

- Puntuación MALT = Suma ponderada de MALT-O + Suma directa de MALT-S.
- Rango Teórico: de 0 a 56 puntos.

Puntos de Corte Diagnósticos:

- **0 - 5 puntos:** No alcoholismo / Consumo de bajo riesgo.
- **6 - 10 puntos:** Sospecha de alcoholismo (requiere valoración longitudinal).
- **≥ 11 puntos:** Alcoholismo confirmado / Dependencia al alcohol.