

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

INVENTARIO OBSESIVO-COMPULSIVO REVISADO

(Obsessive-Compulsive Inventory-Revised — OCI-R)

Foa, E. B., et al. (2002). *Psychol Assess*, 14(4), 485-496. • Adaptación española: Fullana, M. A., et al. (2005).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de experiencias habituales. Marque con una cruz cuánto le ha molestado cada experiencia durante el último mes:

0 = Nada / En absoluto | 1 = Un poco | 2 = Moderadamente | 3 = Mucho | 4 = Muchísimo / Extremadamente

Nº	En el último mes, cuánto le molestó:	0 Nada	1 Un poco	2 Moder.	3 Mucho	4 Extr.
1	Tener pensamientos desagradables contra mi voluntad que no puedo apartar.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Sentir la necesidad de lavar o limpiar objetos repetidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Comprobar puertas, ventanas, llaves o cajones una y otra vez.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Molestarme mucho si las cosas u objetos no están ordenados de una manera exacta.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tener dificultades para controlar mis propios pensamientos indeseados.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Lavarme las manos con mucha más frecuencia o durante más tiempo de lo necesario.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Comprobar los aparatos de gas, interruptores de luz o grifos repetidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Necesidad imperiosa de que las cosas se mantengan ordenadas simétricamente.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Preocuparme por pensamientos de hacer daño a otras personas contra mi deseo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Dificultad o rechazo a tocar objetos por temor a gérmenes o suciedad.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Comprobar repetidamente lo que he escrito o lo que he hecho.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Sentir la necesidad de contar cosas o repetir ciertos números.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Tener pensamientos inmorales, sexuales o blasfemos que me resultan inaceptables.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Evitar tocar cosas que otros han tocado por miedo a contaminarme.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Comprobar repetidamente no haber causado algún accidente o daño por descuido.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Repetir ciertas palabras, frases o números mentalmente para neutralizar temores.	☐	☐	☐	☐	☐
17	Sentir que pensamientos horribles se apoderan de mi mente de forma recurrente.	☐	☐	☐	☐	☐
18	Guardar o acumular cosas inútiles por si acaso pudieran serme necesarias algún día.	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rango 0 a 72 puntos):

• **Punto de corte clínico global:** Una puntuación total *ge*21 **puntos** sugiere fuertemente la presencia de Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) clínicamente significativo (sensibilidad 84%, especificidad 83%). • **Subescalas (3 ítems c/u, rango 0-12):** **Lavado:** 2, 6, 14 | **Comprobación:** 3, 7, 11 | **Obsesiones:** 1, 5, 9 **Neutralización/Orden:** 4, 8, 16 | **Contaminación/Duda:** 10, 13, 17 | **Acumulación:** 12, 15, 18.

psico-flujo · Instrumento clínico de cribado para TOC. Foa et al. (2002), adaptación española Fullana et al. (2005).