

ESCALA DE PÁNICO Y AGORAFOBIA DE BANDELOW (PAS)

Panic and Agoraphobia Scale — Evaluación Multidimensional de Pánico y Evitación

Borwin Bandelow (1995) • Versión clínica validada

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Valore la severidad de los síntomas presentados durante la última semana puntuando de 0 a 4 según las definiciones operativas (**el ítem U es fenomenológico y no suma al total**):

0 = Ninguno / Nulo | 1 = Leve | 2 = Moderado | 3 = Grave | 4 = Muy grave / Extremo

Ítem	Dimensión Clínica Evaluada (Última Semana)	0	1	2	3	4
A.1	¿Con qué frecuencia tuvo ataques de pánico la semana pasada? (0=Ninguno, 1=1 ataque, 2=2-3 ataques, 3=4-6 ataques, 4=Más de 6)					
A.2	¿Cómo de severos fueron los ataques de pánico en la semana pasada? (0=Ninguno, 1=Leves, 2=Moderados, 3=Graves, 4=Muy graves)					
A.3	Normalmente, ¿cuánto duraron los ataques de pánico? (0=Ninguno, 1=1-10 min, 2=10-60 min, 3=1-2 horas, 4=Más de 2 horas)					
U	¿Fueron la mayor parte de los ataques esperados/situacionales o inesperados? (0=Inesperados a 4=Esperados; Cualitativo, no suma)					
B.1	Durante la última semana, ¿evitó situaciones por miedo al pánico? (0=No evitación, 1=Infrecuente, 2=Ocasional, 3=Frecuente, 4=Muy frecuente)					
B.2	Número de situaciones agorafóbicas evitadas (transporte, tiendas, cines, colas, etc.) (0=Ninguna, 1=1 sit., 2=2-3 sit., 3=4-8 sit., 4=>8)					
B.3	¿Qué grado de importancia tenían las situaciones evitadas para su vida diaria? (0=Sin agorafobia, 1=Poca, 2=Moderada, 3=Mucha, 4=Extrema)					
C.1	¿Tuvo temor a tener un ataque de pánico (ansiedad anticipatoria)? (0=Sin temor, 1=Infrecuente, 2=A veces, 3=Frecuente, 4=Constante)					
C.2	¿Qué intensidad tenía ese «temor al temor»? (0=Nula, 1=Leve, 2=Moderada, 3=Marcada, 4=Extrema / incapacitante)					
D.1	¿Causaron sus crisis o agorafobia restricciones en sus relaciones familiares? (0=No deterioro, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Marcado, 4=Extremo)					
D.2	¿Causaron restricciones en su vida social y actividades de ocio? (0=No deterioro, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Marcado, 4=Extremo)					
D.3	¿Causaron restricciones en sus responsabilidades en el trabajo o tareas del hogar? (0=No deterioro, 1=Leve, 2=Moderado, 3=Marcado, 4=Extremo)					
E.1	¿Se preocupó por sufrir algún daño físico grave por sus síntomas (infarto, síncope)? (0=No, 1=Poco, 2=Parcial, 3=Bastante, 4=Totalmente)					
E.2	¿Creía que detrás de sus síntomas había una causa somática no descubierta? (0=Causa psíquica, 1=Poco, 2=Parcial, 3=Bastante, 4=Convicción orgánica)					

PUNTUACIÓN GLOBAL Y SUBESCALAS (Bandelow, 1995)

Puntuación Total (0 - 52 puntos, sin ítem U):

- 0 - 8 puntos: Remisión clínica / Síntomas mínimos.
- 9 - 18 puntos: Pánico y agorafobia leve.
- 19 - 28 puntos: Gravedad moderada.
- 29 - 39 puntos: Gravedad severa.
- 40 - 52 puntos: Gravedad extrema.

Subescalas Clínicas:

- A. Ataques de pánico (A1-A3): 0 - 12 puntos.
- B. Agorafobia y evitación (B1-B3): 0 - 12 puntos.
- C. Ansiedad anticipatoria (C1-C2): 0 - 8 puntos.
- D. Discapacidad funcional (D1-D3): 0 - 12 puntos.
- E. Preocupaciones sobre la salud (E1-E2): 0 - 8 puntos.